

TRAITEMENT PAR HORMONE DE CROISSANCE DISPONIBLE EN 2016

LABORATOIRE	SYSTEME INJECTEUR	CARTOUCHE	DOSE/INJECTION	CONSERVATION	AIGUILLE
IPSEN N° Vert 0 800 105 013	Nutropin Aq Pen	NUTROPIN Aq 10 mg : 2 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 4 mg Click = 0,1 mg	Après 1 ^{ère} utilisation : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm Novofine 6 mm, 8 mm
LILLY N° Vert 0 800 00 36 36	Humatropen 6 (blanc)	Umatrope 6mg (bleu) : 3ml	Mini : 0,025 mg Maxi : 1,5 mg Click = 0,025 mg	Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm Novofine 6 mm, 8 mm
	Humatropen 12 (vert clair)	Umatrope 12mg (mauve) : 3ml	Mini : 0,05 mg Maxi : 3 mg Click = 0,05 mg		
	Humatropen 24 (vert foncé)	Umatrope 24 mg (jaune) : 3ml	Mini : 0,1 mg Maxi : 6 mg Click = 0,1 mg		
NOVO NORDISK N° Vert 0 800 80 30 70	Nordipen 5 (orange)	Norditropine simplex 5 mg : 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,05 mg Maxi : 1,25 mg Click = 0,05 mg	Entre 2° et 8° Cartouche non utilisée Dans le stylo : 21 jours à température ambiante (entre 2 et 25°)	Novofine 6 mm, 8 mm BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
	Nordipen 10 (bleu)	Norditropine simplex 10 mg : 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 2,5 mg Click = 0,1mg		
	Nordipen 15 (vert)	Norditropine simplex 15 mg : 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 4 mg Click = 0,1mg		
	Nordiflex 5 (orange)	Stylo pré rempli jetable <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,025 mg Maxi : 1,5 mg Click = 0,025 mg	Entre 2° et 8° Stylo non utilisé Après 1 ^{ère} utilisation 21 jours à température ambiante (entre 2 et 25°)	Novotwist 5 mm , 8mm Novofine 6 mm, 8 mm BD microfine 4, 5, 8, 10, 12 mm Novotwist 5 mm , 8mm Novofine 6 mm, 8 mm BD microfine 4, 5, 8, 10, 12 mm Novotwist 5 mm , 8mm Novofine 6 mm, 8 mm BD microfine 4, 5, 8, 10, 12 mm
	Nordiflex 10 (bleu)	Stylo pré rempli jetable <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,05 mg Maxi : 3 mg Click = 0,05 mg		
	Nordiflex 15 (vert)	Stylo pré rempli jetable <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,075 mg Maxi : 4,5 mg Click = 0,075 mg		

PFIZER N° laboratoire 01 58 07 34 40	GoQuick 5,3 (logo bleu)	GoQuick 5,3 jetable	Mini : 0,1 mg Maxi : 1,5 mg Click = 0.05 mg	Jetable (cartouche poudre + liquide) Avant reconstitution : possibilité 1 mois temp ambiante (inf 25°)	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm Novofine 6 mm, 8 mm
	GoQuick 12 (logo violet)	GoQuick 12 jetable	Mini : 0,3 mg Maxi : 4,5 mg Click = 0.15 mg	Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	
	Genotonorm Pen 5,3	Genotonorm 5,3 mg (bleu) 1 ml	Mini : 0,1 mg Maxi : 2 mg Click = 0.1 mg	Avant reconstitution : possibilité 1 mois temp ambiante (inf 25°)	
	Genotonorm Pen 12	Genotonorm 12 mg (violet) 1 ml	Mini : 0,2 mg Maxi : 4 mg Click = 0.2 mg	Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	
	Miniquick seringues préremplies	Seringues 0,25 ml (boite 7 seringues) 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2 mg <i>(fournie avec aiguilles 8 mm)</i>	Seringues à usage unique	Avant reconstitution : possibilité 6 mois à température ambiante Après reconstitution : utilisation immédiate	
SANDOZ N° laboratoire 01 49 64 48 00 (GH biosimilaire) <i>(Stylo fourni par labo)</i>	Omnitrope 5 Surepal (blanc)	5 mg - 1,5ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,05 mg Maxi 2,7 mg Click = 0.05 mg	Après 1ère utilisation : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
	Omnitrope 10 Surepal (vert)	10 mg - 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1mg Maxi : 5,4 mg Click = 0.1 mg		
	Omnitrope 15 Surepal (bleu)	15 mg - 1,5ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1mg Maxi : 5,4 mg Click = 0.1 mg		
MERCK SERONO N° Vert 0 800 888 024 <i>(Stylo, aiguilles, piles fournis par labo)</i>	One Click	Saizen Click Easy 8 mg = 1,37 ml <i>Avec reconstitution</i>	Mini : 0,12 mg Maxi : 3,4 mg Click = 0,12mg	Avant reconstitution possibilité température ambiante (inf à 25°) Après reconstitution entre 2° et 8° pendant 28 jours	Fournies par le laboratoire Transjection Tête à changer 1x/semaine Adaptateur à chaque flacon
	Easypod	Saizen 6mg (5,83 mg/ml) Saizen 20mg (8 mg/ml) <i>Sans reconstitution</i>	6 mg Mini : 0,15 mg Maxi : 4,66 mg 20 mg Mini : 0,5 mg Maxi : 6,4 mg	Conservation 28 jours entre 2°et 8° Après 1 ^{ère} utilisation possibilité < 25° pendant 7 jours consécutifs	
	Cool – Click 2	Saizen 6mg (5,83 mg/ml) Saizen 20mg (8 mg/ml) <i>Sans reconstitution</i>	6 mg Mini : 0,3 mg Maxi : 2,92 mg 20 mg Mini : 0,4 mg Maxi : 4 mg		
FERRING	ZOMAJET 2 vision	Flacon ZOMACTON 4 mg Solvant 1,3 ml	Mini ; 0,2 mg Maxi : 1,66 mg	14 j après reconstitution entre 2° et 8° Avant reconstitution T° ambiante 28 j après reconstitution entre 2° et 8°	Transjection Tête à changer 1x/semaine Adaptateur à chaque flacon
	ZOMAJET vision X	Flacon ZOMACTON 10 mg Solvant 1ml	Mini : 0,1 mg Maxi : 5 mg		