

IMPORTANT INFORMATION MÉDICALE



CE PATIENT A BESOIN DE TRAITEMENT SUBSTITUTIF QUOTIDIEN VITAL AVEC DE L'HYDROCORTISONE

En cas de troubles de la conscience,
vomissements répétés, diarrhée sévère,
déshydratation, malaise, coma, traumatisme
sévère ou intervention chirurgicale, injecter
immédiatement Hydrocortisone iv/im ou scut
< 1 ans: 25 mg
1 - 6 ans: 50 mg
> 6 ans: 100 mg
et poser, si nécessaire, perfusion iv de
sérum physiologique (NaCl 0,9 %).

Association Surrénales et son conseil scientifique, 2017

IMPORTANT MEDICAL INFO



THIS PATIENT NEEDS DAILY REPLACEMENT THERAPY WITH CORTISONE

In the event of serious illness, trauma, vomiting
or diarrhoea, hydrocortisone
Age: < 1 year: 25 mg IV or IM
Age: 1 - 6 year: 50 mg IV or IM
Age: > 6 years: 100 mg IV or IM
and IV saline infusion (when possible)
should be administered **WITHOUT DELAY**.

NAME

PERSON NUMBER / DATE OF BIRTH

European Society for Pediatric Endocrinology