

## Plan d'accueil individualisé (PAI)

Ce PAI doit être accompagné de :

- L'ordonnance habituelle du patient
- La carte de soins et d'urgence

**Poids de l'enfant (en kg) :**

### DIAGNOSTIC

Insuffisance corticotrope

Insuffisance surrénale

### TRAITEMENT ACTUEL (per os)

HYDROCORTISONE ROUSSEL (cp 10 mg) : \_ mg matin, \_ mg midi, \_ mg soir

FLUDROCORTISONE (cp 10 ou 50 µg ; rayer la mention inutile) \_ µg matin, \_ µg soir

### MESURES A PRENDRE

En cas de fièvre, diarrhée, maladie infectieuse, ou vomissements répétés avec état général conservé :

- Donner immédiatement Hydrocortisone 10 mg soit 1 cp ou 20 mg soit 2 cp (effacer la mention inutile) ;
- Prévenir les parents.

En cas d'altération de l'état général ou malaise :

- Contacter le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers) ;
- Donner à l'enfant s'il est conscient du sucre oralement (1 sucre / 20k de poids ou un peu de jus de fruit) ;
- Faire faire par les secours une injection d'Hémisuccinate d'hydrocortisone en intramusculaire ou en sous cutané :
  - enfant < 1 an : 25 mg soit 1/4 d'ampoule
  - enfant de 1 à 6 ans : 50 mg soit ½ ampoule
  - enfant > 6 ans : 100 mg soit 1 ampoule

Trousse d'urgence à emporter pendant les sorties scolaires et contenant : Hydrocortisone en comprimés, sucre en morceaux.

**INFORMATION A FOURNIR AU MÉDECIN D'URGENCE : RISQUE D'INSUFFISANCE SURRÉNALE AIGUË**

### EN CAS DE BESOIN

Contacter le Service d'Endocrinologie Diabétologie Pédiatrique (Hôpital Robert Debré)

- La journée au 01.40.03.53.03 ou 01.40.03.53.54 (Secrétariat)
- Hors heures ouvrées au 01.40.03.20.68 (Infirmières)