Centre de Référence des Maladies Endocriniennes Rares de la Croissance

TRAITEMENT PAR HORMONE DE CROISSANCE DISPONIBLE EN 2013

LABORATOIRE	SYSTEME INJECTEUR	CARTOUCHE	DOSE/INJECTION	CONSERVATION	AIGUILLE
FERRING	ZOMAJET 2 vision	Flacon ZOMACTON 4 mg Solvant 1,3 ml	Mini ; 0,20 mg Maxi : 1,66 mg	14 jours après reconstitution entre 2° et 8° Avant reconstitution T° ambiante jusqu'à date péremption 28 j. ap reconstitution entre 2° et 8°	Transjection Tête à changer 1x/semaine Adaptateur à chaque flacon
	ZOMAJET vision X	Flacon ZOMACTON 10 mg Solvant 1ml	Mini : 0,1 mg Maxi : 5 m		
IPSEN N° Vert 0 800 105 013	NutropinAQ Pen	NUTROPIN AQ 10 mg : 2 ml Sans reconstitution	Mini : 0,1 mg Maxi : 4 mg	Après 1ère utilisation : 28 jours entre 2° et 8° Entre 2 injections possibilité 45 minutes température ambiante	BD microfine 4mm 5mm 8mm 10mm 12mm
Lilly N° Vert 0 800 00 36 36	Humatropen 6 (vert)	Umatrope 6mg (bleu) 3ml 1 ml : 2 mg	Mini : 0,025 mg Maxi : 1,5 mg	Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm 5mm 8mm 10mm 12mm
	Humatropen 12 (vert)	Umatrope 12mg (mauve) 3ml 1ml : 4mg	Mini : 0,05 mg Maxi : 3 mg		
	Humatropen 24 (vert)	Umatrope 24 mg (jaune) 3ml 1ml : 8mg	Mini : 0,1 mg Maxi : 6 mg		
Novo N° Vert 0 800 80 30 70	Nordipen 5 (orange)	Norditropine simplex 5 mg : 1,5 ml Sans reconstitution	Mini : 0,05 mg Maxi : 1,25 mg	Entre 2° et 8° Cartouche non utilisée Dans le stylo : 21 jours à température ambiante (entre 2 et 25°)	Novofin e 31G : 6 mm 30G : 8 mm BD microfine 4mm 5mm 8mm 10mm
	Nordipen 10 (bleu)	Norditropine simplex 10 mg : 1,5 ml Sans reconstitution	Mini : 0,1 mg Maxi : 2,5 mg		
	Nordipen 15 (vert)	Norditropine simplex 15 mg : 1,5 ml Sans reconstitution	Mini : 0,1 mg Maxi : 4 mg		
	Nordiflex 15	Stylo pré rempli jetable Sans reconstitution	Mini : 0,6 mg Maxi : 4,5 mg Acrémant : 0,075 mg	Entre 2° et 8° stylo non utilisé Après 1° utilisation 21 jours à température ambiante (entre 2 et 25°)	Novofine BD microfine
Pfizer	Genotonorm Pen 5,3	Genotonorm 5,3 mg (bleu) 1 ml	Mini : 0,1 mg Maxi : 2 mg	Avant reconstitution : possibilité 1 mois température ambiante (inf 25°) Après reconstitution : 28 jours entre	BD microfine 4mm 5mm 8mm

	Genotonorm Pen 12	Genotonorm 12 mg (violet) 1 ml	Mini : 0,2 mg Maxi : 4 mg	2° et 8°	10mm 12mm
	Miniquick seringues	Seringues de 0,25 ml (boite de 7) 0,6 mg – 0,8 mg – 1 mg – 1,2 mg – 1,4 mg – 1,6 mg – 1,8 mg – 2 mg		Avant reconstitution : possibilité 6 mois température ambiante Après reconstitution : conseil utilisation immédiate, possibilité 24h entre 2 °et 8°	
Sandoz N° Vert 0 800 94 10 15	Omnitrop pen 5	5 mg- 1,5ml (3,3 mg/ml) Sans reconstitution	Mini : 0,05 mg Maxi 2,7 mg	Après 1° utilisation 21 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm 5mm 8mm 10mm 12mm
	Omnitrop pen 10	10 mg – 1,5 ml (6,7 mg/ml) Sans reconstitution	Mini : 0,1mg Maxi : 5,4 mg		
Serono N° Vert 0 800 888 024	One Click	Saizen 8 mg = 1,37 ml (Click Easy)	Mini : 1 clic - 0,12 mg Maxi : 29 clics - 3,40 mg	Avant reconstitution : température ambiante (inf à 25°) Après reconstitution entre 2° et 8° pendant 28 jours	Fourni pas le laboratoire N° Vert : 0 800 888 024
	Easypod	Saizen 6mg – 1,03 ml (5,83 mg/ml) Saizen 20mg - 2,50 ml (8 mg/ml) Sans reconstitution	Mini : 0,15 mg Maxi : 4,66 mg	Conserver entre 2° et 8°	
	Cool – Click	Saizen 6mg – 1,03 ml (5,83 mg/ml) Saizen 20mg - 2,50 ml (8 mg/ml) Sans reconstitution	Mini : 0,3 mg Maxi : 2,92 mg	Conserver entre 2° et 8°	Transjection Tête à changer 1x/semaine Adaptateur à chaque flacon