

PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN PRIORITÉ

Mme/M. Tël
Médecin traitant Tël
Spécialiste traitant Tël
Suivi(e) par le centre de Tël


association
surrénales
MALADIES
RARES DE LA
SURRENALE
<http://surrenales.aphp.fr>

orphanet


FIRENDO
www.firendo.fr




maladies rares

Photo

CARTE D'URGENCE
Emergency card

Insuffisance surrénale (Pédiatrie)
(Adrenal insufficiency)

Nom :
Prénom :
Date de naissance.....



Risque d'insuffisance surrénale aigue

• **Ne jamais arrêter le traitement**

• **Risque d'insuffisance surrénale aiguë** si le traitement (Hydrocortisone® +/- Flucortac®) est interrompu ou non adapté en cas de maladies intercurrentes aiguës/réanimation/chirurgie/anesthésie.

• **Si maladies aiguës ou fièvre** : Doubler ou tripler les doses d'hydrocortisone (en 3 prises) et assurez-vous de l'amélioration clinique rapide.

Si réanimation/chirurgie/anesthésie ou signes de gravité (vomissements et/ou diarrhées répétés, déshydratation, malaise, troubles de la conscience et/ou de l'hémodynamique, traumatisme sévère) : injectez immédiatement de l'Hydrocortisone Upjohn® (hémisuccinate d'hydrocortisone) en IV, IM ou sous cutané

Chez l'enfant : < 1 an : 25 mg
1 à 6 ans : 50 mg
> 6 ans, adolescent : 100 mg

Corriger l'hémodynamique, les troubles hydro-électrolytiques et le cas échéant l'hypoglycémie.