



# En cas de fièvre

Le cathéter est une porte d'entrée directe de microbes dans le sang, ce qui provoque une septicémie : le signe majeur est la fièvre.

**Il est demandé de prendre la température par voie axillaire environ 1 heure avant chaque branchement, et à chaque fois que vous avez un doute.**

Si la température est **supérieure à 38°C** ou **inférieure à 36°C** :

- Téléphoner dans le service du centre agréé ou de l'hôpital de proximité (défini au préalable avec le médecin référent) pour prévenir de l'arrivée de son enfant, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit (24h/24).

Si la **température apparaît en cours de perfusion** (durant le plein palier) :

- Téléphoner dans le service du centre agréé ou de l'hôpital de proximité, puis faire un palier d'urgence (ou « palier dégressif immédiat) pour diminuer progressivement le débit afin d'éviter tout risque d'hypoglycémie.
- Débrancher l'enfant au moins ½ heure après le début du palier.
- Ne pas oublier de prendre la poche de secours du domicile (mélange binaire : jaune) transportée dans la glacière prévue à cet effet.
- Venir directement dans le service du centre agréé, **ne jamais passer par LES URGENCES** pour les familles installées à Paris/région parisienne.
- Pour les familles installées en province, **se rendre à l'hôpital de proximité selon les modalités établies lors de la formation initiale.**
- Si impossibilité de débrancher, appeler une ambulance.
- Si l'état de l'enfant est instable avec perte de connaissance : **APPELER LE SAMU.**
- Pour le trajet domicile-hôpital, il est possible de donner une dose de paracétamol