

Pour une diffusion strictement interne AP-HP :

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage exclusif privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu.

Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, sont donc interdites de même que toute reproduction, exposition, publication, diffusion ou utilisation d'une quelconque façon à des fins publiques et commerciales.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse de l'AP-HP et notamment par le biais d'un accord de licence et de transfert de droits. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.

Droits d'auteur :

La structure générale, la présentation, la forme, et moyens d'accès aux données constituent, ensemble, une œuvre protégée par les lois en vigueur sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, dont l'AP-HP est titulaire au titre des législations française et internationale.

Aucune reproduction, représentation, distribution, diffusion, modification, transformation, décompilation, partielle ou intégrale, ne pourra en être faite sans l'accord préalable et écrit de l'AP-HP.

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1^{er} juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données dont l'AP-HP est propriétaire.

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
A 313	vitamine A		50 0000 UI	capsule molle							A avaler intacte avec un verre d'eau
ABBOTICINE	érythromycine		200 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable							A administrer avant les repas : assure de meilleurs taux sériques
ABILIFY	aripiprazole		5 mg	comprimé							A administrer à heure fixe, avant, pendant ou après un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : préférez les comprimés dispersibles
			10 mg	comprimé							
			10 mg	cp orodispersible							
			15 mg	comprimé							
			15 mg	cp orodispersible							
ABSTRAL	citrate de fentanyl		100 µg	cp sublingual							A administrer en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer , ni écraser : laissez fondre le plus loin possible sous la langue Ne pas manger ni boire avant dissolution complète du comprimé Si sécheresse buccale : humidifier la muqueuse buccale avec de l'eau avant la prise Alternative : la solution nasale de fentanyl, la sucette d'Actiq®, le patch transdermique de Durogesic® ou les sprays d'Instanyl® ou de PecFent®
			200 µg	cp sublingual							
			300 µg	cp sublingual							
			400 µg	cp sublingual							
			600 µg	cp sublingual							
			800 µg	cp sublingual							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ABUFENE	bêta-alanine		400 mg	comprimé		?	?		?		
ACADIONE	tiopronine		250 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : enrobage entérique Alternative : Trolovol® oral 300 mg
ACEBUTOLOL	acébutolol		40 mg / ml	solution buvable							A administrer de préférence en 1 prise le matin, sinon en 2 prises : matin et soir Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser les comprimés : préférez la solution buvable
			200 mg	comprimé enrobé	 						
			200 mg	cp pelliculé	 						
			400 mg	cp pelliculé	 						
			400 mg	cp pelliculé sécable	 						
ACECLOFENAC	acéclofénac		100 mg	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau ou un autre liquide Ne pas croquer , ni écraser
ACETATE DE CYPROTERONE	cyprotérone		50 mg	comprimé sécable	 						
			100 mg	comprimé sécable	 						
ACETYLCYSTEINE	acétylcystéine		200 mg	granulés pour solution buvable							Laissez dissoudre complètement les granulés dans un verre d'eau Dégagez les présentations effervescentes
			200 mg	cp effervescent							
			200 mg	cp effervescent sécable							
			200 mg	poudre orale							
ACETYLCYSTEINE SANS SUCRE	acétylcystéine		200 mg	poudre orale							
ACETYLLEUCINE	leucine		500 mg	comprimé							
ACICLOVIR	aciclovir		200 mg	comprimé							Préférez la suspension buvable de Zovirax®

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ACICLOVIR	aciclovir		800 mg	comprimé						Préférez la suspension buvable de Zovirax®	
ACIDE ALENDRONIQUE	acide alendronique		10 mg	comprimé	?	?		?		A administrer au lever, au moins 30 min avant la prise d'aliments, avec un grand verre d'eau non minéralisée. Les autres solutions buvables (y compris les eaux minérales) et les médicaments réduisent l'absorption de l'alendronate.	
			70 mg	comprimé	?	?		?			
ACIDE FOLIQUE PH pour le 2,5 mg	vitamine B ₉		0,4 mg	comprimé	?	?		?		Prendre les comprimés avec un ½ verre d'eau. Les comprimés de Speciafoldine® sont broyables si administration par sonde entérale (goût amer)	
			2,5 mg	gélule			?	?			
			5 mg	comprimé	?	?		?			
ACIDE TIAPROFENIQUE	acide tiaprofénique		100 mg	comprimé sécable						A administrer de préférence au cours des repas. Comprimés à avaler tels quels ou dissous dans un grand verre d'eau.	
			200 mg	comprimé							
ACIDRINE	myrtécaïne		2,5 mg	cp à croquer						A croquer ou sucer au moment des douleurs, puis avaler rapidement un verre d'eau afin d'éviter l'anesthésie des muqueuses buccales et de la glotte.	
ACTAPULGITE	attapulgite de Mormoiron activée		3 g	poudre orale						A administrer de préférence avant les repas. Mélangez à sec avec du sucre en poudre avant adjonction d'eau pour obtenir un mélange parfaitement homogène au goût agréable.	
ACTI 5	déanol + magnésium + vitamine C		100mg/25mg/200mg (5 ml)	solution buvable						A administrer avant le repas. Evitez la prise en fin de journée (vitamine C)	
ACTIBIL	artichaut + fumeterre		160 mg / 160 mg	gélule				?	?	A administrer avant les repas avec un grand verre d'eau.	
ACTICARBINE	charbon activé + papavérine		70 mg / 14 mg	comprimé enrobé						A avaler tel quel avec un verre d'eau.	
ACTIFED ALLERGIE	cétirizine		10 mg	cp pelliculé sécable						A avaler avec un peu d'eau. Préférez Zyrtec® solution buvable ou Virlix® suspension buvable.	
ACTIFED JOUR ET NUIT	cp jour : paracétamol + pseudoéphédrine		500 mg / 60 mg	comprimé						Comprimés à avaler tels quels avec un grand verre d'eau.	
	cp nuit : paracétamol + diphénhydramine		500 mg / 25 mg	comprimé							
ACTIFED RHUME	paracétamol + pseudoéphédrine + triprolidine		500mg/60mg/2,5mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ACTIFEDDUO LP RHINITE ALLERGIQUE	cétirizine + pseudoéphédrine		5 mg / 120 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
ACTIQ	citrate de fentanyl		200 µg	sucette							A administrer en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer , ni écraser : laissez fondre contre la face interne de la joue Alternative : la solution nasale de fentanyl, le comprimé sublingual d'Abstral®, la sucette d'Actiq®, le patch transdermique de Durogesic® ou les sprays d'Instanyl® ou de PecFent®
			400 µg	sucette							
			600 µg	sucette							
			800 µg	sucette							
			1 200 µg	sucette							
			1 600 µg	sucette							
ACTISKENAN	sulfate de morphine		5 mg	gélule							Ouverture des gélules possible mais sans écraser les microgranules : mélangez avec des aliments semi-solides (purée, compote, yaourt, confiture) Granules administrables par sonde entérale de diamètre ≥ 2,5 mm : rinçage de la sonde avec 10 à 50 ml d'eau
			10 mg	gélule	 						
			20 mg	gélule	 						
			30 mg	gélule	 						
ACTISOUFRE	saccharomyces cerevisiae + sulfure de sodium		4 mg / 50 mg (10 ml)	susp. buvable							
ACTIVAROL	glycine + L-aspartate		500 mg / 1 g (10 ml)	solution buvable							A administrer aux principaux repas, dans un verre d'eau
ACTIVELLE	estradiol + noréthistérone		1 mg / 0,5 mg	cp pelliculé	  						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ACTIVOX EXPECTORANT	carbocistéine		750 mg (15 ml)	sirop							A administrer de préférence en dehors des repas
ACTIVOX LIERRE	lierre grimpant		50 mg (15 ml)	sirop							
			5 mg	cp pelliculé	 						A administrer de préférence 30' avant le netif déjeuner

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ACTONEL	acide risédronique	®	30 mg	cp pelliculé							A administrer de préférence 30 min avant le petit déjeuner ou à la même heure tous les jours : 2 h avant ou après toute prise d'aliments, de médicaments ou de solutions buvables autre que de l'eau plate à teneur faible en calcium et magnésium Ne pas croquer, ni écraser : irritation oro-pharyngée Ne pas s'allonger pendant 30 minutes
			35 mg	cp pelliculé							
			75 mg	cp pelliculé							
ACTONEL COMBI	acide risédronique + carbonate de calcium + vitamine D ₃		35mg / 1000mg / 880UI	granulés effervescents							Comprimé et granulés à avaler sans croquer ou laisser fondre, avec un grand verre d'eau plate, en position assise ou debout
			35mg / 1000mg / 880UI	cp pelliculé							
ACTOS	pioglitazone	®	15 mg	comprimé		?	?		?		A administrer pendant ou en dehors des repas
		®	30 mg	comprimé		?	?		?		
ACTRON	acide acétylsalicylique + caféine + paracétamol		267mg / 40mg / 133mg	cp effervescent							Évitez la prise en fin de journée (caféine) A dissoudre complètement dans de l'eau sucrée ou non, du lait ou du jus de fruit : dégazez la solution
ACUILIX	quinapril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp pelliculé sécable							A administrer avant, pendant ou après les repas
ACYGIL	canneberge + hibiscus + pissenlit		100mg / 200mg / 14,5mg	comprimé							A administrer avec un verre d'eau
ADALATE	nifédipine	®	10 mg	capsule molle							A administrer à distance des repas Ne pas croquer, ni écraser le comprimé à libération prolongée Le contenu de la capsule peut être administré par voie sublinguale ou nasale : administration immédiate Préférez la solution buccale de Nifédipine®
ADALATE LP	nifédipine		20 mg	comprimé							
ADANCOR	nicorandil	®	10 mg	cp bisécable							
		®	20 mg	comprimé							
ADARTREL	ropinirole		0,25 mg	cp pelliculé							A administrer au cours du repas pour améliorer la tolérance gastro-intestinale, moins de 3 h avant le coucher Ne pas croquer, ni écraser
			0,5 mg	cp pelliculé							
			2 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			2 mg	cp pelliculé							
ADCIRCA	tadalafil		20 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser
ADDITIVA MAGNESIUM	magnésium		300 mg	granulés							Laisser fondre les granulés sur la langue, sans boire d'eau avec
ADDITIVA MAGNESIUM & VITAMINE B	magnésium + vitamines B ₁ + B ₂ , B ₆ + B ₁₂		150 mg/ 1,4 mg/1,6 mg/ 2 mg/1 µg	cp effervescent							Dégazez la solution
ADDITIVA MULTI-VITAMINES	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₆ + B ₁₂ + C + E + PP + B ₅ + B ₉ + B ₈ + calcium + magnésium + fer + zinc + cuivre + sélénium		800µg/1,4mg/ 1,6mg/2mg/1µg / 60mg/3mg/18mg/ 6mg/200µg/ 0,15mg/120mg/ 45mg/2,1mg/ 4,5mg/0,5mg/ 5 µg	cp effervescent							Dégazez la solution
ADDITIVA VISIO-FORCE	vitamines A + B ₂ + C + E + zinc + cuivre + sélénium + lutéine + zéaxanthine + polyphénols		800µg/2,4mg/ 18mg/30mg/15mg/ 1200µg/50µg/ 5,6mg/0,2mg/ 25mg	comprimé enrobé		?	?		?		
ADDITIVA VITAL & GINSENG	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₆ + B ₁₂ + C + E + B ₅ + B ₉ + B ₈ + niacine + calcium + chlorure + fer + potassium + cuivre + magnésium + phosphore + sélénium + zinc + ginseng		800µg/1,4mg/ 1,6mg/2mg/ 1µg/60mg/10mg/ 6mg/200µg/150µg/ 18mg/162mg/ 36,4mg/7mg/ 40mg/1000µg/ 45mg/120mg/ 50µg/10mg/ 60mg	comprimé		?	?		?		
ADENA C	acide désoxyribonucléique + vitamine C		160 mg / 500 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
ADENURIC	febuxostat		80 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas
			120 mg	cp pelliculé		?	?		?		
ADENYL	adénosine monophosphate		60 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ADEPAL	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		0,15 mg / 0,03 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,2 mg / 0,4 mg	comprimé enrobé							
ADIARIL	glucides + sodium + potassium + citrates		26g/60mmol/20mmol/10mmol (par litre)	poudre orale et entérale							Solution de réhydratation orale à diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
ADIAZINE	sulfadiazine		500 mg	comprimé							Principe actif amer : à mélanger à du jus de fruit, du yaourt ou de la purée : broyage possible si administration par sonde entérale
ADIPODIET	préparation hyperprotéinée, hypocalorique appauvrie en glucides et en lipides, riche en fibres, vitamines et sels minéraux		74 kcal / 25 g	poudre orale 3 saveurs sucrées 3 saveurs salées							Versez la poudre dans un grand bol et ajoutez progressivement 20 à 30 ml d'eau froide ou de lait écrémé 0% en remuant énergiquement avec une fourchette, ajoutez ensuite une quantité d'eau variable suivant la préparation désirée tout en continuant à tourner
ADIXONE	fludrocortisone		50 µg	cp bisécable							A avaler avec de l'eau Ecrasement possible : comprimé insoluble dans l'eau, à dissoudre dans du jus de fruit : administration immédiate
ADROVANCE	acide alendronique + vitamine D ₃		70 mg / 70 µg	comprimé							A administrer au moins 30' avant toute prise d'aliments, de médicaments ou de solutions buvables A absorber avec au moins 200 ml d'eau non minéralisée Ne pas croquer , ni écraser
			70 mg / 140 µg	comprimé							
ADVAGRAF LP	tacrolimus		0,5 mg	gélule							A administrer le matin, en une prise Ne pas ouvrir, ni croquer , ni écraser : gélules à libération prolongée Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			1 mg	gélule							
			3 mg	gélule							
			5 mg	gélule							
ADVIL	ibuprofène		20 mg / ml	susp. buvable							
			100 mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			200 mg	comprimé enrobé							<p>A administrer au cours des repas Ne pas croquer, ni écraser (goût très désagréable, peu soluble dans l'eau) Préférez la suspension pédiatrique buvable ou Nureflex® suspension buvable ou le comprimé effervescent d'Advileff® (dégazez la solution) - Faire boire de l'eau après l'absorption de la solution</p> <p> femme enceinte</p>
			400 mg	comprimé enrobé							
ADVIL CAPS	ibuprofène		200 mg	capsule molle							
			400 mg	capsule molle							
ADVILEFF			200 mg	cp effervescent							
ADVIL TAB	ibuprofène		200 mg	comprimé		?	?		?		
			400 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
AERIUS	desloratadine		0,5 mg / ml	solution buvable							
			5 mg	cp pelliculé							
			5 mg	cp orodispersible							
AFFINEX MINCEUR	fucus + orthosiphon + reine des prés		120mg/100mg/80mg	comprimé enrobé		?	?		?	A avaler avec de l'eau	
AFINITOR	évérolimus		5 mg	comprimé							
			10 mg	comprimé							
AFINITOR EVEROLIMUS ATU	évérolimus		5 mg	comprimé							
			10 mg	comprimé							
AFTOSIUM	borax + magnesia carbonica + mercurius cyanatus + sulfuricum acidum		0,53mg/0,53mg/0,53mg/0,53mg	cp sublingual							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
AGIOLAX	ispaghul + séné		2,6 g / 0,5 g	granulés							A administrer à la fin du repas du soir
AGOMELATINE ATU	agomélatine		5 mg	comprimé		?	?		?		
AGRAM	amoxicilline		125 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer pendant ou entre les repas Comprimé à avaler directement avec un verre d'eau ou après dispersion dans de l'eau Préférer la poudre orale
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg	gélule							
	1 g	cp dispersible									
AGRELIN	anagrélide		0,5 mg	gélule							Impossible
AGYRAX	méclozine		25 mg	comprimé sécable							A administrer avant le repas avec de l'eau ou une solution buvable non alcoolisée Ne pas croquer, ni écraser
AKINETON LP	bipéridène		4 mg	comprimé enrobé							Prise matinale unique, en dehors des repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée
AL 110	lait diététique sans lactose, enrichi en nucléotides		400 g* (280kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Aliment de substitution du lait sans lactose en cas d'APLV, dès la naissance
ALAIRGIX	cétirizine		10 mg	comprimé à sucer							A administrer au cours des repas Comprimé à laisser fondre sous la langue ou à dissoudre dans un peu d'eau
ALANINE L PH	alanine		2 g	poudre orale							
ALBURONE POUDRE	complément alimentaire oral hyperprotidique		87 g / 100 g	poudre orale et entérale							Alimentation modulaire protidique A saupoudrer sur un aliment ou à diluer dans un liquide
ALCAPHOR	citrate dipotassique + citrate disodique + trométamol		543mg/4,12g/238mg	solution buvable							A administrer, par petites gorgées, au cours des repas, pure ou diluée dans un peu d'eau
ALCOVER ATU	oxybate de sodium		24,5 g / 140 ml	solution buvable							
ALDACTAZINE	altizide + spironolactone		15 mg / 25 mg	cp pelliculé sécable							
ALDACTONE	spironolactone		25 mg	cp pelliculé sécable							A administrer au cours du repas (goût désagréable) Insoluble dans l'eau : à mettre en suspension dans l'eau ou à mélanger dans les aliments
			50 mg	cp pelliculé sécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			75 mg	cp pelliculé sécable							
ALDIREK	cétirizine		10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer avec de l'eau Préférez Cétirizine ou Zyrtec® solution buvable ou Virlix® suspension buvable
ALDOMET	méthyl dopa		250 mg	comprimé enrobé	 						A utiliser rapidement : sensible à l'oxydation A administrer le soir lors de l'augmentation des posologies : risque de sédation
			500 mg	comprimé enrobé	 						
ALENDRONATE	acide alendronique		10 mg	comprimé							A administrer à jeun avec un grand verre d'eau non minéralisée (pas d'eau minérale ou contenant du bicarbonate), au moins 30' avant le premier repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser Ne pas s'allonger
ALENDRONIQUE ACIDE	acide alendronique		10 mg	comprimé							
ALEPSAL	phénobarbital + caféine		15 mg / 3,6 mg	comprimé							A administrer en une seule prise, au coucher Enfant de moins de 6ans : comprimé écrasé et mélangé aux aliments (risque de fausses routes) Comprimés très durs à écraser
			50 mg / 12,5 mg	comprimé							
			100 mg / 25 mg	comprimé							Préférez Kaneuron® en solution buvable (mais absence de caféine : risque de somnolence)
			150 mg / 87,5 mg	comprimé							femme enceinte
ALEVETABS	naproxène		220 mg	cp pelliculé							Comprimé à avaler tel quel au cours du repas
ALFA AMYLASE	α amylase		3 000 UI	comprimé enrobé							Comprimé à avaler tel quel avec un verre d'eau Préférez le sirop pédiatrique
			200 U. CEIP/ ml	sirop							
ALFACALCIDOL	alfacalcidol		0,25 µg	capsule molle							Capsules à avaler, avec un peu d'eau, sans sucer, croquer ou mâcher
			1 µg	capsule molle							
ALFARE	hydrolysat de protéines enrichi en TCM, taurine, carnitine ; sans lactose, sans saccharose, sans gluten et sans fibres		400 g (492kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de 4,8 g de poudre à 30 ml d'eau : utilisation immédiate Diète semi-élémentaire pour la réalimentation des nourrissons dans les situations à risque

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ALFATIL	céfaclor	®	125 mg (5 ml)	poudre orale							A administrer juste après un repas ou au maximum 1 h après Ne pas écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la poudre orale → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
			250 mg (5 ml)	poudre orale							
		®	250 mg	gélule							
ALFATIL LP	céfaclor		375 mg	cp pelliculé	 						
			500 mg	cp pelliculé	 						
ALFUZOSINE	alfuzosine		2,5 mg	comprimé							A administrer immédiatement après le repas
ALFUZOSINE LP	alfuzosine		10 mg	comprimé	 						A administrer immédiatement après le repas Ne pas écraser : comprimé à libération prolongée
ALGICALM	paracétamol + codéine		400 mg / 25 mg	comprimé							A administrer immédiatement après le repas
ALGICUIVRE	glucosamine + chondroïtine + reine des prés + cuivre		375mg/100mg/75mg250µg	cp pelliculé sécable							Ne pas croquer , ni écraser
ALGIFENE	ibuprofène		200 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser (gout très désagréable, peu soluble dans l'eau) Préférez solution buvable d'Advil® ou Ibuglic® comprimé effervescent ou Nureflex® suspension buvable : bien agiter avant l'emploi - Faire boire de l'eau après l'absorption de la solution femme enceinte
ALGINATE BICAR SODIUM	alginate de sodium + bicarbonate de sodium		250 mg / 133,5 mg (5ml)	susp. buvable							A administrer après les repas et éventuellement au coucher
ALGISEDAL	paracétamol + codéine		400 mg / 25 mg	cp effervescent							Dégazer la solution
ALHYDRATE	glucides + sodium + potassium + citrates		82,5g/60mmol/20mmol/18mmol (par litre)	poudre orale et entérale							Solution de réhydratation orale à diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
ALINIA ATU	nitazoxanide		100 mg / 5 ml	susp. buvable							Préférez la suspension buvable
			500 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ALITRAQ	mélange immuno-enrichi		300 ml (300 kcal)	solution buvable							Complément alimentaire oral ou mélange de nutrition entérale
ALKA SELTZER	acide acétylsalicylique + acide citrique + bicarbonate de sodium		324mg/965mg/1625mg	cp effervescent							A administrer immédiatement après dissolution Dégazez la solution
ALKERAN	melphalan		2 mg	cp pelliculé							A administrer 15 à 30 minutes avant les repas Ne pas écraser le comprimé : cytotoxique femme enceinte
ALKONATREM	déméclocycline		150 mg	gélule				? ?			A administrer en dehors d'un repas
ALLERGEFON	carbinoxamine		2 mg	comprimé enrobé		? ?		? ?			Evitez d'associer la prise d'alcool
ALLERNOVA AR	hydrolysate de protéines		400 g	poudre orale et entérale							Aliment diététique pour les nourrissons et enfants en bas âge présentant une APLV
ALLI	orlistat		60 mg	gélule				? ?			A administrer avec de l'eau, immédiatement avant, au cours ou jusqu'à une heure après un repas contenant des graisses
ALLOPURINOL	allopurinol		100 mg	comprimé							Comprimés et capsules à avaler tels quels après les repas
			100 mg	capsule molle							
			200 mg	comprimé							
			200 mg	capsule molle							
			300 mg	comprimé							
			300 mg	capsule molle							
ALMOGRAN	almotriptan		12,5 mg	cp pelliculé	 	? ?	? ?	? ?			A administrer avec de l'eau, avec ou sans nourriture
ALPHA RENOL	prêle + maïs genévrier + chiendent		450mg/450mg/450mg	solution buvable							Solution à diluer dans un verre d'eau ou une tisane
ALPHA-TOCOPHEROL - ACIDE FOLIQUE PH	vitamines E + B ₉		15 mg / 0,05 mg	gélule				? ?			
ALPRAZOLAM	alprazolam		0,25 mg	comprimé sécable	 						
			0,5 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			0,5 mg	sécable							
			1 mg	comprimé sécable							
ALPRESS LP	prazosine		2,5 mg	cp osmotique							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez Minipress® comprimé à 1 ou 5 mg ou Eupressyl® gélule à 30 mg → <i>adaptation de la nosologie (verte de l'effet retard)</i>
			5 mg	cp osmotique							
ALTEIS	olmésartan		10 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			20 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			40 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
ALTEISDUO	olmésartan + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer tous les jours à la même heure, pendant ou en dehors des repas femme enceinte
			20 mg / 25 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			40 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			40 mg / 25 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
ALTOCEL	lopéramide		2 mg	gélule						Préférez la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg	
ALUMINE HYDROXYDE	hydroxyde d'alumine		1 g	gélule							
ALVITYL	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + E + B ₈ + B ₉ + magnésium + zinc + fer		400µg/0,7mg/0,8mg/3mg/1mg/0,0005mg/9mg / 30m/0,0025mg/5mg/0,075mg (5 ml)	sirop						Les comprimés peuvent être croqués ou sucés : goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale, mais administration immédiate car photosensible Préférez la forme sirop	
ALVITYL PLUS	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + E + B ₈ + B ₉ + magnésium + zinc + fer		1,6mg/1,4mg/1,6mg/6mg/2mg/0,001mg/18mg	comprimé enrobé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
AMARANCE	lévonorgestrel + éthinylestradiol		0,05 mg / 0,03 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,075mg/0,04mg	comprimé							
			0,125mg/0,03mg	comprimé							
AMAREL	glimépiride		1 mg	comprimé							Comprimés à avaler entiers avant ou pendant un repas
			2 mg	comprimé							
			3 mg	comprimé							
			4 mg	comprimé							
AMBROXOL	ambroxol		3 mg / ml	solution buvable	 						Préférez la solution buvable
			6 mg / ml	solution buvable							
			30 mg	comprimé		?	?		?		
			30 mg	comprimé sécable		?	?		?		
AMBROXOL sans sucre	ambroxol		6 mg / ml	solution buvable							
AMILORIDE HCTZ	amiloride + hydrochlorothiazide		5 / 50 mg	cp bisécable							Goût amer : administrable par sonde ou mélangé à des aliments pauvres en potassium Ne pas administrer avec des sels de potassium
AMIODARONE	amiodarone		200 mg	comprimé sécable	 						Goût amer : administrable par sonde ou mélangé à des aliments pauvres en potassium Ne pas administrer avec du pamplemousse ou des sels de potassium
AMISULPRIDE	amisulpride		100 mg	comprimé sécable	 						Ne pas croquer ni écraser
			200 mg	comprimé sécable	 						
			400 mg	cp pelliculé sécable	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
AMLODIPINE	amlodipine		5 mg	gélule							Ouvrir la gélule pour une administration par sonde
			10 mg	gélule							
AMLOR	amlodipine		5 mg	gélule							
			10 mg	gélule							
AMMONAPS	phénylbutyrate de sodium		500 mg	comprimé							Comprimés à administrer avec un grand volume d'eau Granulés peuvent être mélangés à aliment solide (purée, compote) ou à un liquide (eau, jus de fruit, préparation infantile sans protéines)
			940 mg / g	granulés							
AMODEX	amoxicilline		100 mg / ml	poudre orale							A administrer pendant ou entre les repas Préférez la poudre orale ou le comprimé dispersible
			250 mg	poudre orale							
			500 mg	gélule							
			1 g	cp dispersible							
AMOXICILLINE	amoxicilline		125 mg / 5 ml	poudre orale							Préférez la poudre orale ou le comprimé dispersible
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg	gélule							
			1 g	cp pelliculé dispersible							
			1 g	poudre orale							
AMOX/ AC CLAV	amoxicilline + acide clavulanique		100 mg / 30 ml	susp. buvable							A administrer de préférence en début de repas Préférez la suspension buvable ou la poudre orale
			100 mg / 12,5mg	poudre orale							
			500 mg / 62,5mg	cp pelliculé							
			1 g / 125 mg	poudre orale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
AMPECYCLAL	heptaminol		300 mg	gélule							Le contenu de la gélule peut être mélangé à un liquide ou un aliment
AMYLODIASASE	amylase végétale		69 mg	cp à croquer	 						A administrer après les 3 principaux repas ou au moment des troubles
ANADVIL	ibuprofène		200 mg	comprimé enrobé							A administrer de préférence au cours du repas Ne pas croquer ni écraser
ANADVIL RHUME	ibuprofène + pseudoéphédrine		200 mg / 30 mg	comprimé enrobé	 						Préférez solution buvable d'Advil® ou Nureflex® suspension buvable : bien agiter avant l'emploi - Faire boire de l'eau après l'absorption de la solution femme enceinte
ANAFRANIL	clomipramine		10 mg	comprimé enrobé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas
			25 mg	comprimé enrobé							
			75 mg	cp pelliculé sécable							
ANAMIX	mélange de L-AA sans phénylalanine ; supplémenté en tyrosine, acide α-linoléique, minéraux, vitamines et oligoéléments équivalent protéidique = 8,4 g		29 g (113kcal/sachet)	poudre orale et entérale goût neutre + 2 saveurs							Mélangez un sachet à 100 ml d'eau froide, bien agiter Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez les enfants de 1 à 10 ans
ANANDRON	nilutamide		50 mg	comprimé							A administrer en une ou plusieurs prises
			150 mg	comprimé							femme enceinte
ANASTROZOLE	anastrozole		1 mg	cp pelliculé	 						A administrer avec un verre d'eau, à heure fixe femme enceinte
ANAUSIN METOCLOPRAMIDE LP	métoclopramide		15 mg	comprimé							A administrer une ½ h avant le repas Impossible d'écraser : comprimé à libération prolongée Préférez le Primpéran® → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)
ANCOTIL	flucytosine		500 mg	comprimé sécable							Forme injectable à 1 % (flacon de 2,5 g) utilisable mélangée à de l'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ANDROCUR	cyprotérone		50 mg	comprimé sécable							
			100 mg	comprimé sécable							
ANGELIQ	drospirénone + estradiol		2 mg / 1 mg	cp pelliculé	 						Comprimé à avaler entier, avec un peu de liquide, pendant ou en dehors des repas
ANSATIPINE	rifabutine		150 mg	gélule							Inutile de tenir compte de l'horaire de la prise d'aliments Gélule ouvrable
ANTADYS	flurbiprofène		100 mg	cp pelliculé	 						Comprimé à avaler tel quel, de préférence au cours des repas
ANTALVIC	dextropropoxiphène		65 mg	comprimé sécable							A mélanger à de la compote ou du yaourt
ANTARENE	ibuprofène		20 mg / ml	susp. buvable							
			100 mg	cp pelliculé	 						A administrer de préférence au cours des repas Préférez la suspension buvable nourrisson
			200 mg	cp pelliculé							femme enceinte
			400 mg	cp pelliculé	 						
ANTARENE CODEINE	ibuprofène + codéine		200 mg / 30 mg	cp pelliculé	 						A administrer intact au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
			400 mg / 60 mg	cp pelliculé	 						femme enceinte
ANTAXONE ATU	naltrexone		50 mg / 10 ml	solution buvable							
ANTIGONE	désogestrel		75 µg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, avec de l'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ANTIGRIPPINE ASPIRINE	acide acétylsalicylique + vitamine C + caféine		500mg / 100mg / 10mg	comprimé		?	?		?		
ANTINERVEUX	lotier corniculé + mélilot		13,75mg / 6,25mg (X gouttes)	solution buvable	■		🍷		🍷		Solution à diluer dans un peu d'eau ou de tisane
ANXYREX	bromazépan		6 mg	cp quadriséable		?	?		?		
ANZEMET	dolasétron		200 mg	cp pelliculé		?	?		?	☹️	
AOTAL	acamprosate	■	333 mg	comprimé enrobé	■	🍷	🍷		🍷		A administrer à distance des repas si bonne tolérance digestive Ne pas écraser : comprimé gastrorésistant
APAISYL enfant	isothipendyl		4 mg	comprimé enrobé		🍷	🍷		🍷		A administrer le soir : effet sédatif
APAISYL	isothipendyl		12 mg	cp pelliculé	■	🍷	🍷		🍷		Comprimés broyés peuvent être mélangés à un yaourt ou des aliments plutôt sucrés Evitez la prise d'alcool
APAROXAL	phénobarbital		100 mg	comprimé sécable		?	?		?		A administrer en une seule prise au coucher Chez l'enfant : mélangez le comprimé écrasé à des aliments (risque de fausses routes)  femme enceinte
APHILAN	buclizine		25 mg	comprimé sécable	■	?	?		?		Privilégier la prise vespérale : effet sédatif
APHLOINE	aphloïa + hamamélis + viburnum + esculoside		0,125ml / 0,125ml / 0,1ml / 2mg (5 ml)	solution buvable	■		🍷		🍷		
APHTORAL	vitamine C + chlorhexidine + tétracaïne		3mg / 0,2mg / 52,5mg	comprimé à sucer		🍷	🍷		🍷		Comprimé à sucer lentement, sans croquer, à distance des repas
APILAXE enfant	sorbitol + guimauve		3,75 g / 150 mg (15 ml)	solution buvable			🍷		🍷		
APRANAX	naproxène	■	250 mg	granulés pour susp. buvable		🍷	🍷		🍷		A administrer au cours du repas Préférez la suspension buvable
			275 mg	cp pelliculé	■	🍷	🍷		🍷		
		■	500 mg	granulés pour susp. buvable		🍷	🍷		🍷		
			550 mg	cp pelliculé sécable	■	🍷	🍷		🍷		
			750 mg	comprimé	■	🍷	🍷		🍷		
		■	75 mg	cp pelliculé	■	🍷	🍷		🍷		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
APROVEL	irbésartan		75 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni écraser femme enceinte foeto-toxique
			150 mg	cp pelliculé							
			300 mg	cp pelliculé							
APTIVUS	tipranavir		100 mg / ml	solution buvable							Coadministrée avec le ritanavir la capsule doit être prise en présence de nourriture Préférez la solution buvable : utilisez la seringue doseuse à vider directement dans la bouche femme enceinte
			250 mg	capsule molle							
APURONE	fluméquine		400 mg	comprimé							
ARAVA	léflunomide		10 mg	cp pelliculé							Comprimés à avaler entiers avec une quantité suffisante de liquide Absorption non affectée par l'ingestion simultanée d'aliments femme enceinte
			20 mg	cp pelliculé							
			100 mg	cp pelliculé							
ARCALION	sulbutiamine		200 mg	comprimé enrobé							Comprimé à avaler tel quel avec un grand verre d'eau, aux repas du matin et de midi
ARCOXIA	étoricoxib		30 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas Si soulagement rapide nécessaire : efficacité plus précoce si administration sans aliments femme enceinte
			60 mg	cp pelliculé							
ARESTAL	lopéramide		1 mg	comprimé							Préférez la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
ARGININE	arginine		0,918 g (5 ml)	solution buvable							A administrer avant les repas Solution à diluer dans de l'eau ou le biberon
ARGINOTRI-B	arginine + vitamines B ₁ + B ₆		250mg/100mg/20mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni sucer : avaler tel quel avec de l'eau
ARHEMAPECTINE	acide galacturonique		280 mg / 20 ml	ampoule buvable							Solution à diluer dans de l'eau sucrée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ARICEPT	donépézil		5 mg	cp pelliculé	 						A administrer le soir, au coucher Comprimé dispersible à placer sous la langue pour désintégration avant d'être avalé avec ou sans eau selon préférence Goût amer des comprimés pelliculés : à mélanger à de la confiture ou de la compote : broyage possible si administration par sonde entérale
			5 mg	cp orodispersible							
			10 mg	cp pelliculé	 						
			10 mg	cp orodispersible							
ARIMIDEX	anastrozole		1 mg	cp pelliculé	 						A administrer le soir, au coucher Port de gants et de masque femme enceinte
ARINATE ATU	artésunate		100 mg	comprimé							
	artichaut		200 mg	gélule							A administrer avant les repas, avec un grand verre d'eau
	aubéline		350 mg	gélule							A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	bardane		350 mg	gélule							A administrer avant les repas, avec un grand verre d'eau
	boldo		260 mg	gélule							A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	bruyère		320 mg	gélule							
	busserole		350 mg	gélule							
	camiline		390 mg	gélule							
	cassis		340 mg	gélule							
	cerise (queue)		350 mg	gélule							A administrer entre les repas, avec un grand verre d'eau
	charbon activé		162 mg	gélule							
	chardon Marie		390 mg	gélule							A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	cupaline		445 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	éleuthérocoque		250 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ARKOGELULES	eschscholtzia		300 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas et au coucher, avec un grand verre d'eau
	fragon		350 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	fucus		130 mg	gélule	■			?	?		A administrer avant les repas, avec un grand verre d'eau
	fumeterre		220 mg	gélule	■			?	?		
	ginseng		390 mg	gélule	■			?	?		
	hamamélis		290 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	harpadol		435 mg	gélule	■			?	?		
	houblon		195 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment du repas du soir et au coucher, avec un grand verre d'eau
	huile de foie de morue		400 mg	gélule				?	?		
	kola		455 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	marronnier d'Inde		275 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	mate		220 mg	gélule	■			?	?		A administrer avant les repas, avec un grand verre d'eau
	mélisse		275 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	millepertuis		185 mg	gélule	■			?	?		A administrer toujours aux mêmes heures, avec un grand verre d'eau A éviter ou arrêter
	olivier		275 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	orthosiphon		325 mg	gélule	■			?	?		
	ortie		210 mg	gélule	■			?	?		A administrer avant les repas, avec un grand verre d'eau
	ortie racine		290 mg	gélule	■			?	?		
partenelle		260 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau	
passiflore		300 mg	gélule	■			?	?		A administrer avec un grand verre d'eau	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	pensée sauvage		290 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	piloselle		260 mg	gélule	■			?	?		
	pissenlit		325 mg	gélule	■			?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	prêle		250 mg	gélule	■			?	?		
	queues de cerise		350 mg	gélule	■			?	?		
	reine des prés		300 mg	gélule	■			?	?		
	sauge		285 mg	gélule				?	?		
	saule		260 mg	gélule				?	?		A administrer au moment des repas, avec un grand verre d'eau
	séné			gélule	■			?	?		
	sureau			gélule				?	?		
	tilleul		180 mg	gélule	■			?	?		
	valériane		270 mg	gélule				?	?		A administrer au moment du repas du soir et au coucher, avec un grand verre d'eau
	vigne rouge		270 mg	gélule	■			?	?		
AROLAC	lisuride		0,2 mg	cp bisécable	■						A administrer toujours au cours des repas pour améliorer la tolérance digestive Ne pas croquer, ni écraser
AROMASINE	exémestane	®	25 mg	comprimé enrobé	■						A administrer après les repas, avec de l'eau, à heure fixe  femme enceinte
ARPHOS	gluconate de magnésium		426 mg (10 ml)	solution buvable	■						
ART 50	diacérhéine	®	50 mg	gélule	■						Gélule à administrer telle quelle, sans ouvrir, au milieu des repas
ARTANE	trihexyphénidyle	■	2 mg	comprimé	■						Préférez la solution buvable
		■	5 mg	comprimé	■						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			4 mg / ml	solution buvable							
ARTANE LP	trihexyphénidyle		15 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée Préférez la solution buvable → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
ARTERASE	ail		20 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours du repas, avec de l'eau ou du yaourt Goût et odeur désagréables , broyage possible si administration par sonde
ARTEX	tertatolol		5 mg	comprimé enrobé sécable							A administrer le matin Administration immédiate
ARTHROCINE	sulindac		100 mg	comprimé							Comprimés à avaler tels quels au cours des repas
			200 mg	cp bisécable							femme enceinte
ARTOTEC	diclofénac sodique, misoprostol		50 mg / 0,2 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés gastrorésistants, le noyau des comprimés est entérosoluble
			75 mg / 0,2 mg	comprimé							
ASASANTINE LP	dipyramidole + acide acétylsalicylique		25 mg / 200 mg	gélule							A administrer au cours du repas avec de l'eau Gélule ouvrable mais sans remuer les microgranules gastro-résistants
ASCOFER	ascorbate ferreux		33 mg	gélule							Déconseillé d'administrer avant les repas
ASCORBATE DE CALCIUM	ascorbate de calcium		100 mg	poudre orale							Dissoudre la poudre dans un peu d'eau Granulés à croquer ou à dissoudre dans un verre d'eau
	ascorbate de calcium + vit C		435 mg / 43,5 mg	granulés							
ASPEGIC	acide acétylsalicylique		100 mg	poudre orale							femme enceinte
			250 mg	poudre orale							
			500 mg	poudre orale							
			1 g	poudre orale							
			100 mg	poudre orale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ASPIRINE	acide acétylsalicylique		300 mg	comprimé		?	?		?		Préférez la poudre orale Dégagez les présentations effervescentes  femme enceinte
			325 mg	gélule							
			500 mg	poudre orale							
			500 mg	comprimé							
			500 mg	cp effervescent							
			500 mg	cp à croquer	 						
			1 g	poudre orale							
			1 g	cp effervescent sécable							
ASPIRINE pH 8	acide acétylsalicylique		500 mg	comprimé enrobé						A administrer tel quel avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit, de préférence au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimé gastrorésistant  femme enceinte	
ASPIRINE VITAMINE C	acide acétylsalicylique + vitamine C		330 mg / 200 mg	cp effervescent sécable						 femme enceinte	
ASPIRISUCRE	acide acétylsalicylique		400 mg	cp à croquer						Comprimé à croquer puis avaler avec un grand verre d'eau  femme enceinte	
ASPRO	acide acétylsalicylique		320 mg	cp effervescent						Ne pas croquer , ni écraser le comprimé simple : à avaler tel quel avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit Dégagez les présentations effervescentes  femme enceinte	
			500 mg	comprimé							
			500 mg	cp effervescent							
ASPRO ACCEL	acide acétylsalicylique + caféine		500 mg / 50 mg	comprimé sécable		?	?		?	 femme enceinte	
ASPRO VITAMINE C	acide acétylsalicylique + vitamine C		500 mg / 300 mg	cp effervescent						Dégagez la solution  femme enceinte	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ATACAND	candésartan		4 mg	comprimé sécable							A administrer au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
			8 mg	comprimé sécable							
			16 mg	comprimé sécable							
			32 mg	comprimé sécable							
ATARAX	hydroxyzine		2 mg / ml	sirop							Goût désagréable mais comprimés éventuellement broyables pour une utilisation par sonde Préférez la forme sirop : 1 cuillère à café = 10 mg 1 cuillère à soupe = 30 mg
			25 mg	cp pelliculé sécable							
			100 mg	cp pelliculé sécable							
ATAZANAVIR	atazanavir		200 mg	gélule				?	?	femme enceinte	
ATENOLOL	aténolol		50 mg	comprimé sécable							A administrer de préférence le matin, avec une solution buvable
			100 mg	comprimé sécable							
ATEPADENE	adénosine triphosphate		30 mg	gélule				?	?		
ATHYMIL	miansérine		10 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher : la molécule est anesthésique au contact des muqueuses = broyage possible si aucun contact avec les muqueuses : administration uniquement par sonde entérale et immédiate
			30 mg	cp pelliculé							
			60 mg	cp pelliculé sécable							
ATORVASTATINE	atorvastatine		10 mg	cp pelliculé							A administrer en une prise unique, au cours ou en dehors d'un repas
			20 mg	cp pelliculé							
			40 mg	cp pelliculé							
			80 mg	cp pelliculé							
ATOXXX	isomyrtol + pholcodine		18 mg / 20 mg	capsule molle						Préférez la forme sirop	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ATOUXX toux sèche	pholcodine		1,2 mg / ml	sirop	■		☞		☞		
ATRICAN	ténonitrozole		250 mg	capsule molle		☞		☞	☞		Ne pas croquer, ni écraser : capsule gastro-résistante
ATRIPLA	efavirenz + emtricitabine + ténofovir	■	600mg/200mg/245mg	comprimé		☞	☞		☞		A administrer à jeun, avec de l'eau, de préférence le soir Préférez Sustiva® en solution buvable + Truvada® en comprimé ⚠ femme enceinte
ATUXANE	dextrométhorphan		10 mg / 5 ml	sirop	■		☞		☞		
AUGMENTIN	amoxicilline + acide clavulanique	®	100 mg / 12,5 mg	poudre orale	■		☞		☞		A administrer au début du repas Évitez la prise simultanée de lait Préférez la forme poudre orale - Bien rincer la sonde
			250 mg / 31,25mg	poudre orale			☞		☞		
			500 mg / 62,5 mg	poudre orale			☞		☞		
			500 mg / 62,5 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		
			1 g / 125 mg	poudre orale			☞		☞		
AUXITRANS	pentaérythritol		5 g	poudre orale			☞		☞		A administrer avant les repas, diluée dans de l'eau
AVADENE	estradiol + gestodène		1 mg / 0,025 mg	comprimé	■	☞	☞		☞		A administrer au cours des repas, ou à heures fixes en dehors des repas Ne pas croquer, ni écraser
AVLOCARDYL	propranolol		40 mg	cp quadrisécable		☞	☞		☞		A administrer au cours du repas Remplaçable par la solution buvable de Syprol® (en ATU)
AVLOCARDYL LP	propranolol	■	160 mg	gélule	■	☞		☞	☞		A administrer le matin Gélule ouvrable mais sans écraser les microgranules
AVODART	dutastéride	®	0,5 mg	capsule molle	■	☞		☞	☞		A administrer telle quelle au cours ou en dehors d'un repas ⚠ femme enceinte
AXELER	olmesartan + amlodipine		20 mg / 5 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			40 mg / 5 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		
			40 mg / 10 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
AZADOSE	azithromycine		600 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours du repas pour une meilleure tolérance digestive
AZANTAC	ranitidine		75 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors du repas Ne pas croquer , ni écraser les comprimés pelliculés Préférez les comprimés effervescents : dégazez la solution
			75 mg	cp effervescent							
			150 mg	cp pelliculé							
			150 mg	cp effervescent							
			300 mg	cp pelliculé							
			300 mg	cp effervescent							
AZATHIOPRINE	azathioprine		50 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser
			250 mg	cp pelliculé sécable	 						femme enceinte
AZILECT	rasagiline		1 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas
AZITHROMYCINE	azithromycine		250 mg	cp pelliculé	 						
BABYBIO 1	préparation lactée pour nourrisson issue de l'agriculture biologique		900 g * (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée tiédie à 40°C maximum Pour les nourrissons non allaités jusqu'à 6 mois ou au moment du sevrage
BABYBIO 2	préparation lactée de suite		900 g * (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée tiédie à 40°C maximum Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage, de 6 mois à 1 an
BABYBIO CEREALES CACAO	farines biologiques de riz et de quinoa au cacao		220 g	poudre orale et entérale							Mélangez 4 à 7 mesurettes de poudre à 210 ml de lait tiède (lait maternel ou lait de suite), agitez Pour les nourrissons à partir de 8 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BABYBIO CEREALES LEGUMES	farines biologiques de riz et de quinoa aux légumes		250 g	poudre orale et entérale							Mélangez 2 à 3 mesurette de poudre à 210 ml de lait tiède (lait maternel ou lait de suite), agitez Pour les nourrissons à partir de 6 mois
BABYBIO CEREALES 3 FRUITS	farines biologiques de riz et de quinoa aux fruits		220 g	poudre orale et entérale							
BABYBIO CEREALES VANILLE	farines biologiques de riz et de quinoa		220 g	poudre orale et entérale							
BABYBIO CROISSANCE BIO	lait de croissance enrichi en probiotiques		900 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 meurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée tiédie à 40°C maximum Pour les nourrissons à partir de 10 mois
BACILOR	lactobacillus casei var rhamnosus		1,5 g	poudre orale							A administrer en dehors des repas Avaler la gélule sans l'ouvrir avec un verre d'eau Préférez la poudre orale diluée dans de l'eau sucrée ou du lait
			250 mg	gélule							
BACLOFENE	baclofène		10 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas avec un verre d'eau
BACTERIX	nifuroxazide		200 mg	gélule							Le contenu de la gélule peut être administré avec de l'eau
BACTOX	amoxicilline		125 mg / 5 ml	poudre orale							Préférez la poudre orale
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg	gélule							
			1 g	poudre orale							
BACTRIM	cotrimoxazole + sulfaméthoxazole - triméthoprime		40 mg / 200 mg	susp. buvable							A administrer au cours d'un repas Préférez la suspension buvable 1 cp à 160 mg ↔ 4 cuillérées-mesures
			80 mg / 400 mg	cp bisécable							
BACTRIM FORT	cotrimoxazole + sulfaméthoxazole - triméthoprime		160 mg / 800 mg	comprimé							
BARACLUDE	entécavir		0,05 mg / ml	solution buvable							A administrer en une prise, à jeun ou au cours d'un repas Préférez la solution buvable femme enceinte
			0,5 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			1 mg	cp pelliculé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BASDENE	benzylthiouracile		25 mg	comprimé							A administrer au cours du repas
BAYPRESS	nitrendipine		10 mg	comprimé							La prise simultanée de pamplemousse peut augmenter les effets du Baypress®
			20 mg	comprimé							
BCAD1	mélange d'acides aminés sans leucine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels			poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Indiqué de la naissance à 18 mois si leucinose
BCAD2				poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Indiqué après 18 mois et chez l'adulte si leucinose
B CHABRE	vitamines B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + PP		100mg/50mg/ 50mg/50mg/ 25mg/50mg	comprimé enrobé							Comprimé écrasable pour les sondes, mais enlever le pelliculage qui masque le goût désagréable de la vitamine B ₁ et empêche la coloration des muqueuses par la vitamine B ₁₂
BEAGYNE	fluconazole		150 mg	gélule				?	?		
BECILAN	vitamine B ₆		250 mg	comprimé sécable							
BECOZYME	vitamines B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + PP		15mg/15mg/ 25mg/10mg/ 50mg	comprimé enrobé							Comprimé écrasable pour les sondes, mais enlever le pelliculage qui masque le goût désagréable de la vitamine B ₁ et empêche la coloration des muqueuses par la vitamine B ₁₂
BEDELIX	montmorillonite beidellitique		3 g	poudre orale							A administrer avant le repas, diluée dans de l'eau ou mélangée à un aliment
BEFIZAL	bézo-fibrate		200 mg	cp pelliculé							A administrer de préférence au cours du repas du soir Préférez Lipanthyl® gélule à 200 mg → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)
BEFIZAL LP	bézo-fibrate		400 mg	comprimé enrobé							
BEFLAVINE	vitamine B ₂		10 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni sucer, à avaler tel quel avec de l'eau
BELANETTE	éthinyloestradiol + drospirénone		0,02 mg / 3 mg	comprimé							A administrer avec de l'eau, à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
BELARA	chlormadinone + éthinyloestradiol		2 mg / 0,03 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe le soir, avec éventuellement un peu d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BELLAFIT ATU	sulfate d'atropine		0,5 mg/ml	solution buvable							
BELUSTINE	lomustine		40 mg	gélule							Ne pas écraser, ni ouvrir : cytotoxique et irritant pour les muqueuses femme enceinte
BENAZEPRIL	bénazépril		5 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer en une prise en dehors ou au cours d'un repas Les aliments retardent l'absorption
			10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
BENAZEPRIL HCTZ	bénazépril + hydrochlorothiazide		10 mg / 12,5 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
BENEMIDE	probénécide		500 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas mélangé à un aliment ou dissous dans un liquide Broyage possible
BENERVA	vitamine B ₁		250 mg	comprimé enrobé							Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale
BENZBROMARONE	benzbromarone		100 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser
BENZNIDAZOL ATU	benznidazole		100 mg	comprimé		?	?		?		
BEPANTHENE	dexpanthénol		100 mg	comprimé							
BEROCCA	vitamines C + B ₉ + B ₈ + B ₁₂ + PP + B ₆ + B ₂ + B ₁ + calcium + magnésium + zinc		500mg/0,4mg/0,15mg/0,01mg/50mg/10mg/15mg/14,565mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer le matin avec de l'eau Dégagez la solution effervescente
				cp effervescent							
BETA ADALATE	aténolol + nifédipine		50 mg / 20 mg	gélule	 			?	?		Ne pas y associer la prise de pamplemousse, ni de laitages
BETAHISTINE	bétahistine		8 mg	comprimé							A administrer tel quel au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser
			24 mg	comprimé							
			0,5 mg / ml (30 ml)	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BETAMETHASONE	bétaméthasone		0,5 mg	comprimé		?	?		?		Préférez la solution buvable ou le comprimé dispersible
			2 mg	cp dispersible bisécable	■						
BETASELEN	vit C + β-carotène + sélénite de sodium + ascorbate de sodium + zinc		200mg/30mg / 0,22mg/200mg / 25mg	gélule							
BETASERC	bétahistine	®	24 mg	comprimé							A administrer tel quel au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser
BETATOP	aténolol		50 mg	cp pelliculé sécable	■						A administrer en une prise le matin, avec un liquide
			100 mg	cp pelliculé sécable	■						
BETHANECHOL PH	bétanéchol	■	1 mg	comprimé							
BETNESOL	bétaméthasone	■	0,5 mg	cp effervescent							Dégazez la solution
BEVITINE	vitamine B ₁	■	250 mg	comprimé enrobé	■						Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
BF 2649 ATU	pitolisant		20 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		
BICALUTAMIDE	bicalutamide	■	50 mg	cp pelliculé	■	?	?		?		A administrer à heure fixe, avec un verre d'eau femme enceinte
BICARBONATE DE POTASSIUM PH	bicarbonate de potassium	■	1 g	gélule							
BICARBONATE SODIUM	bicarbonate de sodium		250 mg	poudre orale							😊 Forme injectable également utilisable dans la sonde entérale
			500 mg	gélule							
BICIRKAN	petit houx + hespéridine + vitamine C		80mg/200mg / 400mg	cp pelliculé	■						A avaler tel quel avec de l'eau, au cours d'un repas
BI CITROL	citrate diacide de sodium + citrate de sodium		1 g / 0,66 g	granulés							Granulés à croquer ou à diluer dans un ½ verre d'eau
BIFIX	nifuroxazide		200 mg	gélule				?	?		
BILASKA	bilastine		20 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer avec de l'eau, de préférence en une seule prise, à jeun : 1 à 2 heures avant ou après de jus de fruits ou de nourriture

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BILTRICIDE	praziquantel		600 mg	cp quadri sécable							A administrer après le repas avec un liquide Ne pas croquer , ni écraser, peut causer des nausées et des vomissements
BI MISSILOR	métronidazole + spiramycine		1,5 MUI/250 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours du repas
BIOCALYPTOL	pholcodine		131 mg / 100 ml (6,55 mg / 5 ml)	sirop							
BIOCARDE	aubépine + passiflore + pulsatille + muguet + avena sativa + valériane + cactus		0,17ml/0,11ml/0,066ml/0,066ml/0,166ml/0,166ml (ml)	solution buvable							
BIO CUIVRE MANGANESE	cuiivre + manganèse		5,033mg/0,565mg	capsule molle							A administrer le matin à jeun ou en dehors d'un repas
BIODALGIC	tramadol		50 mg	cp effervescent							Dégazez la solution
BIOFAR MULTIVITAMINES	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + E + B ₈ + B ₉ + calcium + magnésium + zinc + iode		400µg/0,7mg/0,8mg/3mg/1mg/0,005mg/9mg/30mg/0,0025mg/5mg/0,075mg/0,100mg/125mg/60,7mg/2,5m/0,1mg	cp effervescent							Dégazez la solution
BIOLACTYL	ferments lactiques vivants		≥ 1 milliard de germes	poudre orale							A administrer à jeun ou avant un repas, avec un verre d'eau
BIOPEG	macrogol 4 000		64 g / l	solution buvable							A administrer par voie orale ou par sonde gastrique
BIO SELENIUM	vitamine C + germe de blé + sélénium		1,8mg/122,7mg/30mg	capsule molle							
BIOTINE	vitamine B ₈		5 mg	comprimé							
BIOTONE	manganèse + kola + acide phosphorique		0,028g/3,36g/0,28g (10 ml)	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, diluée dans de l'eau
BIPERIDYS	dompéridone		20 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer avant un repas Ne pas croquer , ni écraser
BIPRETERAX	indapamide + périndopril		1,25 mg / 4mg	comprimé							A administrer en une prise matinale, avant le repas, avec un verre d'eau
			1,25 mg / 5 mg	cp pelliculé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			2,5 mg / 10 mg	cp pelliculé	  						 femme enceinte
BIPROFENID LP	kétoprofène		100 mg	comprimé sécable							A administrer tel quel au cours d'un repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la forme suppositoire à 100 mg ou le cp à 100 mg de Profenid®  femme enceinte
BIRODOGYL	métronidazole + spiramycine		1,5 MUI/250 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau
BISOCE	bisoprolol		1,25 mg	comprimé	 						A administrer le matin, avant, pendant ou après le petit déjeuner, avec un peu de liquide Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			2,5 mg	comprimé	 						
			3,75 mg	comprimé	 						
			5 mg	comprimé	 						
			7,5 mg	comprimé	 						
			10 mg	comprimé	 						
BISOLVON	bromhexine		8 mg	comprimé							A avaler avec un verre d'eau
BISOPROLOL	bisoprolol		1,25 mg	cp pelliculé	 						A administrer le matin, avant, pendant ou après le petit déjeuner, avec un peu de liquide Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			2,5 mg	cp pelliculé bisécable	 						
			3,75 mg	cp pelliculé bisécable	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BISOPROLOL	bisoprolol		5 mg	cp pelliculé bisécable							Préférez la solution buvable de Sectral® ou le comprimé de Seloken®
			7,5 mg	cp pelliculé bisécable							
			10 mg	cp pelliculé bisécable							
BISOPROLOL HTZ	bisoprolol + hydrochlorothiazide		2,5 mg / 6,25 mg	cp pelliculé							A administrer le matin, avant, pendant ou après le petit déjeuner, avec un peu de liquide Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			5 mg / 6,25 mg	cp pelliculé							
			10 mg / 6,25 mg	cp pelliculé							
BI TILDIEM LP	diltiazem		90 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez les gélules d'Amlor®
			120 mg	comprimé enrobé							
BLEDILAIT 1	préparation lactée pour nourrisson		400 g* (68 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons non allaités jusqu'à 6 mois ou au moment du sevrage
			900 g (68 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							
BLEDILAIT 2	préparation lactée de suite		400 g* (69kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Solution buvable prête à l'emploi Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage, de 6 mois à 1 an
			900 g* (69kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
			500 ml (69kcal/100ml)	solution buvable							
			1 000 ml (69kcal/100ml)	solution buvable							
BLEDILAIT CONFORT PREMIUM 1	préparation lactée pour nourrisson riche en amidon		400 g* (70 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons non allaités jusqu'à 6 mois ou au moment du sevrage, si troubles digestifs hauts bénins
			900 g* (70 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							
BLEDILAIT CONFORT	préparation lactée de suite		400 g* (70 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PREMIUM 2	préparation lactée de suite		900 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage de 6 mois à 1 an, si troubles digestifs hauts bénins
BLEDILAIT CROISSANCE	préparation lactée de suite		900 g* (61 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Solution buvable prête à l'emploi Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Lait de suite à partir de 10-12 mois et enfant en bas âge
			500 ml (61 kcal/100 ml)	solution buvable							
			1 000 ml (61 kcal/100 ml)	solution buvable							
BLEDILAIT HA	préparation lactée dont 100 % des protéines sont hydrolysées		400 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Lait pouvant diminuer le risque de sensibilisation aux protéines de lait de vache, dès la naissance
			900 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
BLEDILAIT RELAIS 1	préparation lactée pour nourrisson		900 g* (66,5kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois pour faciliter le sevrage
BLEDILAIT RELAIS 2	préparation lactée de suite		900 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons de 6 mois à 1 an pour faciliter le sevrage
BLEDINE CEREALES	complément nutritionnel du lait infantile		dosette	poudre orale et entérale (2 saveurs)							Mélangez 20 g de céréales à 210 ml de lait infantile Dès 6 mois
			500 g	poudre orale et entérale (5 saveurs)							
BLEDINE CEREALES COMPLETES			dosette	poudre orale et entérale (2 saveurs)							Pour les nourrissons dès l'âge de 10 mois
			500 g								
BOCEPREVIR	bocéprévir		200 mg	gélule	 			?	?		A administrer avec de la nourriture, avec un intervalle recommandé de 7 à 9 heures
BOSULIF	bosutinib		100 mg	cp pelliculé							A administrer le matin, au cours du repas, entiers, avec de l'eau
			500 mg	cp pelliculé							femme enceinte
	artichaut		192,5 mg	gélule	 			?	?		
	aubépine		132 mg	gélule	 			?	?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvrerture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	aucepne		102 mg	gélule				.	.		
	bourdaine		59,5 mg	gélule	 			?	?		
	cassis		169 mg	gélule	 			?	?		
	frêne		154 mg	gélule	 			?	?		
	fucus		84,5 mg	gélule	 			?	?		
	ginseng		127,5 mg	gélule	 			?	?		
	harpagophytum		189 mg	gélule				?	?		
	kola		200 mg	gélule	 			?	?		
	marron d'Inde		25 mg	gélule	 						A administrer avec un grand verre d'eau
	orthosiphon		126,75 mg	gélule	 			?	?		
	passiflore		77,67 mg	gélule	 			?	?		
	petit houx		143,2 mg	gélule	 			?	?		
	piloselle		118,3 mg	gélule	 			?	?		
	pissenlit		87,45 mg	gélule	 			?	?		
	prêle		94,7 mg	gélule	 			?	?		

BOIRON

A administrer avec un grand verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	reine des prés		169 mg	gélule	 			?	?		
	thé vert		220 mg	gélule				?	?		
	valériane		150 mg	gélule				?	?		
	vigne rouge		169 mg	gélule	 			?	?		
BOLCITOL	boldo + fenouil + sauge + fumeterre		3,6g/3,6g/3,6g/5,4g	solution buvable							
BOLDOFLORINE	boldine + bourdaine + romarin + séné		1mg/12mg/12mg/24mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours du repas du soir
BOLINAN	povidone		2 g	comprimé sécable							A administrer au moment des repas, délayé dans un ½ verre d'eau
BONVIVA	acide ibandronique		150 mg	cp pelliculé	 						A administrer le matin à jeun (jeûne ≥ 6 h sauf eau plate), attendre 1 h pour la 1^{ère} prise alimentaire Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
BOULEAU SUPERDIET	bouleau		0,85 g / 15 ml	solution buvable							Solution à avaler telle quelle ou diluée dans de l'eau
BREXIN	piroxicam bétadex		20 mg	comprimé sécable							A administrer au cours d'un repas
			20 mg	cp effervescent							Préférez le comprimé effervescent : dégazez la solution
BRIAZIDE	bénazépril + hydrochlorothiazide		10 mg / 12,5 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		 femme enceinte
BRICANYL LP	terbutaline		5 mg	comprimé							A administrer tel quel au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée
BRIEM	bénazépril		5 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		A administrer en une prise unique avant, pendant ou après un repas (pas de modification de la biodisponibilité)
			10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		 femme enceinte
BRILIQUE	ticagrelor		90 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni écraser
			125 mg / 5 ml	poudre orale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
BRISTAMOX	amoxicilline		250 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Préférez la poudre orale	
			250 mg / 5 ml	poudre pour sirop								
			500 mg / 5 ml	poudre orale								
			500 mg	gélule								
			1 g	comprimé pour susp. buvable								
BRISTOPEN	oxacilline		250 mg / 5 ml	poudre pour sirop							A administrer ½ h avant le repas Évitez les jus de fruits et les solution buvables acides Préférez la forme sirop (goût amer)	
			500 mg	gélule								
BROMAZEPAM	bromazépam		6 mg	cp quadrisécable								
BROMOCRIPTINE	bromocriptine		5 mg	gélule							A toujours administrer au milieu du repas	
BROMOKIN	bromocriptine		2,5 mg	comprimé sécable								
			2,5 mg	gélule								
			5 mg	gélule								
			10 mg	gélule								
BROMO-KIN inhibition de la lactation	bromocriptine		2,5 mg	comprimé sécable								
BRONCALENE adulte sans sucre	chlorphénamine + pholcodine		2 mg / 12 mg (15 ml)	sirop								
BRONCALENE	chlorphénamine + pholcodine		2 mg / 12 mg (15 ml)	sirop								
			0,5 mg / 2,5 mg (5 ml)	sirop								
BRONCALENE nourrisson	chlorphénamine		0,5 mg / 5 ml	sirop								
BRONCATHIOL	carbocistéine		100 mg / 5 ml	solution buvable								
			750 mg / 15ml	solution buvable								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
BRONCHOKOD	carbocistéine		20 mg / ml	sirop							
			20 mg / ml	solution buvable							
			50 mg / ml	sirop							
			50 mg / ml	solution buvable							
BRONCOCLAR enfant	carbocistéine		20 mg / ml	sirop							
BRONCOCLAR	acétylcystéine		200 mg	granulés pour susp. buvable							
BRONCOCLAR adulte	carbocistéine		50 mg / ml	sirop							
BRONKIREX sans sucre	carbocistéine		20 mg / ml	sirop							
			50 mg / ml	sirop							
BRUFEN	ibuprofène		400 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser Préférer Nureflex® suspension buvable femme enceinte
BUCCOBET	bétaméthasone		0,1 mg	comprimé à sucer							Ne pas croquer, ni écraser, ni avaler A sucer jusqu'au délitement complet
BUCCOLAM	midazolam		2,5 mg	solution buvable							A administrer avec une seringue : administration lente dans l'espace entre la gencive et la joue. Pour des volumes importants utiliser les deux côtés de la bouche
			5 mg	solution buvable							
			7,5 mg	solution buvable							
			10 mg	solution buvable							
BI IPRENORPHINE	buprénorphine		0,4 mg	cp sub-lingual	 						Comprimés pour administration sub-linguale
			1 mg	cp sub-lingual	 						
			2 mg	cp sub-lingual	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DUPRENOPTINE	buprenorphine		4 mg	cp sub-lingual	 						Comprimés pour administration sub-linguale
			6 mg	cp sub-lingual	 						
			8 mg	cp sub-lingual	 						
BURINEX	bumétamide		1 mg	comprimé sécable							A administrer le matin avec un aliment Photosensible : administration immédiate
			5 mg	comprimé sécable							
BUSPAR	buspirone		10 mg	comprimé sécable							A administrer au cours des repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser Ne pas associer à du jus de pamplemousse
BUSPIRONE	buspirone		10 mg	comprimé sécable							A administrer au cours du repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser Préférez la forme suppositoire à 250 mg → <i>adaptation de la posologie par le médecin</i>  femme enceinte
BUTAZOLIDINE	phénylbutazone		100 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours d'un repas pour réduire effets indésirables : nausées, vomissements et douleurs gastriques
CABERGOLINE	cabergoline		0,5 mg	comprimé							A administrer au cours d'un repas pour réduire effets indésirables : nausées, vomissements et douleurs gastriques
CACIT	carbonate de calcium		500 mg	cp effervescent							A avaler immédiatement après dissolution dans un grand verre d'eau : dégazez la solution
			1 g	cp effervescent							
CACIT VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 440 UI	cp à croquer et à sucer							Dégazez la solution effervescente
			1 g / 880 UI	granulés effervescents							
CADUET	amlodipine + atorvastatine		5 mg / 10 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer , ni écraser
			10 mg / 10 mg	cp pelliculé							
CALCIBRONAT	bromogalactogluconate de calcium		2 g	cp effervescent							Dégazez la solution
CALCIDIA	carbonate de calcium		1,54 g	granulés pour susp. buvable							Boire immédiatement après dissolution dans de l'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
CALCIDOSE	carbonate de calcium		500 mg	poudre pour susp. buvable							Boire immédiatement après dissolution dans de l'eau	
CALCIDOSE VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	poudre orale								
CALCIFLUOR	fluorure de calcium		0,75 mg	comprimé							Comprimé à croquer, à laisser fondre dans la bouche ou à dissoudre dans un ½ verre d'eau	
CALCIFORTE	carbonate + chlorure + gluceptate + gluconate + lactate de calcium + saccharomyces cerevisiae		500 mg	poudre orale							A administrer au cours d'un repas, dissoute dans un ½ verre d'eau	
CALCIFORTE VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg/400 UI	cp à croquer et à sucer							Comprimé à croquer, à sucer ou à dissoudre dans de l'eau	
CALCIPRAT	carbonate de calcium		500 mg	comprimé à sucer							A administrer matin et soir Sucez le comprimé, puis prendre un verre d'eau	
			750 mg	comprimé à sucer								
			1 g	comprimé à sucer								
CALCIPRAT VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	comprimé à sucer								
			1 g / 800 UI	comprimé à sucer								
CALCIPROTEINE-Neutre	complément alimentaire oral : protéines entières de lait, riches en vit D et calcium		500 g	poudre orale et entérale goût neutre							S'intègre à tous les jus de fruits lorsqu'un apport protéocalcique est recommandé	
CALCIUM enfant	ascorbate de calcium		100 mg	poudre pour solution buvable							A dissoudre dans un peu d'eau	
CALCIUM	acétate de calcium		500 mg	gélule							Granulés à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau Préférez la solution buvable Dégagez les présentations effervescentes	
	ascorbate de calcium		435 mg (cuillère mesure)	granulés								
	gluconate de calcium		100 mg / ml	solution buvable								
	carbonate de calcium + gluconolactate de calcium			500 mg	poudre orale							
				500 mg	cp à croquer et à sucer							
				500 mg	cp effervescent							
			1 g	cp effervescent								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE	glycérophosphate de calcium		100 mg / ml	granulés							Granulés à croquer
CALCIUM SORBISTERIT	polystyrol sulfonate calcique		18 g	poudre orale							
CALCIUM VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400UI	cp à croquer et à sucer							A administrer matin et soir Ecrasement possible
CALCOS VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	cp à croquer et à sucer							A administrer matin et soir Ecrasement possible
CALDINE	lacidipine		2 mg	cp pelliculé	 						A administrer le matin avec un liquide Ne pas croquer , ni écraser
			4 mg	cp pelliculé sécable	 						
CALMIXENE	piméthixène		0,915 mg / 5 ml	sirop							Avalez le contenu du godet doseur tel quel
CALMOSINE	complément alimentaire : extraits aqueux de fenouil + tilleul + fleur d'oranger		3,8 mg/3,8 mg/3,8 mg (30 ml)	solution buvable							Dose de 5 ml à boire pure avant chaque repas, chez les tout-petits présentant des ballonnements, douleurs abdominales ... Conservation au réfrigérateur 15 jours Alimentation modulaire glucidique
CALOREEN	complément alimentaire oral : petits polymères de glucose		500 g (385 kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Diluer jusqu'à 100 g de poudre dans 100 ml de liquide froid ou chaud (eau, lait, thé, café) ou ajouter à de l'alimentation semi-liquide (yaourts, fromage blanc, sauces, potages)
CALPEROS	carbonate de calcium		500 mg	cp à sucer sécable							Sucez les comprimés, puis prendre un verre d'eau
CALPEROS D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	comprimé à sucer							
CALPRIMUM	carbonate de calcium		500 mg	comprimé enrobé à croquer							
CALTRATE	carbonate de calcium		500 mg	comprimé à sucer							
			600 mg	cp pelliculé							
CALTRATE VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	comprimé à sucer							A administrer à distance des repas, avec un grand verre d'eau
			600 mg / 400 UI	cp pelliculé							
CAMPHODIONYL	codéine + sulfogaiacol		2,5 mg / 12,5 mg (5 ml)	sirop							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
CANDESARTAN	candésartan		4 mg	comprimé sécable		?	?		?		<p>A administrer en une seule prise à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec un peu d'eau</p> <p> femme enceinte</p>	
			8 mg	comprimé sécable		?	?		?			
			16 mg	comprimé sécable		?	?		?			
			32 mg	comprimé sécable		?	?		?			
CANDESARTAN HTZ	candésartan + hydrochlorothiazide		8 mg / 12,5 mg	comprimé sécable		?	?		?			
			16 mg / 12,5 mg	comprimé sécable		?	?		?			
CANDIA BABYLAIT 2 ^e Age	préparation lactée de suite		900 g	poudre orale et entérale							Couvre les besoins nutritionnels du nourrisson de 6 mois à 1 an	
			250 ml	solution buvable								
			500 ml	solution buvable								
			1 000 ml	solution buvable								
CANDIA BABYLAIT CROISSANCE	préparation lactée de suite, enrichie en AG essentiels		900 g	poudre orale et entérale							Pour les nourrissons de 10 mois à 3 ans	
			250 ml	solution buvable								
			500 ml	solution buvable								
			1 000 ml	solution buvable								
CANOL	aphloia + pyrole ombellée + cynara		10mg/30mg/100 mg	comprimé enrobé								
CANTABILINE	hymécromone		400 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours d'un repas	
CANTALENE	chlorhexidine + lysozyme + tétracaine		2mg/20mg/0,2mg	comprimé à sucer								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CAPERGYL	dihydroergotoxine		4,5 mg	capsule molle							A administrer, avec de l'eau, avant un repas Ne pas croquer , ni écraser Préférez solution buvable d'Hydergine® 1 mg = 1 ml = XX gouttes
CAPOTEN ATU	captopril		5 mg / ml	solution buvable							
CAPRELSA	vandétanib		100 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, avec ou sans aliment ou dilué dans de l'eau Ne pas croquer , ni écraser : les comprimés peuvent être dispersés exclusivement dans un ½ verre d'eau non gazeuse (remuer environ 10') administration immédiate, tout résidu doit être mélangé avec un ½ verre d'eau et bu immédiatement ou administré par sonde nasogastrique ou par gastrostomie  femme enceinte cytotoxique
CAPSION IODURE I ¹³¹	iodure de sodium I ¹³¹		50 à 3 700 MBq	gélule							A administrer, avec de l'eau, avant un repas Ne pas croquer , ni écraser
CAPSYL	dextrométhorphane		15 mg	capsule molle							Capsule à sucer ou à avaler telle quelle avec de l'eau
CAPTAGON ATU	fénétylline		50 mg	comprimé		?	?		?		A administrer le matin à jeun
CAPTEA	captopril + hydrochlorothiazide		50 mg / 25 mg	cp bisécable							A administrer à heure fixe, avec un peu d'eau, avec ou sans nourriture  femme enceinte
CAPTOLANE	captopril		25 mg	comprimé sécable		?	?		?		A administrer avant, pendant ou après un repas Préférez la solution buvable de Capoten® (en ATU)
			50 mg	comprimé sécable		?	?		?		 femme enceinte
CAPTOPRIL	captopril		12,5 mg	comprimé sécable		?	?		?		
			25 mg	cp quadrisécable		?	?		?		A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Préférez la solution buvable de Capoten® (en ATU)
			50 mg	comprimé sécable		?	?		?		 femme enceinte
CAPTOPRIL HCTZ	captopril +		50 / 25 mg	comprimé		?	?		?		A administrer à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CARFORMETIZ	hydrochlorothiazide		50 / 25 mg	sécable							femme enceinte
CARBACTIVE	charbon activé		120 mg	gélule							Gélule à administrer telle quelle, avec un verre d'eau, après un repas ou au moment des douleurs Administrez tout autre médicament à distance
CARBAGLU	acide carglumique		200 mg	cp dispersible sécable							A administrer avant un repas par voie orale ou par sonde gastrique, après dissolution dans 5 à 10 ml d'eau (goût légèrement acide)
CARBAMAZEPINE	carbamazépine		200 mg	comprimé sécable							A administrer, avec de l'eau, au cours ou après un repas Préférez Tégréto [®] solution buvable
CARBAMAZEPINE LP	carbamazépine		200 mg	comprimé sécable							A administrer, avec de l'eau, au cours ou après un repas Ne pas croquer , ni écraser, ni diluer dans de l'eau
			400 mg	comprimé sécable							Préférez Tégréto [®] solution buvable → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
CARBIDOPA LEVODOPA	carbidopa + lévodopa		10 mg / 100 mg	comprimé bisécable							Comprimés à administrer tels quels, avec un grand verre d'eau, à la fin d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			25 mg / 100 mg	comprimé							
			25 mg / 250 mg	comprimé bisécable							
			50 mg / 200 mg	comprimé							
CARBOCISTEINE	carbocistéine		20 mg / ml	solution buvable							
			20 mg / ml	sirop							
			50 mg / ml	solution buvable							
			50 mg / ml	sirop							
CARBOLEVURE adulte	charbon activé + saccharomyces cerevisiae		48 mg / 47,7 mg	gélule							Gélules à avaler intactes, telles quelles, avec de l'eau Le contenu de la gélule peut être dilué dans du lait
			109 mg / 108,5mg	gélule							
CARBOMIX	charbon activé		50 g	granulés pour susp. buvable							Diluez dans de l'eau et agiter avant emploi par voie orale ou par sonde gastrique
CARBOPHOS	charbon végétal		400 mg	cp à croquer							A administrer après un repas ou au moment des troubles Croquez le comprimé puis l'avalé avec de l'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CARBOSYLANE adulte	charbon activé + siméticone		140 mg / 45 mg	gélule bleue							Administrez les 2 gélules simultanément, avant ou après les repas
	charbon activé + diméticone		140 mg / 45 mg	gélule rouge							Ne pas ouvrir, ni croquer , ni écraser : gélules gastrorésistantes
CARBOSYLANE enfant	charbon activé + siméticone		70 mg / 22,5 mg	gélule bleue							Administrez les 2 gélules simultanément au début des repas
	charbon activé + diméticone		70 mg / 22,5 mg	gélule rouge							Ne pas ouvrir, ni croquer , ni écraser : gélules gastrorésistantes
CARDENSIEL	bisoprolol		1,25 mg	cp pelliculé							A administrer le matin, avec un liquide, au cours ou après le repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
			2,5 mg	cp pelliculé							
			3,75 mg	cp pelliculé							
			5 mg	cp pelliculé							
			7,5 mg	cp pelliculé							
			10 mg	cp pelliculé							
CARDIOCALM	aubépine		100 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer, avec de l'eau, au cours d'un repas, avant le coucher
CARDIOCOR	bisoprolol		1,25 mg	cp pelliculé							A administrer, avec un peu de liquide, le matin avant pendant ou après le petit déjeuner Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
			2,5 mg	cp pelliculé sécable							
			5 mg	cp pelliculé sécable							
CARDIOSOLUPSAN	acétylsalicylate de lysine		100 mg	poudre orale							
CARENCYL	vit A + B ₁ + B ₂ + B ₃ + B ₆ + B ₉ + B ₁₂ + C + PP + fluorure de calcium + phosphate dicalcique + arginine		1500UI/2,5mg/2,5mg/25mg/2,5mg/1mg/4µg/28,97mg/25mg/1mg/100mg/100mg	capsule molle							
CARLIN	éthinylestrodiol + gestodène		75 µg / 20 µg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe
			75 µg / 30 µg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
CARIYTFNE	moxisyltfe		30 mg	comprimé enrobé							A administrer, avec de l'eau, au cours d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CARETENE	moxisylyte		50 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni écraser
CARREFOUR BIO LAIT 1 ^{er} Age	préparation pour nourrisson, à base de soja			poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée, de la naissance à 6 mois
CARREFOUR BIO LAIT 2 ^e Age	préparation de suite, à base de soja			poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée, à partir de 6 mois
CARREFOUR BIO LAIT DE CROISSANCE	lait de croissance			poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée, à partir de 10 mois
CARTREX	acéclofénac		100 mg	cp pelliculé							A administrer intact tel quel, avec de l'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser
CARVEDILOL	carvédilol		6,25 mg	cp bisécable							
			12,5 mg	cp bisécable							
			25 mg	cp bisécable							
CASODEX	bicalutamide		50 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe, avec un verre d'eau Broyage possible mais administration immédiate : formation de cristaux pouvant diminuer la biodisponibilité Gants et masque si broyage femme enceinte
CASSIS SUPERDIET	feuille de cassis		0,8 g / 15 ml	solution buvable							A administrer telle quelle ou diluée dans de l'eau
CASTASE	mélange normocalorique, normoprotidique à faible teneur en polyamines, enrichi en ω-3, sans gluten ni lactose		265 kcal/250 ml	solution buvable 4 saveurs							Boissons prêtes à l'emploi : substitut de repas ou complément alimentaire chez les cancéreux
CASTASE 400	mélange hypercalorique, hyperprotidique à faible teneur en polyamines, enrichi en ω-3, sans gluten ni lactose		400 kcal / 250 ml	solution buvable 2 saveurs							
			100 mg	poudre orale							
			250 mg	poudre orale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CATALGINE	acide acétylsalicylique		500 mg	poudre orale							A administrer immédiatement après dissolution dans de l'eau (sucrée ou non), du lait ou du jus de fruit Respecter un intervalle de 4 heures entre les prises
			500 mg	cp à croquer							
			1 g	poudre orale							
CATAPRESSAN	clonidine		0,15 mg	cp bisécable							A administrer le matin et le soir au coucher Préférer le dispositif transdermique dosé à 0,2 mg par 24 heures (en ATU)
CEBUTID	flurbiprofène		50 mg	comprimé enrobé							
			100 mg	comprimé enrobé							
CEBUTID LP	flurbiprofène		200 mg	gélule							
CEFACET	céfalexine		500 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer avec un verre d'eau, en dehors des repas Évitez la prise de lait simultanée : biodisponibilité diminuée de 40 %
			1 000 mg	cp pelliculé bisécable							
CEFACTOR	céfaclor		125 mg / 5 ml	poudre orale							
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
CEFADROXIL	céfadroxil		125 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer, avec de l'eau, avant ou au cours d'un repas pour réduire les nausées Préférez la poudre orale
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg	gélule				?	?		
			1 g	poudre orale							
			1 g	cp pelliculé		?	?		?		
CEFALINE	paracétamol + caféine		500 mg / 50 mg	poudre orale							A administrer, avec un grand verre d'eau, en évitant la prise vespérale (caféine)

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CEFAPEROS	céfatrizine		250 mg / 5 ml	poudre orale							Préférez la poudre orale
			500 mg	gélule				?	?		
CEFATRIZINE	céfatrizine		500 mg	gélule				?			A administrer au cours d'un repas pour réduire les nausées
CEFIXIME	céfixime		200 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer avec de l'eau, en une prise unique
CEFPODOXIME	cefpodoxime		40 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer, avec un verre d'eau, au cours d'un repa Préférez la poudre orale
			100 mg	comprimé	 	?	?		?		
CEFUROXIME	céfuroxime		125 mg / 40 ml	susp orale							A administrer, avec un verre d'eau, 15 à 30 minutes après un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser les comprimés Préférez la suspension orale ou les granulés
			125 mg	granulés							
			125 mg	cp pelliculé	 						
			250 mg	comprimé	 						
			500 mg	comprimé	 						
CELEBEX	célécoxib		100 mg	gélule							A administrer, avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			200 mg	gélule							
CELECTOL	céliprolol		200 mg	cp pelliculé							A administrer le matin à jeun, avec un liquide Broyage possible si aucun contact avec les muqueuses = administration uniquement par sonde entérale Préférez Sectral® solution buvable
CELESTAMINE	bétaméthasone + dexchlorphéniramine		0,25 mg / 0,25 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
 CELESTENE	bétaméthasone		0,5 mg / ml	comprimé pour solution buvable							A administrer, tels quels ou dissous dans de l'eau, à la fin du repas Préférez la solution buvable : 1 cp = CLX gouttes = 4 ml
			2 mg	cp dispersible bisécable							
CELIPROLOL	céliprolol		200 mg	cp bisécable	 						A administrer, avec de l'eau, le matin à jeun
CELLCEPT	mycophénolate mofétil		250 mg	gélule							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la suspension buvable Forme injectable administrable par sonde, mais pas par voie orale : trop acide  femme enceinte
			500 mg	cp pelliculé							
			1 g / 5 ml	poudre orale							
CELLTOP	étoposide		25 mg	capsule molle							Ne pas écraser, ni ouvrir : cytolytique Ne pas y associer la prise de jus de pamplemousse  femme enceinte
			50 mg	capsule molle							
			100 mg	capsule molle							
CESENTRI	maraviroc		150 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas
			300 mg	cp pelliculé							 femme enceinte
CEMAFLAVONE	citroflavonoïde + vitamine C		400 mg / 300 mg (10 ml)	solution buvable							A administrer dans un ½ verre d'eau
CEPAZINE	céfuroxime		250 mg	cp pelliculé	 						A administrer, avec un verre d'eau, 15 à 30 minutes après un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
CEPHYL	acide acétylsalicylique + caféine + belladone + iris + noix vomique + sigélie helminthique + gelsénium		330mg/36,6mg/0,04µg/0,04µg/0,04µg	comprimé							A administrer avec de l'eau en évitant la fin de journée
CEQUINYL	paracétamol + pseudoéphédrine + vitamine C		250mg/30mg/50 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer avec un verre d'eau
CERAZETTE	desogestrel		0,075 mg	cp pelliculé	 						A administrer, avec de l'eau, à heure fixe
CERIS	chlorure de tropsium		20 mg	comprimé enrobé							A administrer, avec de l'eau, avant un repas
			0,1 mg	cp dispersible							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CERTICAN	évérolimus		0,1 mg	cp dispersible							A administrer toujours au cours ou toujours en dehors des repas Préférez les comprimés dispersibles dissous dans de l'eau (1,25 mg pour 10 ml d'eau) ou du sirop dilué Evitez la prise simultanée de jus de pamplemousse
			0,25 mg	comprimé							
			0,25 mg	cp dispersible							
			0,50 mg	comprimé							
			0,75 mg	comprimé							
CERVOXAN	vinburnine		60 mg	gélule							A administrer, avec de l'eau, au début d'un repas
CETIRIZINE	cétirizine		10 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer, avec un ½ verre d'eau, au début d'un repas Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau : 1 goutte = 0,5 mg
			10 mg / ml	solution buvable							
CETOGLUTARAN	cétoglutarate de calcium		2 g	poudre orale effervescente							A administrer au cours d'un repas Dégazer la solution
CETORNAN	oxoglutarate d'ornithine		5 g	poudre orale et entérale							A administrer, diluée dans de l'eau, avant un repas
			10 g	poudre orale et entérale							
CHAMPIX	varenicline		0,5 mg	cp pelliculé							A administrer, avec de l'eau, à heure fixe au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			1 mg	cp pelliculé							
CHARBON DE BELLOC	charbon activé		125 mg	capsule molle							Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir
CHARBON VEGETAL	charbon activé		200 mg	gélule							A administrer après les repas ou au moment des troubles, avec un grand verre d'eau
CHENOFALK ATU	acide chénodésoxycholique		250 mg	gélule				?	?		A administrer le soir au coucher
CHIBRO-PROSCAR	finastéride		5 mg	cp pelliculé							A administrer avec de l'eau femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CHLORAMINOPHENE	chlorambucil		2 mg	gélule							A administrer à jeun en une prise Ne pas croquer, ni ouvrir, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
CHLORHYDRATE DE PROPRANOLOL ATU	chlorhydrate de propranolol		3,75 mg / ml	solution buvable							A administrer en 2 prises, juste avant le repas, directement dans la bouche avec la pipette graduée, sans être mélangée à un aliment ou une boisson
CHLORMADINONE	chlormadinone		2 mg	comprimé		?	?		?		A administrer avec de l'eau
			5 mg	comprimé		?	?		?		
			10 mg	comprimé		?	?		?		
CHLORUMAGENE	hydroxyde de magnésium		100 g	poudre orale						A administrer le matin à jeun et le soir au coucher, diluée dans de l'eau	
CHOLURSO	acide ursodésoxycholique		250 mg	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas, le matin et le soir ou seulement le soir
			500 mg	cp pelliculé							A avaler intact, tel que, avec de l'eau, ne pas croquer ni écraser
CHONDROSULF	chondroïtine sulfate		400 mg	gélule							A administrer au cours du repas, après dissolution complète dans de l'eau
			400 mg	granulés pour solution buvable							Ne pas croquer, ni écraser Préférez les granulés dissous dans de l'eau
CHOPHYTOL	artichaut		1g / 5 ml	solution buvable							A administrer avant un repas ou au moment des douleurs
			200 mg	comprimé enrobé		?	?		?		Préférez la solution buvable
CHRONADALATE LP	nifédipine		30 mg	cp osmotique							A administrer à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors du repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération
CHRONO INDOCID	indométacine		75 mg	gélule							A administrer au cours des repas pour améliorer la tolérance digestive Gélule ouvrable mais sans écraser les microgranules à libération modifiée Préférez la suspension buvable d'Indocin® femme enceinte
			25 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CIALIS	tabalafil		2,5 mg	cp pelliculé							A administrer, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
			5 mg	cp pelliculé							
			10 mg	cp pelliculé							
			20 mg	cp pelliculé							
CIBACENE	bénazépril		5 mg	cp bisécable							A administrer en une prise, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Si broyage du comprimé, évitez les phénomènes d'échauffement : administration immédiate
			10 mg	cp pelliculé							
CIBADREX	bénazépril + hydrochlorothiazide		12,5 mg / 10 mg	cp pelliculé bisécable							
CIBLOR	amoxicilline + acide clavulanique		100mg / 12,5mg (ml)	poudre orale							A administrer au début d'un repas Préférez la poudre orale diluée dans de l'eau non gazeuse
			500 mg / 62,5 mg	cp pelliculé							
			1 g / 125 mg	poudre orale							
CIFLOX	ciprofloxacine		500 mg / 5 ml	granulés							A administrer de préférence à jeun ou 2 h après le repas (si irritation gastrique : administrer durant le repas) Ne pas diluer les granulés avec de l'eau, mais utiliser le liquide de reconstitution : agitez avant emploi Comprimés à avaler tels quels avec un verre d'eau ou broyage possible pour administration par sonde gastrique, à jeun ou durant la nutrition entérale
			250 mg	cp pelliculé non sécable							
			500 mg	cp pelliculé bisécable							
			750 mg	cp pelliculé non sécable							
CILEST	norgestinate + éthinyloestradiol		0,25 mg / 0,035 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			200 mg	cp pelliculé							
			200 mg	cp effervescent							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CIMETIDINE	cimétidine		400 mg	cp pelliculé		?	?		?		Préférez les comprimés effervescents : dégazez la solution
			800 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			800 mg	cp effervescent							
CIMIPAX	cimicifuga		9 mg	gélule							A administrer, avec un verre d'eau, au cours d'un repas
CIPRALAN	cibenzoline		130 mg	cp pelliculé sécable	 						Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
CIPROFIBRATE	ciprofibrate		100 mg	gélule	 						
CIPROFLOXACINE	ciprofloxacine		250 mg	cp pelliculé	 						A administrer de préférence à jeun ou 2 h après le repas Si irritation gastrique : administrer durant le repas Comprimés à avaler tels quels avec un verre d'eau ou broyage possible pour administration par sonde gastrique, à jeun ou durant la nutrition entérale
			500 mg	cp pelliculé	 						
			750 mg	cp pelliculé	 						
CIRCADIN LP	mélatonine		2 mg	comprimé							A administrer après le repas du soir, 1 à 2 heures avant le coucher Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
CITALOPRAM	citalopram		20 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours ou en dehors des repas
CITRARGININE	citrate d'arginine + chlorhydrate de bétaine + bétaine anhydre		1 g / 0,5 g / 0,5 g (100 ml)	solution buvable							
			100 mg / ml	granulés							
			2 g / 5 ml	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CITRATE BETAINE	citrate de bétaïne	®	1,89 g	cp effervescent						A administrer, dans un ½ verre d'eau, avant ou après le repas Pour les comprimés effervescents : dégazez la solution	
			2 g	poudre orale							
			2 g	cp effervescent							
CITRATE BETAINE MENTHE SANS SUCRE	citrate de bétaïne + saccharine		2 g	cp effervescent							
CITRATE DE POTASSIUM PH	citrate de potassium		1 g	gélule			?	?			
CITRATE DE SODIUM PH	citrate de sodium		1 g	gélule			?	?			
CITROCHOLINE	citrate de chrome + carbonate de magnésium + citrate de sodium + acide citrique		2 g / 0,12 g / 1g / 0,525 g (10 ml)	solution buvable	 					A administrer, diluée dans de l'eau, avant un repas ou au moment des douleurs	
CITRULLINE L PH	citrulline		500 mg	gélule						Préférez la solution buvable de Stimol®	
CLAMOXYL	amoxicilline		125 mg / 5 ml	poudre orale						A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas ouvrir, ni croquer, ni mâcher la gélule Dégazez la présentation effervescente Le comprimé dispersible peut être avalé tel quel avec un verre d'eau non gazeuse ou dispersé dans un ½ verre d'eau	
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			250 mg	susp. buvable sans sucre							
			500 mg	gélule							
			500 mg	cp effervescent							
			1 g	cp dispersible							
	1 g	poudre orale									
CLARADOL	paracétamol		500 mg	cp bisécable						Goût très amer des comprimés, à avaler intacts tels quels directement avec un verre d'eau de lait ou de jus de fruit Préférez les comprimés effervescents : dégazez la solution, boire après dissolution complète	
			500 mg	cp effervescent bisécable							
CLARADOL CAFEINE	paracétamol + caféine	®	500 mg / 50 mg	comprimé							
			500 mg / 50 mg	cp effervescent							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CLARADOL CODEINE	paracétamol + codéine		500 mg / 20 mg	cp bisécable							
CLARAGINE	acide acétyl salicylique		500 mg	cp effervescent bisécable							Boire après dissolution complète : dégazez la solution
CLARAMID enfant	roxythromycine		50 mg	cp pour susp. buvable							A administrer, avec un verre d'eau, avant les repas Préférez la suspension buvable
			100 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			150 mg	cp pelliculé		?	?		?		
CLAREAL	desogestrel		0,075 mg	cp pelliculé	   						A administrer avec de l'eau, à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
CLARINASE REPETABS	loratadine + pseudo éphédrine		5mg/120mg	comprimé							
CLARITHROMYCINE	clarithromycine		25 mg / ml	granulés pour susp. buvable							A administrer au cours d'un repas Préférez la suspension buvable diluée dans de l'eau ou du lait, bien agiter
			50 mg / ml	granulés pour susp. buvable							
			250 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
			500 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
CLARITYNE	loratadine		1 mg / ml	sirop							A administrer au cours ou en dehors des repas Préférez le sirop ou la solution buvable
			10 mg	comprimé	 						
CLARIX	érysimun + pholcodine		7,5mg+5mg (5ml)	sirop							
CLARIX sans sucre	érysimun + pholcodine		7,5mg+5mg (5ml)	sirop							
CLARIX TOUX SECHE	érysimun + pholcodine +		15 mg	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DEXTROMETHORPHANE	saccharine		(5 ml)	solution buvable							
CLASTOBAN	acide clodronique		400	gélule							A administrer, avec un verre d'eau peu riche en calcium, le matin à jeun : 1 h avant de manger ou boire (sauf de l'eau) ou de prendre un autre médicament Ne pas y associer la prise de lait
			800 mg	cp pelliculé bisécable							
CLEREGIL	deanol acéglutamate		2 g / 5 ml	solution buvable							A administrer, avec un ½ verre d'eau, en début de repas Evitez la prise en fin de journée
CLERIDIUM	dipyridamole		150 mg	cp pelliculé bisécable	 						Comprimé difficile à écraser car petit : risque de perte d'une partie du principe actif
CLIMASTON	estradiol + dydrogestérone		1 mg / 5 mg	cp pelliculé	 						A administre au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine, adhérence à la paroi des sondes
			1 mg / 10 mg	cp pelliculé	 						
			2 mg / 10 mg	cp pelliculé	 						
CLIMAXOL	hamamélis + phragon épineux+marron d'Inde + hydrastis + viburnum		28ml/28ml/28ml /8ml/8ml (100 ml)	solution buvable							A administrer, dans un peu d'eau, avant un repas
CLIMENE	estradiol + ciprotérone		2 mg / 1 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
CLIMODIENE	estradiol + diénogest		2 mg/2 mg	comprimé							A administrer, avec un liquide, à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
CLINUTREN CEREAL	préparation nutritive riche en protéines, enrichie en fibres		400 g (410kcal/100 g)	poudre orale 1 saveur							Mélangez 50 g de poudre à 150 ml d'eau ou de lait écrémé préalablement chauffé. Si liquide froid : versez en pluie, mélanger doucement, passez au micro-ondes 1 à 2 minutes à ≈ 800 W, remuez à nouveau
CLINUTREN DESSERT	complément alimentaire oral		125 g 156 kcal	crème 4 saveurs							A administrer en dessert ou en collation
CLINUTREN DESSERT HP/HC	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		125 g 187 - 188 kcal	crème 4 saveurs							
			205 g 310 kcal	crème 6 saveurs							
CLINUTREN 1,5	complément alimentaire oral hypercalorique, sans fibres		200 ml 300 kcal	solution buvable 6 saveurs							A boire lentement frais de préférence 90 minutes avant

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CLINUTREN 1,5 FIBRE	complément alimentaire oral hypercalorique, enrichi en fibres		200 ml 300 kcal	solution buvable 2 saveurs							A boire lentement, frais de préférence, 90 minutes avant ou après un repas
CLINUTREN FRUIT	boisson nutritive hypercalorique, 8 g de protéines, sans lactose, sans gluten, sans fibres		200 ml 250 kcal	solution buvable 6 saveurs							A boire lentement, frais au petit déjeuner, déjeuner, dîner ou en collation
CLINUTREN G	complément alimentaire oral isocalorique édulcoré, riche en AG monoinsaturés et en fibres		200 ml 210 kcal	solution buvable 3 saveurs							A boire lentement, frais de préférence, aux repas ou en collation
CLINUTREN HP/HC	complément alimentaire oral lacté hypercalorique, hyperprotidique		200 ml 320 kcal	solution buvable 6 saveurs							A boire lentement, frais de préférence, 90 minutes avant ou après un repas
CLINUTREN MIX	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		215 g 323 - 338 kcal	poudre orale et entérale 7 saveurs							Plat principal pour les patients dénutris présentant des troubles de la mastication
CLINUTREN PRELOAD	sirop de glucose déshydraté, sans gluten, sans lactose		50 g (sachet)	poudre orale et entérale goût neutre							Mélangez un sachet de poudre à 400 ml d'eau A administrer jusqu'à 2 heures avant une intervention chirurgicale Conservation au réfrigérateur durant 24 heures
CLINUTREN REPAIR	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique, enrichi en arginine, proline, micro nutriments et anti-oxydants		200 ml 250 kcal	solution buvable 2 saveurs							A boire lentement, frais de préférence, aux repas ou en collation Complément pour les patients dénutris ayant des troubles du métabolisme glucidique
CLINUTREN SOUP	complément alimentaire oral hypercalorique, sans lactose, sans gluten, sans fibres		200 ml 300 kcal	solution buvable 3 saveurs							Soupe conseillée en entrée du repas ou en collation, réchauffée au micro-ondes, au bain-marie ou par thermo-contact
CLINUTREN SUPPORT PLUS	complément alimentaire oral lacté hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω-3		300 ml 480 kcal	solution buvable 3 saveurs							A boire lentement, 90 minutes avant ou après un repas Complément pour les patients dénutris en oncologie
CLINUTREN THICKEN UP CLEAR	amidon de maïs		125 g	poudre orale et entérale							Poudre épaississante à verser dans le liquide, mélangez vigoureusement avec une fourchette ou un fouet jusqu'à dissolution, laissez reposer 1 minute avant de servir
CLODRONATE	clodronate		800 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer, avec un verre d'eau peu riche en calcium, le matin à jeun : 1 h avant de manger ou boire (sauf de l'eau) ou de prendre un autre médicament Ne pas y associer la prise de lait
CLONIDIN	clonidine		50 mg	cp bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CLOMID	clomipramine		50 mg	cp bisécable	 						
CLOMIPRAMINE	clomipramine		10 mg	cp pelliculé	 						A administrer, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas
			10 mg	gélule				?	?		
			25 mg	gélule				?	?		
			25 mg	cp pelliculé	 						
			75 mg	cp pelliculé bisécable	 						
CLOPIDOGREL	clopidogrel		75 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas Goût amer : broyage possible si administration par sonde entérale
			75 mg	cp pelliculé	  						
CLOPIXOL	zuclopenthixol		20 mg / ml	solution buvable							A administrer en fin de journée Préférez la solution buvable : 1 mg = 1 goutte
			10 mg	cp pelliculé	 						
			25 mg	cp pelliculé	 						
CLORAZEPATE DIK PH	clorazépate di potassique		5 mg	gélule				?	?		A administrer avec un verre d'eau, le soir immédiatement avant le coucher
			10 mg	gélule				?	?		
			20 mg	gélule				?	?		
CLOZAPINE	clozapine		25 mg	comprimé		?	?		?		
			100 mg	comprimé		?	?		?		
			150 / 12,5 mg	cp pelliculé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
COAPROVEL	irbésartan + hydrochlorothiazide		300 / 12,5 mg	cp pelliculé	 						A administrer si possible à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas
			300 / 25 mg	cp pelliculé	 						femme enceinte foeto-toxique
CODEDRILL	codéine		15 mg (15 ml)	solution buvable							
CODEINE PH	codéine		2 mg / ml	sirop							
CODENFAN	codéine		1 mg / ml	sirop							Utilisez le dispositif doseur
CODOLIPRANE	paracétamol + codéine		400 mg / 20 mg	cp bisécable							A avaler intacts tels quels, avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit : goût très amer : broyage possible si administration par sonde entérale
			400 mg / 20 mg	cp bisécable							Préférez Efferalgan® codéiné en comprimé effervescent → adaptation de la posologie
CODOTUSSYL	pholcodine		1,33 mg / ml	sirop	 						Utilisez la cuillère-mesure : 2,5 ml contiennent 3,3 mg de pholcodine
COGNEX	tacrine		10 mg	gélule							A administrer en dehors des repas Molécule électrostatique : risque de perte de produit si ouverture de la gélule
			20 mg	gélule							
			30 mg	gélule							
			40 mg	gélule							
COKENZEN	candésartan + hydrochlorothiazide		8 mg / 12,5 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en prise unique, avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			16 mg / 12,5 mg	comprimé		?	?		?		femme enceinte
COLCHICINE OPOCALCIUM	colchicine		1 mg	comprimé							A administrer le soir au cours d'un repas ou mélangé à de la compote (goût amer)
COLCHIMAX	colchicine + tiémonium + opium		1mg/50mg/12,5mg	cp pelliculé	 						A administrer le soir au cours d'un repas
COLESTID ATU	colestipol		5 g	granulés pour susp. buvable							A diluer dans de l'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
COLI-GENTA	colistine + gentamycine		40 mg / 50 mg	gélule				?	?		
			200 mg/100mg	gélule				?	?		
COLIMYCINE	colistine		1,5 MUI	comprimé							Comprimé à avaler entier avec de l'eau ou dilué dans de l'eau Présentation injectable à 1 million UI utilisable dans une sonde gastrique
COLOCARB	charbon activé		300 mg	comprimé		?	?		?		A administrer, avec de l'eau, après un repas ou au moment des troubles
COLOKIT	phosphate monosodique monohydraté + phosphate disodique anhydre		1 102mg/398mg	comprimé							<ul style="list-style-type: none"> • Le soir précédant l'examen : prendre 4 cp avec 250 ml d'eau ou autre liquide clair, recommencer 4 fois de suite en espaçant les prises de 15 minutes (20 cp) • 4 à 5 h avant l'examen : 12 comprimés à avaler dans les mêmes conditions
COLOPEG	bicarbonate de sodium + chlorure de sodium + sulfate de sodium + chlorure de potassium + macrogol		1,68g/1,46g /5,68g/0,75g (sachet)	poudre orale							Dissoudre le sachet dans un litre d'eau
COLOPRIV	mébévirine		100 mg	gélule							A administrer, avec un verre d'eau, avant les repas
			200 mg	gélule							
COLPRONE	médrogestone		5 mg	comprimé		?	?		?		
COLTRAMYL	thiocolchicoside		4 mg	comprimé							A administrer, avec un verre d'eau, au cours d'un repas
COMBANTRIN	pyrantel		125 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en une fois
			125 mg / 2,5 ml	susp. buvable							Préférez la suspension buvable
COMBIVIR	lamivudine + zidovudine		150 mg / 300 mg	cp pelliculé	 						A administrer, avec de l'eau ou une autre solution buvable, au cours ou en dehors des repas, respectez un intervalle de 12 h Par sonde, préférez l'association : Epivir® solution buvable : 15 ml = 150 mg + Rétrovir® solution buvable : 30 ml = 300 mg femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
COMBODART	capsule : dubastéride + microgranules : tamsulosine		0,5 mg / 0,4 mg	gélule							A administrer à heure fixe, 30' après un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni ouvrir la gélule et/ou la capsule gélatineuse, ni écraser : microgranules à libération modifiée Chez les femmes et les enfants, les zones cutanées en contact avec une gélule endommagée doivent immédiatement être lavées à l'eau et au savon (absorption transcutanée)
COMPRALGYL	paracétamol + codéine		400 mg / 20 mg	cp bisécable							A avaler tel quel avec un verre d'eau : broyage possible si administration par sonde entérale Préférez Efferalgan® codéiné en comprimé effervescent
COMTAN	entacapone		200 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas
CONCERTA LP	méthylphénidate		18 mg	comprimé	 						Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée Comprimés à administrer intacts, tels quels, avec un liquide, au cours ou en dehors des repas
			36 mg	comprimé	 						
			54 mg	comprimé	 						
CONEBILOX	neбиволол + hydrochlorothiazide		5 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau
			5 mg / 25 mg	cp pelliculé	 						
CONTALAX	bisacodyl		5 mg	comprimé	 						A administrer, avec de l'eau, le soir au coucher Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé gastrorésistant
CONTRACNE	isotrétinoïde		5 mg	capsule molle							Capsules à administrer entières, au cours des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer , ni écraser femme enceinte
			10 mg	capsule molle							
			20 mg	capsule molle							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			40 mg	capsule molle							
CONTRAMAL	tramadol		100 mg / ml	solution buvable							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser, ni ouvrir Préférez la solution buvable sur un sucre ou avec de l'eau, du lait ou un jus de fruit
			50 mg	gélule							
CONTRAMAL LP	tramadol		100 mg	comprimé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la solution buvable de Contramal® → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
			150 mg	comprimé	 						
			200 mg	comprimé	 						
CONVULINE	éthinyloestradiol + drospirénone		0,03 mg / 3 mg	cp pelliculé	 						A administrer avec un peu d'eau, à heure fixe, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
CO OLMETEC	olmésartan + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer à heure fixe, avec de l'eau ou un liquide, au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
			20 mg / 25 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			40 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			40 mg / 25 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
COPEGUS	ribavirine		200 mg	cp pelliculé	 						A administrer au moment des repas Ne pas croquer , ni écraser Préférez la solution buvable de Rebetol® femme enceinte
			400 mg	cp pelliculé	 						
CORBIONAX	amiodarone		200 mg	cp bisécable							A administrer tel quel ou écrasé, au cours ou en dehors des repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CORDARONE	amiodarone		200 mg	cp bisécable							A administrer tel quel ou écrasé, au cours ou en dehors des repas Ne pas associer à du pamplemousse
CO-RENITEC	enalapril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp sécable							A administrer en une prise Ne pas écraser : molécule hygroscopique femme enceinte
CORGARD	nadolol		80 mg	comprimé							A avaler entier avec de l'eau sans croquer ni sucer , ni écraser Evitez la prise d'alcool
CORTANCYL	prednisone		1 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours du petit déjeuner
			5 mg	cp bisécable							Préférez Solupred® en solution buvable ou comprimé effervescent : dégazez la solution
			20 mg	cp bisécable							
CORVASAL	molsidomine		2 mg	cp bisécable							A administrer au cours des repas Photosensible : administration immédiate Résorption orale : 10', sous-cutanée 20'
			4 mg	cp bisécable							
COTAREG	valsartan + hydrochlorothiazide		80 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe le matin, avant ou au cours d'un repas
			160 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							femme enceinte
			160 mg / 25 mg	cp pelliculé							
COTEVETEN	éprosartan + hydrochlorothiazide		600 / 12,5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde femme enceinte
COTRIATEC	ramipril + hydrochlorothiazide		5 mg / 12,5 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en une prise unique avant, au cours ou après un repas femme enceinte
			2 mg	comprimé sécable							A administrer à heure fixe, avec de l'eau, de préférence le soir Administration immédiate Eviter les aliments riches en vitamine K : foie, abats, œuf

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
COUMADINE	warfarine		5 mg	comprimé sécable							Éviter les aliments riches en vitamine K : foie, abats, œufs, persil, épinards, choux, choux-fleurs, navet, choucroute, brocolis, épinards, salade verte, avocat, carotte, fenouil, tomate femme enceinte
COVATINE	captodiamé		50 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
COVERAM	périndopril + amlodipine		5 mg / 5 mg	comprimé							A administrer en une prise unique, de préférence le matin avant le petit déjeuner, avec de l'eau
			5 mg / 10 mg	comprimé							
			10 mg / 5 mg	comprimé							
			10 mg / 10 mg	comprimé							
COVERSYL	périndopril		2,5 mg	cp pelliculé							A administrer en une prise unique le matin, avec de l'eau, avant le repas Administration immédiate femme enceinte
			4 mg	cp bisécable							
			5 mg	cp pelliculé sécable							
			10 mg	cp pelliculé							
COZAAR	losartan		2,5 mg / ml (200 ml)	poudre orale							A administrer à jeun ou au cours d'un repas (goût très amer des comprimés écrasés) Préférez la poudre orale : avant d'ouvrir le sachet, taper doucement sur le côté pour faciliter le transfert du contenu. Ajouter avec précaution la totalité du contenu du sachet dans le flacon PET de solvant. Le sachet NE doit PAS être rincé. Revisser le bouchon sur le flacon et agiter pour mélanger les ingrédients. La suspension est blanc cassé. Dévisser le bouchon, enfoncer l'adaptateur dans le goulot du flacon et reboucher le flacon. Conservation au réfrigérateur 4 semaines maximum entre 2 et 8°C. Agiter avant chaque utilisation et remettre rapidement au réfrigérateur femme enceinte
			50 mg	comprimé enrobé bisécable							
			100 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CREON	pancréatine		12 000 U	gélule							A administrer au cours des repas Chez gastrectomisé et nourrisson : ouvrir la gélule mais ne pas écraser ni mâcher les microgranules gastro-résistants, les mélanger à du lait
			25 000 U	gélule							
CRESTOR	rosuvastatine		5 mg	cp pelliculé	 						A administrer si possible à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer , ni écraser
			10 mg	cp pelliculé	 						
			20 mg	cp pelliculé	 						
CRIXIVAN	indinavir		100 mg	gélule							A administrer 1 à 2 h après un repas, sans aliment mais avec de l'eau, du lait écrémé, du café, du thé ou un jus de fruit Goût très amer : gélule ouvrable uniquement si administration par sonde Assurer une hydratation importante (risque de lithiase urinaire) Évitez les repas riches en graisses et en calories femme enceinte
			200 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
CRIZOTINIB ATU	crizotinib		25 mg / ml	solution buvable							Éviter le pamplemousse : risque d'augmentation des concentrations plasmatiques et le millepertuis, risque inverse femme enceinte cytotoxique
CUBISON	mélange isocalorique enrichi en L-arginine, zinc, sélénium, vitamines C et E		1 000 ml (1 000 kcal)	pack souple							A administrer de préférence avec un régulateur de débit
CUBITAN	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique		250 kcal / 200 ml	solution buvable 3 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
CURACNE	isotrétinoïde		5 mg	capsule molle							A administrer au cours des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer, ni écraser femme enceinte
			10 mg	capsule molle							
			20 mg	capsule molle							
			40 mg	capsule molle							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CURASTEN	glucoheptonate de calcium + lysine		550 mg / 250 mg (5 ml)	solution buvable							A administrer au repas de midi ou du soir, diluée dans de l'eau
CYANOCOBALAMINE	57 Co-Cobalt		18,5 kBq	capsule molle							Eliminer les déchets selon les recommandations pour les produits radiopharmaceutiques femme enceinte
CYCLADOL	piroxicam		20 mg	cp bisécable							A administrer en une prise unique, avec de l'eau, au cours d'un repas
			20 mg	cp effervescent							Préférez le comprimé effervescent dissous dans un ½ verre d'eau : dégazez la solution
CYCLEANE	désogestrel + éthinylestadiol		20 µg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			30 µg	comprimé							
CYCLO 3 FORT	petit houx + hespéridine + vitamine C		150 mg / 150 mg / 100 mg	gélule							Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau 1 gélule ↔ 1 ampoule buvable
			1,5 ml / 100 mg / 150 mg (5 ml)	solution buvable							
CYCLOSERINE ATU	cyclosérine		250 mg	gélule				?	?		
CYMBALTA	duloxétine		30 mg	gélule	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas ouvrir : gélule gastro-résistante
			60 mg	gélule	 						
CYNOMEL	liothyronine		0,025 mg	cp bisécable							
CYPROTERONE	cyprotérone		50 mg	cp bisécable	 	?	?		?		A administrer avec de l'eau
			100 mg	cp bisécable	 	?	?		?		
CYPROTERONE ETHI	cyprotérone + éthinylestadiol		2 mg / 0,035 mg	comprimé enrobé							A administrer avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
CYSTADANE	bétaïne		1 g	poudre orale							A diluer dans de l'eau, du lait ou du jus de fruit (agiter avant l'emploi) ou à mélanger à un aliment
CYSTAGON	cystéamine		50 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
CYSTAGON	Cystamine		150 mg	gélule							
CYSTINE B ₆	L cystine + vitamine B ₆		500 mg / 50 mg	cp pelliculé							A administrer, avec de l'eau, au cours d'un repas
CYTOTEC	misoprostol		200 µg	cp bisécable							A administrer intact tel quel, avec un grand verre d'eau, 10 minutes après les 3 principaux repas et au coucher Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser femme enceinte
DAFALGAN	paracétamol		30 mg / ml	solution buvable							A administrer tels quels avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit Ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir ou écraser la gélule ou les comprimés non effervescents : goût très amer : broyage possible du comprimé si administration par sonde entérale Préférez la solution pédiatrique buvable ou la poudre orale diluée dans de l'eau, du lait ou des jus de fruit ou les comprimés effervescents : dégazez les solutions et administration immédiate
			150 mg	poudre orale effervescente							
			250 mg	poudre orale effervescente							
			500 mg	gélule							
			500 mg	comprimé							
			500 mg	cp effervescent bisécable							
			1 g	cp effervescent							
	1 g	cp pelliculé									
DAFALGAN CODEINE	paracétamol + codéine		500 mg / 30 mg	cp pelliculé							Ne croquer, ni écraser, goût très amer : broyage possible du comprimé si administration par sonde entérale Préférez le comprimé effervescent dissous dans du liquide : dégazez la solution
			500 mg / 30 mg	cp effervescent bisécable							
DAFLON	flavonoïdes		375 mg	comprimé enrobé							A administrer, avec de l'eau, au cours d'un repas Administration immédiate, mélangé à de l'eau ou un aliment Préférez Ginkor® poudre orale ou Flebosmil® en sachet
			500 mg	cp pelliculé							
DAILY	lévonorgestrel + éthinyloestradiol		0,05 mg / 0,03 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,075mg/0,015mg	comprimé enrobé							
			0,125mg/0,03mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DALACINE	clindamycine		75 mg	gélule							Ouvrir les gélules Ne pas utiliser les ampoules injectables à 600 et 900 mg
			150 mg	gélule							
			300 mg	gélule							
DALIA TARANIS	complément alimentaire oral hypoprotidique		200 ml (50 kcal/100 g)	solution buvable 1 saveur							Solution buvable : agitez avant emploi, supporte la cuisson, peut être aromatisée (sirops de fruits, essences naturelles, café soluble, thé...) Poudre : mélangez 1 mesurette de 10 g avec 100 ml d'eau froide ou chaude A partir de 1 an
			400 g (434kcal/100 g)	poudre orale et entérale							
DANATROL	danazol		200 mg	gélule							
DANTRIUM	dantrolène		25 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas
			100 mg	gélule							
DAONIL	glibenclamide		1,25 mg	comprimé							A administrer, avec un 1/2 verre d'eau, avant un repas Principe actif amer par voie orale : comprimé broyable si administrable par sonde : administration immédiate
			5 mg	cp bisécable							
DAPSONE ATU	dapsone		50 mg	comprimé							Ne contient pas de fer comme la Disulone®
DASSELTA	desloratadine		5 mg	cp pelliculé	 						A administrer une fois par jour, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser Préférer la solution buvable d'Ærius® ou de desloratadine
DAZEN	serrapeptase		10 000 U	comprimé enrobé							Ne pas croquer ni écraser : comprimé gastro-résistant
DEBRICALM	trimébutine		100 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours des repas, avec un verre d'eau Évitez le décubitus après administration Préférez les granulés dilués dans de l'eau ou du lait Ou remplacez par la forme suppositoire à 100 mg
DEBRIDAT	trimébutine		100 mg	cp pelliculé	 						
			4,8 mg / ml	granulés pour susp. buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			74,4 mg	granulés							
DEBRUMYL	déanol + heptaminol		250 mg / 180 mg (5 ml)	solution buvable							A administrer, diluée dans de l'eau, avant un repas
DECALOGIFLOX	loméfloxacin		400 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas, de préférence le soir
DECONTAMINANTES 5	colistine + tobramycine + vancomycine		0,5MUI/50mg/50mg	gélule				?	?		
DECONTRACTYL	méphénésine		500 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
DECORENONE ATU	ubidécarenone		50 mg (10 ml)	solution buvable							A administrer après un repas Préférez la solution buvable
			50 mg	gélule				?	?		
DECTANCYL	dexaméthasone		0,5 mg	comprimé							A administrer au cours d'un repas Préférez Célestène® solution buvable à 0,5 % 1 cp ↔ CLX gouttes = 4 ml → <i>adaptation de la posologie</i>
DEDROGYL	calcifédiol		0,15 mg / ml	solution buvable							A diluer dans de l'eau, à avaler avec une solution buvable ou un aliment
DEFANYL	amoxapine		50 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer en dehors d'un repas
			100 mg	cp bisécable		?	?		?		
DEFERIPRONE	défériprone		400 mg	gélule				?	?		
DELICAL boisson fruitée	complément alimentaire oral hypercalorique,, non lacté		200 ml (250 kcal)	solution buvable 4 saveurs							A prendre en collation, en dehors des repas, ou à la place du jus de fruit au petit déjeuner Servir bien frais, peut être congelée (dans une sucette) pour faire un sorbet
DELICAL boisson HP édulcorée	boisson sans sucre, hyperprotidique		200 ml (222 kcal)	solution buvable 3 saveurs							A prendre en collation, en dehors des repas, ou à la place du jus de fruit au petit déjeuner : servir bien frais
DELICAL boisson lactée 1,5	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas Boissons à consommer fraîches à la sortie du réfrigérateur ou tiédies sans faire bouillir
DELICAL boisson lactée 1,5 SANS LACTOSE	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs							
DELICAL boisson lactée HP	complément alimentaire oral hyperprotidique		200 ml (222 kcal)	solution buvable 2 saveurs							Boisson édulcorée à ingérer 90 minutes avant ou après un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DELICAL boisson lactée HP/HC	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs + goût neutre							A utiliser en remplacement du lait dans une boisson, ou les préparations culinaires chaudes ou froides
DELICAL boisson lactée SANS LACTOSE	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs							A utiliser en remplacement du lait dans une boisson
DELICAL CALCIPROTEINE	protéines entières de lait, enrichies en calcium et vit.		500 g	poudre orale							Poudre à saupoudrer sur les aliments, boissons, desserts, purées, potages... ou à intégrer dans les préparations culinaires
DELICAL CEREALES INSTANT	complément alimentaire oral hypercalorique, enrichi en protéines et en fibres		420 g (400kcal/100g)	poudre orale 2 saveurs							Mélangez 50 g de poudre à 150 ml d'eau, lait, café, thé, compote, fromage blanc ...
DELICAL CREME DESSERT	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique, sans gluten ni lactose		300 kcal / 230 g	crème dessert 5 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
DELICAL CREME DESSERT HP FLORIDINE	complément alimentaire oral hyperprotidique, sans gluten, avec lactose		300 kcal / 200 g	crème dessert 5 saveurs							
DELICAL poudre de protéines	protéines de haute valeur nutritionnelle, enrichies en vit.		11,5 g	poudre orale goût neutre							Poudres à saupoudrer sur les aliments, boissons, desserts, purées, potages... ou à intégrer dans les préparations culinaires
			500 g	poudre orale goût neutre							
DELICAL MALTOEXTRIDINE	poudre glucidique		400 g (381kcal/100g)	poudre orale							Poudres à saupoudrer sur les aliments ou à intégrer dans les préparations culinaires chaudes ou froides
DELICAL POTAGES HP HC	complément alimentaire oral enrichi en vitamines et minéraux		200 ml (300 kcal)	3 saveurs							Potages à texture lisse, semi-liquide
DELICAL RENAL INSTANT	complément alimentaire oral protéino-énergétique, à faible teneur en électrolytes et enrichi en L-carnitine		15 g (444kcal/100g)	poudre orale et entérale							Poudre à saupoudrer par dose de 15 g sur le plat ou dans une boisson, bien remuer jusqu'à dissolution complète Préparation diététique riche en protéines et en calories pour les patients dialysés
			360 g (444kcal/100g)	poudre orale et entérale							
DELLOVA	fucus + orthosiphon		25 mg / 150 mg	cp pelliculé							A administrer avant un repas, avec de l'eau ou du yaourt Goût et odeur désagréables, broyage possible si administration par sonde
DELTAZEN LP	diltiazem		300 mg	gélule							A administrer à heure fixe, avec un liquide, avant ou au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir : microgranules à libération prolongée
			250 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas ou mélangé à de la

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	ÂGÉS	Dosages	Formes galéniques							
DELURSAN	acide ursodéoxycholique		250 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas ou mélange à de la compote Ne pas croquer : goût très amer , broyage possible si administration par sonde
			500 mg	cp pelliculé bisécable							
DEMSER ATU	métyrosine		250 mg	comprimé							
			250 mg	gélule							
DENSICAL	carbonate de calcium		600 mg	cp à sucer ou à croquer							
DENSICAL VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg/400 UI	cp à sucer ou à croquer							Comprimé dispersible dans l'eau
DEPAKINE	valproate de sodium		57,64 mg / ml	sirop							A administrer au cours du repas Préférez la solution buvable ou le sirop dilués dans de l'eau ou une solution buvable non gazeuse Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser les comprimés : gastrorésistants femme enceinte
			200 mg / ml	solution buvable							
			200 mg	comprimé							
			500 mg	comprimé							
DEPAKINE CHRONO	valproate de sodium		500 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer au cours du repas Eviter les solution buvables gazeuses Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé à libération prolongée Préférez Dépakine® solution buvable → <i>adaptation de la posologie (verte de l'effet retard)</i> femme enceinte
DEPAKOTE	divalproate de sodium		250 mg	comprimé							A administrer au cours du repas Eviter les solution buvables gazeuses Préférez la solution buvable Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés gastrorésistants femme enceinte
			500 mg	comprimé							
DEPAMIDE	valpromide		300 mg	comprimé							A administrer pendant ou juste après le repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé gastrorésistant femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DEPRENYL	sélégiline		5 mg	cp bisécable							A administrer le matin au cours du petit déjeuner Ne pas croquer , ni écraser : comprimés gastrorésistants
DEPURATIF PARNEL	bardane + saponaire + pensée sauvage + fumeterre		130mg/130mg/130mg/130mg	sirop							
DEPURATUM	acore + aloès + bugrane + bouleau + bourdaine + fumeterre + genévrier + rhapouti + romarin + séné + thym		12,8mg/25,5mg/12,8mg/25,5mg/25,5mg/12,8mg/102mg/25,5mg/38,2mg/51mg/12,7mg	gélule				?	?		
DERMORELLE	vitamine E		200 mg	capsule molle							Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
DEROXAT	paroxétine		20 mg	cp pelliculé bisécable							Avaler plutôt que croquer (principe actif amer) : comprimé écrasé administrable par sonde
			20 mg / 10 ml	susp. buvable							Préférez suspension buvable : 1 cp ↔ 10 ml = 20 mg de paroxétine femme enceinte
DESERNIL	méthysergide		1,65 mg	cp bisécable							A administrer en une prise au cours du petit déjeuner
DESINTEX	thiosulfate de sodium et de magnésium		250 mg / 50 mg	comprimé enrobé							A administrer avant les repas Pharmacocinétique modifiée si broyage du comprimé + libération de la saveur soufrée désagréable → éructations : préférez la solution buvable diluée dans de l'eau
			350 mg / 150 mg (5ml)	solution buvable							
DESINTEX CHOLINE	thiosulfate de sodium et de magnésium + choline		1,5g/0,55g/2g (10 ml)	solution buvable							
DESINTEX infantile	magnésium + calcium + sodium + soufre		4mg/28mg/35mg/44mg (cuillère mesure)	granulés pour solution buvable							Granulés à croquer ou diluer dans de l'eau
DESLORATADINE	desloratadine		0,5 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer , ni écraser
			5 mg	cp pelliculé							Préférez la solution buvable
DESOBEL	désogestrel + éthinylestradiol		150 µg / 20 µg	comprimé							A administrer à heure fixe
			150 µg / 30 µg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			150 µg / 30 µg	comprimé							
DESOGESTREL	désogestrel		75 µg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, avec de l'eau Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
DESOGESTREL ETHINYL	désogestrel + éthinyloestradiol		150 µg / 20 µg	comprimé enrobé	 						
			150 µg / 30 µg	comprimé enrobé	 						
DESOPOP	désogestrel		75 µg	cp pelliculé	 						
DESURIC ATU	benzbromarone		100 mg	cp bisécable							Comprimé à avaler intact, tel quel avec de l'eau
DETENSIEL	bisoprolol		10 mg	cp bisécable							A administrer le matin avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
DETRUSITOL	toltérodine		1 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			2 mg	cp pelliculé		?	?		?		
DEXAMBUTOL	éthambutol		500 mg	cp pelliculé							A administrer le matin à jeûn, mélangé à de la compote ou du yaourt. Attendre 30 minutes avant la prise alimentaire
DEXAMBUTOL INH	éthambutol + isoniazide		400 mg / 150 mg	cp pelliculé							
DEXAMFETAMINE SULPHATE ATU	dexamphétamine sulphate		5 mg	comprimé		?	?		?		
DEXAMETHASONE PH	dexaméthasone		40 mg	cp bisécable		?	?		?		
DEXAMINE	dexamphétamine		5 mg	comprimé		?	?		?		
DEXEDRINE ATU	dexamphétamine		5 mg	comprimé		?	?		?		
DEXEF	céfradine		500 mg	gélule				?	?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DEXIR	dextrométorphane		7,5 mg / 5 ml	sirop			🍷		🍷		
			15 mg / 5 ml	sirop			🍷		🍷		
DEXSOL ATU	dexaméthasone	■	2mg / 5ml	solution buvable			🍷		🍷		
DEXTRINE-MALTOSE	complément alimentaire oral			poudre orale et entérale			🍷		🍷		Alimentation modulaire glucidique A ingérer 90 minutes avant ou après un repas
DEXTROCIDINE adulte	dextrométorphane		15 mg / 5 ml	sirop			🍷		🍷		A administrer au moment des troubles Utilisez la cuillère-mesure
DEXTROMETHORPHANE	dextrométorphane		1 mg / ml	sirop	■		🍷		🍷		Gobelet-doseur : 5 ml = 5 mg de dextrométorphane
			2 mg / ml	sirop	■		🍷		🍷		1 cuillère à soupe = 15 ml = 30 mg de dextrométorphane
DIABAMYL	metformine		500 mg	cp pelliculé		🍲	🍷		🍷		A administrer intacts, tels quels, au cours ou à la fin d'un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer, ni écraser
			850 mg	comprimé		🍲	🍷		🍷		Préférez la poudre orale de Glucophage® diluée dans 150 ml d'eau : administration immédiate
DIACEREINE	diacereine		50 mg	gélule	■	🍲		🍷	🍷		A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir, ni écraser ⚠️ femme enceinte
DIACOMIT	stiripentol	®	250 mg	poudre orale	■		🍷		🍷		A administrer au cours des repas Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir les gélules
		®	250 mg	gélule	■	🍲		🍷	🍷		Préférez la poudre orale administrée immédiatement après mélange avec de l'eau
		®	500 mg	gélule	■	🍲		🍷	🍷		Évitez la prise simultanée de solution buvables gazeuses, jus de fruit, produits laitiers ou contenant de la caféine ou de la théophylline (dégradation rapide en milieu acide)
		®	500 mg	poudre orale	■		🍷		🍷		
DIACOR LP	diltiazem		90 mg	gélule		🍲		🍷	🍷		
			120 mg	gélule		🍲		🍷	🍷		Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir les gélules à libération prolongée
			300 mg	gélule		🍲		🍷	🍷		
DIACTANE	naftidrofuryl		200 mg	gélule	■	🍲		🍷	🍷	A administrer au cours du repas Gélule ouvrable : incorporer les micro granules dans des aliments semi-liquides	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DIAFURYL	nifuroxazide		200 mg	gélule							Insoluble dans l'eau Ne pas associer à la prise d'alcool
DIALAMINE	mélange contenant 30 % d'AA essentiels et des glucides		200 g* (62 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale 1 arôme							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 5 d'eau A conserver au froid Traitement nutritionnel du déficit du cycle de l'urée, dès l'âge de 6 mois
DIALYPRO	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique		200 kcal / 45 g	poudre orale et entérale							A saupoudrer dans l'alimentation ou les solution buvables
DIAMICRON LP	gliclazide		30 mg	comprimé							A administrer 1 h avant le repas si la tolérance digestive le permet ou à la fin du petit déjeuner
			60 mg	comprimé sécable							Ne pas croquer, ni écraser : comprimés à libération modifiée
DIAMOX	acétazolamide		250 mg	cp bisécable							Principe actif amer : à administrer au cours des repas, avec un aliment ou du sirop de fruit ou par sonde dans de l'eau
DIARETYL	lopéramide		2 mg	gélule							Préférer la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
DIARGAL	aliment diététique complet : dextrines-maltose, TCM, caséine		400 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Aliment de régime, en cas de diarrhées, dès la naissance
DIARIGOZ	préparation diététique aux protéines partiellement hydrolysées, pauvre en lactose		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,4 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Aliment de régime, en cas de diarrhées ou de gastro-entérites
DIARSED	diphénoxylate + sulfate d'atropine		2,5 mg / 0,025 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni écraser
DIASIP	complément alimentaire oral sans saccharose		200 kcal / 200 ml	solution buvable 2 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
DIASTABOL	miglitol		50 mg	comprimé							A croquer avec la 1 ^{ère} bouchée de nourriture ou à avaler avec un peu de liquide au début des repas
			100 mg	comprimé							
DIAZEPAM	diazépam		2 mg	comprimé		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			5 mg	comprimé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			10 mg	comprimé		?	?		?		
DIBENYLIN ATU	phénoxybenzamine chlorhydrate		10 mg	gélule				?	?		
DIBENZYRAN ATU	phénoxybenzamine chlorure		10 mg	comprimé		?	?		?		
DIBRO-BE MONO ATU	bromure de potassium		850 mg	comprimé		?	?		?		
DICETEL	pinaverium bromure		50 mg	comprimé	 						A administrer intacts, tels quels, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser : comprimés gastrorésistants Évitez la position allongée ou la prise juste avant le coucher
			100 mg	comprimé	 						
DICLOFENAC	diclofénac		25 mg	comprimé	 						A administrer, avec un verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser : comprimés gastrorésistants à libération modifiée Préférez Voltarène® suppo à 25 mg ou 100 mg femme enceinte
			50 mg	comprimé	 						
DICODIN LP	dihydrocodéine		60 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
DICYNONE	étamsylate		250 mg	comprimé	 						Évitez la prise simultanée de lait Ampoule injectable à 250 mg = 2 ml utilisable par voie entérale
			500 mg	comprimé	 						
DIDRONEL	étidronate disodique		200 mg	comprimé							A administrer, en une prise unique, 2 h avant ou après les repas, avec de l'eau ou du jus de fruit Évitez les aliments lactés ou contenant du calcium Ne pas croquer , ni écraser
			400 mg	comprimé							
DIETIFINE	aliment hyperprotidique a-glucidique, enrichi en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		74 kcal / 25 g	poudre orale et entérale 15 saveurs							
DIETLINE	aliment hyperprotidique, enrichi en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		72 kcal / 25 g	poudre orale et entérale 5 saveurs salées							
			400 g	7 saveurs sucrées							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DIFFU-K	chlorure de potassium		600 mg	gélule							Pas d'ingestion de lait simultanée Gélule ouvrable mais sans écraser, ni sucer les microgranules Préférez le sirop de potassium
DIFICLIR	fidaxomicine		200 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer , ni écraser
DIFRAREL	myrtille + β carotène		100 mg / 5 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours des repas avec un grand verre d'eau Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
DIFRAREL E	myrtille + vitamine E		50 mg / 5 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
DIGEDRYL	boldine + bicarbonate et sulfate de sodium + phosphate monosodique		0,0096mg/666mg /54mg/32mg	cp effervescent							A administrer avant les repas Dégazez la solution
DIGOXINE	digoxine		0,05 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours des repas Préférez la solution buvable : pipette doseuse pour instiller directement dans la bouche de l'enfant et non pas dans le biberon
			0,25 mg	comprimé	 						
DI HYDAN	phénytoïne		100 mg	cp bisécable							A administrer au cours ou juste après les repas Comprimé éventuellement broyable femme enceinte
DIHYDROERGOTAMINE	dihydroergotamine		2 mg / ml	solution buvable	 						A administrer au cours d'un repas Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau
			3 mg	comprimé							
DILATRANE	théophylline		50 mg / 5 ml	sirop							
DILATRANE LP	théophylline		50 mg	gélule							A administrer, à heure fixe avec un liquide, avant ou au cours d'un repas Gélules ouvrables mais sans écraser les microgranules à libération prolongée Préférez le sirop ou la forme suppositoire à 350 mg → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
			100 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
			300 mg	gélule							
DILOXANIDE	dolixanide		500 mg	comprimé							
			90 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DILRENE LP	diltiazem		120 mg	gélule							Impossible : gélules contenant des microgranules à libération prolongée
			300 mg	gélule							
DILTIAZEM	diltiazem		60 mg	comprimé							
DILTIAZEM LP	diltiazem		90 mg	gélule							Gélules ouvrables mais sans croquer ou écraser les microgranules à libération prolongée
			120 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
			300 mg	gélule							
DIMEGAN	bromphéniramine		2 mg / 5 ml	sirop							Administration vespérale Gélule ouvrable mais sans croquer ou écraser les microgranules à libération prolongée Préférez le sirop
			12 mg	gélule							
DIMETANE sans sucre	pholcodine		1,33 mg / ml	sirop							1 cuillère mesure = 5 ml = 6,6 mg de pholcodine
DIMINEX ATU	mazindol		2 mg	cp bisécable							A administrer avant 14 h (risque d'endormissement), avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser Préférez le comprimé de Teronac® : la poudre obtenue par broyage est insoluble dans l'eau : mélangez à de la compote ou du yaourt femme enceinte
DIMOTAPP adulte expectorant	carbocistéine		50 mg / ml	sirop							
DINACODE	codéine + benzoate de sodium + serpolet		0,019mg/0,283g/ 0,56g (15 ml)	sirop							
			3,8mg/63,25mg/ 126,5mg (15 ml)	sirop							1 cuillère mesure = 5 ml = 3,8 mg de codéine + 3,5 g de saccharose
			300 mg	comprimé							A administrer au cours des repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DIO	diosmine		600 mg	cp dispersible							Crise hémorroïdaire : à administrer au cours des repas Insuffisance veineuse : à administrer le matin à jeun, 5 minutes avant le petit déjeuner
DIOSMINE	diosmine		300 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		Crise hémorroïdaire : à administrer au cours des repas Insuffisance veineuse : à administrer le matin à jeun, 5 minutes avant le petit déjeuner
			600 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			600 mg	poudre orale							
DIOVENOR	diosmine		300 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		Crise hémorroïdaire : à administrer au cours des repas Insuffisance veineuse : à administrer le matin à jeun, 5 minutes avant le petit déjeuner Préférez la poudre orale ou la suspension buvable
			600 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
			600 mg	susp. buvable							
DIPENTUM	olsalazine		250 mg	gélule	 			?	?		A administrer immédiatement après le repas
			500 mg	comprimé			?	?	?		
DIPHANTOINE	phénytoïne		100 mg	comprimé		?	?		?		A administrer avec du lait ou au moment des repas Préférez la solution buvable d'Epanutin® (en ATU) ou le comprimé broyable de Di-Hydan®
DIPHEMANIL PH pour le 2 mg	diphémanil		2 mg	cp bisécable		?	?		?		
			10 mg	cp bisécable		?	?		?		
DIPIPERON	pipampérone		40 mg / ml	solution buvable							A administrer tel quel avec de l'eau, le soir Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser Préférez la solution buvable : 1 ml = XX gouttes
			40 mg	cp bisécable							
DISSOLVUROL	silice colloïdale		2,5 mg / ml	solution buvable							A administrer diluée dans un verre d'eau, en dehors des repas
DISTILBENE	diéthylstilbestrol		1 mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DISULONE	oxalate de fer + dapsone	®	100 mg	cp bisécable							A administré mélangé à un liquide ou de la confiture ou du yaourt
DITROPAN	oxybutynine		1 mg / ml	solution buvable							A administrer à jeun ou au cours d'un repas, avec un verre d'eau ou de lait Préférez la solution buvable
			5 mg	cp bisécable							
DIVARIUS	paroxétine		20 mg	comprimé sécable	 						
DIVINA	estradiol + médroxyprogestérone	®	2 mg / 10 mg	comprimé							A administrer à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Si broyage : attention de ne pas perdre de principe actif
DIVISEQ	estradiol + médroxyprogestérone		2 mg / 10 mg	comprimé							
DOGMATIL	sulpiride		5 mg / ml	solution buvable							Préférez la solution buvable 1 gélule = 50 mg ↔ 2 cuillères à café = 10 ml
			50 mg	gélule							
			200 mg	comprimé sécable	 						
DOLENIO	glucosamine		1 178 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer au cours ou en dehors des repas, avec un peu d'eau ou un autre liquide femme enceinte
DOLIDON	paracétamol + caféine		500 mg / 50 mg	cp effervescent							
DOLIPRANE	paracétamol		100 mg	poudre orale							A administrer avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit Ne pas croquer, ni mâcher la gélule et les comprimés (goût très amer) Broyage possible des comprimés si administration par sonde entérale
			150 mg	poudre orale							
			200 mg	poudre orale							
			300 mg	poudre orale							
			500 mg	poudre orale							
			500 mg	gélule							
			500 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			500 mg	comprimé							sonde entérale Préférez la poudre orale ou les comprimés orodispersibles ou effervescents : dégazez la solution Comprimés orodispersibles : laisser fondre (sans croquer) dans la bouche puis prendre un verre d'eau après la prise, ou dissoudre dans de l'eau et bien agiter avant l'emploi
			500 mg	cp effervescent							
			1 g	comprimé							
			1 g	cp effervescent							
			1 g	poudre orale							
			1 g	gélule							
DOLIPRANE sans sucre	paracétamol		24 mg / ml (100 ml)	poudre orale							
			500 mg	cp orodispersible							
DOLIPRANELIB	paracétamol		500 mg	comprimé	 						A administrer tel quel avec de l'eau, du lait ou un jus de fruit
DOLIPRANEORO	paracétamol		500 mg	cp orodispersible							Laissez fondre le comprimé dans la bouche sans le croquer, puis si besoin boire un verre d'eau Ne pas écraser : disperser dans un ½ verre d'eau en agitant, puis administration immédiate
DOLIPRANE VITAMINE C	paracétamol		500 mg / 150 mg	cp effervescent							Boire immédiatement après dissolution complète dans un grand verre d'eau
DOLI RHUME	paracétamol + pseudo éphédrine		500 mg / 30 mg	comprimé							A administrer intact avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
DOLIRHUME jour	paracétamol + doxylamine		500 mg / 30 mg	comprimé							A administrer avec un grand verre d'eau
DOLIRHUME nuit	paracétamol + pseudo éphédrine		500 mg / 7,5 mg	comprimé							
DOLI RHUMEPRO	cp jour : paracétamol + pseudoéphédrine		500 mg / 30 mg	comprimé	 						A avaler tels quels, avec un grand verre d'eau
	cp nuit : paracétamol + doxylamine		500 mg / 7,5 mg	comprimé	 						
DOLITABS	paracétamol lyoc		500 mg	comprimé orodispersible							Laissez fondre dans la bouche et prendre un verre d'eau ensuite, ou dissoudre dans un verre d'eau
			30 mg / ml	solution buvable							A administrer avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DOLKO	paracétamol		500 mg	cp bisécable							Ne pas croquer, ni mâcher les comprimés (goût très amer) Broyage possible des comprimés si administration par sonde entérale Préférez la solution buvable ou la poudre orale
			500 mg	poudre orale							
			1 g	cp bisécable							
DOLOSOFT	haptagophyton		450 mg	cp enrobé							A avaler avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser : comprimé gastro-résistant
DOLTAQUE	ibuprofène		200 mg	cp pelliculé							A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser Préférez Nureflex® suspension buvable femme enceinte
DOLUTEGRAVIR ATU	dolutégravir		50 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser femme enceinte
DOMPERIDONE	dompéridone		1 mg / ml	solution buvable							A administrer avant un repas Laissez fondre le comprimé dispersible dans la bouche ou le dissoudre dans un verre d'eau Solution buvable : utilisez la seringue doseuse pour l'administration
			10 mg	cp orodispersible							
			10 mg	cp pelliculé							
			20 mg	cp pelliculé sécable							
DONEPEZIL	donépézil		5 mg	cp orodispersible							A administrer à heure fixe, avec un verre d'eau, le soir avant le coucher au cours ou après un repas Pour administration par sonde digestive : préférez les comprimés orodispersibles dissous dans un verre d'eau
			5 mg	cp pelliculé							
			10 mg	cp orodispersible							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			10 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
DONORMYL	doxilamine		15 mg	cp bisécable	 						Dégagez la solution effervescente
			15 mg	cp effervescent							
DOPERGINE	lisuride		0,2 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas ou d'une collation Photosensible : administration immédiate
			0,5 mg	cp bisécable							
DOSTINEX	cabergoline		0,5 mg	comprimé							A administrer au milieu du repas ou avec une légère collation le soir au coucher
DOXAZOSINE LP	doxazosine		4 mg	cp pelliculé							Administrer tel quel, au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau ou un liquide Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			8 mg	cp pelliculé							
DOXIUM	dobésilate de calcium		250 mg	comprimé							A administrer au milieu d'un repas Goût très amer , broyage possible si administration par sonde : administration immédiate Interactions possibles avec le fer
DOXY	doxycycline		50 mg	cp pelliculé							A administrer au milieu du repas et plus d'une heure avant le coucher, avec un grand verre d'eau (100 ml) ou de lait si irritation gastrique Position couchée ou insuffisance d'eau → dysphagie, œsophagite, ulcérations œsophagiennes
			100 mg	cp pelliculé							
DOXYCYCLINE	doxycycline		100 mg	cp pelliculé	 						
DOXYLAMINE	doxylamine		15 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer 15 à 30' avant le coucher, avec de l'eau
DOXYLIS	doxycycline		100 mg	cp bisécable							A administrer au milieu du repas et plus d'une heure avant le coucher, avec un grand verre d'eau (100 ml) ou de lait si irritation gastrique
DOXPALII	doxycycline		50 mg	comprimé							Position couchée ou insuffisance d'eau → dysphagie

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DOXYLINE	doxycycline		100 mg	comprimé							Position couchée ou insuffisance d'eau - dysphagie, œsophagite, ulcérations œsophagiennes
DRAGEES FUCA	bourdaine + cascara + fucus		100mg/100mg/50mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser
DRAGEES VEGETALES REX	bourdaine + cascara		20 mg / 24 mg	cp pelliculé		?	?		?		
DRAINACTIL	boldo + bouleau + cassis		47,2mg/47,2mg/23,6g	solution buvable							A administrer, diluée dans de l'eau, au cours ou après un repas
DRAMAMINE	dimenhydrinate		50 mg	cp pelliculé quadrisécable							Comprimé à avaler intact ou broyage possible
DRILL adulte expectorant	carbocistéine		750 mg / 15 ml	sirop							
			750 mg / 15 ml	solution buvable							
DRILL rhume	paracétamol + chlorphénamine		500 mg / 4 mg	cp pelliculé	 						A administrer avec une boisson (eau, lait, jus de fruit), de préférence le soir (effet sédatif) Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
DRILL toux sèche	dextrométophane		5 mg / 5 ml	sirop							
			15 mg / 5 ml	sirop							
DRIPTANE	oxybutynine		5 mg	cp bisécable							A administrer avec un verre d'eau ou de lait, à jeun ou au cours d'un repas
DROPIBEL	éthinyloestradiol + drospirone		0,02 mg / 3 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas, avec un peu d'eau Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,03 mg / 3 mg	cp pelliculé	 						
DULCOLAX	bisacodyl		5 mg	comprimé enrobé	 						Administration le soir : fait effet 10 h après Administration le matin à jeun : fait effet 5 h après Ne pas croquer , ni écraser : comprimé gastrorésistant Préférez le suppositoire à 10 mg Évitez les solution buvables alcalines (Vichy, Appolinaris, Badoit)
DUOCAL LIQUIDE	mélange énergétique glucido-lipidiques- sans protéines, à très basse teneur en électrolytes		250 ml (425 kcal)	solution buvable							Substitut du lait sans protéines dans les maladies du métabolisme des AA, maladies rénales ou hépatiques, chez les nourrissons, enfants et adultes
DUOCAL SUPER SOLUBLE			400 g	poudre orale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
DUODOPA	lévodopa + carbidopa		20 mg/ml + 5 mg/ml sachet 100 ml	gel intestinal							Suspension dans un gel à administrer directement dans une sonde duodénale ou jéjunale, en continu avec une pompe programmable
DUOPLAVIN	clopidogrel + acide acétylsalicylique		75 mg / 75 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Goût amer : broyage possible si administration par sonde entérale
			75 mg / 100 mg	cp pelliculé							
DUOVA	estradiol + médroxyprogestérone		1 mg / 2,5 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Si broyage : attention de ne pas perdre de principe actif
			2 mg / 5 mg	comprimé							
			2 mg / 5 mg	comprimé							
DUPHALAC	lactulose		10 g / 15 ml	solution buvable et rectale							A avaler pure ou diluée dans un liquide Pour l'administration par sonde digestive : à diluer dans de l'eau
DUPHASTON	dydrogestérone		10 mg	comprimé	 						Administration immédiate avec un aliment
DUSPATALIN	mébévérine		10 mg / ml	susp. buvable							A administrer avant le repas Préférez la suspension buvable : 1 cp à 100 mg ↔ 10 ml
			100 mg	comprimé							Comprimé écrasable mais la molécule est anesthésique au contact des muqueuses : broyage possible si aucun contact avec muqueuses = administration uniquement par sonde entérale
			200 mg	gélule							Gélule ouvrable mais sans écraser les micro granules gastrorésistants
DYNABAC	dirthromycine		250 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimé gastrorésistant
DYNAMISAN	glutamate d'arginine		3 g	poudre orale							
			3 g / 10 ml	solution buvable							
DYSALFA	térazosine		1 mg	comprimé	 						A administrer en une prise le soir avant le coucher
			5 mg	comprimé	 						
DYSPAGON	lopéramide		2 mg	gélule							Préférez la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
EASIPHEN	mélange équilibré d'AA sans phénylalanine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines, sels minéraux et oligoéléments		250 ml (163 kcal)	solution buvable 3 saveurs							Prête à l'emploi : agiter avant ouverture : conservation 24 h au réfrigérateur Indiquée dès 8 ans et chez la femme enceinte si phénylcétonurie
EBASTINE	ébastine		10 mg	cp orodispersible	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Placez le comprimé sur la langue, il s'y disperse rapidement : de l'eau ou un liquide ne sont pas nécessaires
EBIXA	mémantine		10 mg / g de solution	solution buvable							A administrer à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas
			10 mg	cp pelliculé bisécable	 						Goût amer : broyage possible si administration par sonde
			20 mg	cp pelliculé							Préférez la solution buvable : 1 cp à 10 mg ↔ XL gouttes
ECAZIDE	captopril + hydrochlorothiazide		50 mg / 25 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer le matin à heure fixe avec un peu d'eau, au cours ou en dehors des repas femme enceinte
EDISTON	nifuroxazide		200 mg	gélule				?	?		
EDURANT	rilpivirine		25 mg	cp pelliculé							A administrer en une prise, au cours d'un repas, tel quel avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
EFEZIAL	gestodène + éthinylestradiol		75 µg / 20 µg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe
			75 µg / 30 µg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
EFFENTORA	chlorhydrate de fentanyl		100 µg	cp gingival							Placez immédiatement le comprimé après ouverture de la plaquette près d'une molaire entre la joue et la gencive ou sous la langue
			200 µg	cp gingival							Ne pas sucer, ni mâcher, ni avaler
			400 µg	cp gingival							Désintégration du comprimé : 14 à 25 minutes, après 30 minutes, avalez les morceaux restant avec un verre d'eau
			600 µg	cp gingival							Lorsqu'un comprimé est dans la bouche : ne pas boire ni manger
			800 µg	cp gingival							Si irritation des muqueuses buccales : changez l'emplacement du comprimé Alternative : la solution nasale de fentanyl, le comprimé sublingual d'Abstral®, la sucette d'Actiq®, le patch transdermique de Durogesic® ou les sprays

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
EFFERALGAN	paracétamol		80 mg	poudre orale effervescente							Comprimés à administrer tels quels avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit Ne pas croquer ou écraser : goût très amer : broyage possible du comprimé si administration par sonde entérale Préférez la solution buvable, la poudre orale ou le comprimé effervescent : dégazez la solution
			30 mg / ml	solution buvable							
			150 mg	poudre orale effervescente							
			250 mg	poudre orale effervescente							
			500 mg	cp effervescent							
			500 mg	comprimé							
	1 g	cp effervescent									
EFFERALGAN CODEINE	paracétamol + codéine		500 mg / 30 mg	cp effervescent							Dégazez la solution
EFFERALGANODIS	paracétamol		500 mg	cp orodispersible							Comprimé à laisser fondre sur la langue, s'utilise sans eau
EFFERALGANTAB	paracétamol		1 g	comprimé	 						A administrer tel quel avec un liquide (eau, lait, jus de fruit) Ne pas croquer, ni écraser
EFFEXOR LP	venlafaxine		37,5 mg	gélule							A administrer en une fois, à heure fixe, toujours au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser, mais gélules ouvrables sans mâcher le contenu administrable dans une sonde entérale ou mélangé à une compote
			75 mg	gélule							
EFFIMAX.4	complément alimentaire oral hypercalorique		400 cal / 200 ml	solution buvable 1 saveur							
EFFIPREV	éthinyloestradiol + norgestimate		0,035 mg / 0,25 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
EFFIZINC	gluconate de zinc		15 mg	gélule							A administrer, avec un verre d'eau, le matin à jeun à distance du repas
EFFORTIL	étiléfrine		5 mg	comprimé	 						Préférez la solution buvable : 1 ml = XV gouttes = 7,5 mg 1 cp ↔ X gouttes
			7,5 mg / ml	solution buvable							
EFIENT	prasugrel		10 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
EFIMAG	pidolate de magnésium		2,25 g	poudre orale							A administrer, dissoute dans de l'eau, avant ou au cours d'un repas
EFRYL RHUME	pseudoéphédrine		60 mg	granulés pour solution buvable							Dissoudre dans un verre d'eau
EGATEN	triclabendazole		250 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer après un repas
EGERY	érythromycine		250 mg	gélule							A administrer avant les repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni ouvrir, ni écraser : microgranules gastrorésistants
ELAVIL	amitriptyline		25 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou juste après les repas Préférez le Laroxyl® en solution buvable à 4 % : 1 cp ↔ XXV gouttes
ELEMENTAL EXTRA	mélange d'AA spécifiques, enrichi en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligo-éléments		250 ml (80 kcal/100 ml)	solution buvable 4 saveurs							Mélangez 1 sachet de poudre dans de l'eau Indiqué dans la maladie de Crohn, jusqu'à 5 ans
			100 g	poudre orale 1 saveur + 1 goût neutre							
ELEVIT VITAMINE B ₉	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₈ + B ₉ + B ₁₂ + C + D ₃ + E + PP + calcium + cuivre + fer + magnésium + manganèse + phosphore + zinc		4 000UI/1,6mg/1,8mg/2,6mg/4µg/100mg/500UI/15mg/10mg/0,2mg/0,8mg/19mg/125mg/1mg/60mg/100mg/1mg/125mg/7,5mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer à distance des autres médicaments
ELIQUIS	apixaban		2 mg	cp enrobé							A administrer au début ou en dehors d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser
			2,5 mg	cp pelliculé	 						
ELISOR	pravastatine		10 mg	comprimé sécable							A administrer plutôt le soir pendant ou en dehors des repas
			20 mg	comprimé sécable							
			40 mg	comprimé sécable							
ELIXIR BONJEAN	mélisse + orange amère + cumin + anis + cachou		6 g de chaque (15 ml)	solution buvable							
ELIXIR PAREGORIQUE	opium + acide benzoïque + anis + camphre + alcool éthylique		0,25g/0,25g/0,25g/0,1g/49,15g (100 g)	solution buvable							Solution à diluer dans un verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ELIXIR SPARK	artichaut + boldo		100 mg	solution buvable							A administrer le matin à jeun ou le soir au coucher
ELLAONE	ulipristal		30 mg	comprimé							A administrer au cours ou en dehors des repas
ELMIRON ATU	pentosane		100 mg	gélule				?	?		A administrer au moins 1 h avant ou 2 h après les repas
ELMISOL ATU	lévamisole		5 mg	comprimé		?	?		?		
			10 mg	comprimé		?	?		?		
			25 mg	comprimé		?	?		?		
			50 mg	comprimé		?	?		?		
	ail		140,25mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau Ne pas ouvrir la gélule : gastro-résistante
	algues brunes + aloès		30 à 200 mg / 28,6 mg à 55,5 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	artichaut		200 mg	gélule							
	aubépine		200 mg	gélule							
	bardane		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	boldo		200 mg	gélule							
	busserole		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	cassis		200 mg	gélule							
	eschscholtzia		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	fénugrec		250 mg	gélule							
	fragon		200 mg	gélule							
	frêne		200 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ELUSANE CALMODIGER	fucus		400 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	fumeterre		200 mg	gélule							
	gattilier		100 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	ginseng		200 mg	gélule							
	grande camomille		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	hamamélis		200 mg	gélule							
	harpagesic		200 mg	gélule							
	marronnier d'Inde		200 mg	gélule							
	mate		200 mg	gélule							
	mélilot		200 mg	gélule							
	millepertuis		300 mg	gélule							A administrer toujours aux mêmes heures, avec un grand verre d'eau A éviter ou arrêter
	natudor (aubépine + passiflore)		100 mg / 100 mg	gélule							
	orthosiphon		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	ortie		200 mg	gélule							
	passiflore		200 mg	gélule							
	pensée sauvage		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	phytofibre		390 mg	gélule							
	piloselle		200 mg	gélule							
prêle		200 mg	gélule								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	quinquina		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	reine des prés		200 mg	gélule							
	salicaire		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	saule		200 mg	gélule							
	starphyt (ginseng + kola)		10 mg / 150 mg	gélule							
	thé vert		200 mg	gélule							
	valériane		200 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau
	vigne rouge		200 mg	gélule							
EMEND	aprèpitant		80 mg	gélule							A administrer au cours ou en dehors des repas
			125 mg	gélule							
EMSOGEN	mélange spécial d'AA à forte teneur en TCM, supplémenté en glucides, lipides, sels minéraux, vitamines et oligoéléments		100 g	poudre orale 1 saveur + 1 goût neutre							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau : 1 volume de poudre pour 5 d'eau Indiqué dans les malabsorptions graves rebelles
EMTRIVA	emtricitabine		10 mg / ml	solution buvable							A administrer, avec un verre d'eau, au cours ou en dehors des repas Préférez la solution buvable
			200 mg	gélule				?	?		femme enceinte
ENALAPRIL	énalapril		5 mg	cp bisécable	 	?	?		?		A administrer avant, pendant ou après un repas
			20 mg	cp bisécable	 	?	?		?		femme enceinte
ENALAPRIL HCTZ	énalapril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp bisécable	 						A administrer en une prise Ne pas écraser : molécule hygroscopique femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvrerture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ENDIUM	diosmine		300 mg	poudre orale							Crise hémorroïdaire : à administrer au cours des repas Insuffisance veineuse : à administrer le matin à jeun, 5 minutes avant le petit déjeuner Préférez la poudre orale
			600 mg	comprimé		?	?		?		
ENDOTELON	oligomères procyanidoliques		50 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés gastrorésistants
			150 mg	comprimé							
ENDOXAN	cyclophosphamide		50 mg	comprimé enrobé							Cytotoxique Forme injectable reconstituée avec de l'eau utilisable dans la sonde entérale : conservation 2 semaines au réfrigérateur femme enceinte
ENERGIE POWER	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + E + B ₈ + B ₉ + calcium + magnésium + phosphore + zinc + fer + cuivre + manganèse + chrome + molybdène + sélénium + potassium + chicorée		800µg / 1,4mg / 1,6 mg / 6mg / 2mg / 0,001mg / 18mg / 120mg / 0,005mg / 10 mg / 0,15mg / 0,2 mg / 247mg / 120 mg / 191mg / / 7,5 mg / 4,2mg / 0,9mg	cp effervescent							A administrer le matin après dissolution dans un verre d'eau Dégazez la solution femme enceinte
ENERGITUM	glutamate d'arginine		2,5 g / 10 ml	solution buvable	 						A administrer, diluée dans de l'eau, au cours d'un repas
ENERGIVIT	mélange glucido-lipidique sans protéines, enrichi en vitamines sels minéraux et oligo-éléments		400 g* (492kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter : 1 volume de poudre pour 4 d'eau Indiquée comme complément énergétique ou dans une nutrition modulaire
ENFAMIL AR 1	préparation lactée pour nourrisson normocalorique, enrichie en Lipil, sans gluten		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Aliment de régime antirégurgitation, pour nourrisson jusqu'à 5 mois
			400 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
			900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
ENFAMIL AR 2	préparation lactée de suite normocalorique, enrichie en Lipil, sans gluten		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Aliment de régime antirégurgitation, de 6 mois à 1 an, peut être incorporé à des purées, potages, bouillies et desserts
ENFAMIL HA DIGEST	lait poudre hypoallergénique		400 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			850 g* (66 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Pour les nourrissons aux antécédents familiaux allergiques
ENFAMIL NUTRI BABY 2	préparation lactée de suite, normocalorique		900 g* (69 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,8 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour les nourrissons gros mangeurs de 6 mois à 1 an
ENFAMIL O LAC	aliment complet et équilibré de substitution au lait, appauvri en lactose		400 g* (68 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Traitement diététique en cas de diarrhées aiguës banales, intolérance au lactose ou au saccharose ou de galactosémie congénitale
ENFAMIL PREMIUM 1	préparation pour nourrisson enrichie en Lipil		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour les nourrissons de la naissance à 5 mois
			400 g* (68 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							
			900 g* (68 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							
ENFAMIL PREMIUM 2	préparation de suite enrichie en Lipil		900 g* (69 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,7 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour les nourrissons de 6 mois à 1 an
ENFAMIL PREMIUM 3	boisson lactée de croissance		850 g	poudre orale et entérale							Mélangez 8 mesures arasées de poudre à 240 ml d'eautiédie : à conserver au réfrigérateur Pour les nourrissons de 1 à 3 ans
ENLIVE PLUS	complément alimentaire oral glucides + protéides : sans gluten, sans lipides		330 kcal / 220 ml	solution buvable 4 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
ENOXOR	enoxacine		200 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours des repas
ENRICH FIBRES	mélange ternaire polymérique avec fibres isocalorique normoprotidique		250 ml	solution entérale							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml	solution entérale							
ENRICH PLUS	complément alimentaire oral hypercalorique		307 kcal / 240 ml	solution buvable 3 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
ENSURE HP	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique		300 cal / 240 ml	solution buvable 4 saveurs							
ENSURE PLUS FRESH	complément alimentaire oral hypercalorique		330 cal / 220 ml	solution buvable 3 saveurs							
ENSURE PLUS	complément alimentaire oral hypercalorique		300 kcal / 200 ml	solution buvable 5 saveurs							
ENTACAPONE	entacapone		200 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ENTECET	amylase + polyenzyme + rizolipase + orge germé + protéase		50mg/70mg/50 mg/150mg/50mg	comprimé enrobé	■	?	?		?		
ENTEROPATHYL	sulfaguanidine		500 mg	comprimé							Comprimés broyés peuvent être mélangés à un yaourt ou des aliments plutôt sucrés
ENTOCORT	budézonide	®	3 mg	gélule							A administrer avec du jus d'orange ou du Coca-Cola La gélule contient des microgranules entéro-résistantes L'association à du pamplemousse double le passage systémique
ENZALUTAMIDE ATU	enzalutamide	■	40 mg	capsule molle							A avaler en tière avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni dissoudre, ni ouvrir la capsule femme enceinte
EPANUTIN ATU	phénytoïne	■	30 mg /5 ml	susp. buvable							
EPHEDRINE HYDROCHLORIDE ATU	éphédrine (chlorhydrate)	■	15 mg	comprimé		?	?		?		
EPHYDION	codéthyline + grindélia + benzoate de sodium		0,098g/3,3g/0,198g (100 ml)	sirop							
			0,8 g/0,2 g/0,4 g (100 ml)	solution buvable	■						
EPHYNAL	vitamine E		100 mg	comprimé enrobé							Les comprimés doivent être croqués ou sucés
EPITOMAX	topiramate	■	15 mg	gélule							Après ouverture, le contenu des gélules doit être avalé immédiatement sans être mâché Préférez d'autres anti-épileptiques : Dihydan®
		■	25 mg	gélule							
			50 mg	cp pelliculé	■ ■ ■						
		■	50 mg	gélule							
		■	100 mg	cp pelliculé	■ ■ ■						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			200 mg	cp pelliculé	 						
EPIVIR	lamivudine		10 mg / ml	solution buvable							A administrer de préférence à jeun Préférez la solution buvable ou de Zeffix® : 1 cp ↔ 15 ml
			150 mg	cp pelliculé	 						
			300 mg	cp pelliculé	 						
EPTAVIT	calcium + vitamine D ₃		1 g / 880 UI	cp effervescent							Dégazez la solution
EQUANIL	méprobamate		250 mg	comprimé enrobé							A administrer mélangé à de la compote pour masquer le goût amer : broyage sans problème si administration par sonde entérale
			400 mg	comprimé enrobé sécable							
ERCEFURYL	nifuroxazide		40 mg / ml	susp. buvable							Préférez la suspension buvable à 4 % : 1 cuillère mesure = 200 mg
			200 mg	gélule							
ERCESTOP	lopéramide		2 mg	gélule							Préférez la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
ERGIX toux sèche	dextrométhorphane		1,5 mg / ml	sirop	 						Ne pas croquer la gélule, l'avaler telle quelle avec de l'eau Préférez le sirop : utilisez le gobelet doseur
			2,5 mg / ml	sirop	 						
			20 mg	gélule							
ERGIX adulte expectorant	carbocistéine		50 mg / ml	solution buvable							
ERGIX douleur et fièvre	ibuprofène		200 mg	comprimé	 						A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ERGYBIOL	filtrat d'eau argileuse + concentré d'eau de mer désodé + sorbate de potassium + gluconate de fer + chlorures de zinc et de chrome + sulfates de cuivre et de manganèse + sélénite de sodium + molybdate de sodium + acide lactique		250 ml	solution buvable			🍷		🍷		
ERGYPHILUS	lactobacillus rhamnosus + lactobacillus casei + lactobacillus acidophilus + bifidobacterium bifidus		1,00 milliard / 0,62 milliard / 0,25 milliard / 0,12 milliard	gélule		🍷		🍷	🍷		
ERY	érythromycine		125 mg	granulés		🍷	🍷		🍷		A administrer avant le repas
			250 mg	granulés		🍷	🍷		🍷		
			500 mg	comprimé		🍷	🍷		🍷		
ERYTHROCINE	érythromycine		500 mg	cp pelliculé	🟡 🔴	🍷	🍷		🍷	☹️	A administrer avant le repas Préférez les granulés à dissoudre dans de l'eau Ne pas administrer la solution injectable par voie entérale : instabilité en milieu acide
			500 mg	granulés pour solution buvable		🍷	🍷		🍷		
			1 g	granulés pour solution buvable		🍷	🍷		🍷		
ERYTHROMYCINE PH	érythromycine	🟢	500 mg	gélule		🍷		?	?		
ESBERIVEN FORT	mélilot + rutoside		30 mg / 250 mg	comprimé enrobé		?	?		?		Préférez la solution buvable
			1 g / 250 mg	solution buvable	🟣		🍷		🍷		
ESBRIET	pirfénidone		267 mg	gélule		🍷		🍷	🍷		<p>Avalez la gélule entière avec de l'eau ou un aliment pour réduire les risques de nausées et de vertiges</p> <p>Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir</p> <p>Ne pas associer à du jus de pamplemousse</p> <p>⚠️ femme enceinte</p>
ESIDREX	hydrochlorothiazide	🟢	25 mg	cp bisécable		🍷	🍷		🍷		Goût désagréable : broyage possible du comprimé si administration par sonde entérale

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ESKAZOL	albendazole		400 mg	comprimé sécable							Peut être croqué ou avalé avec très peu d'eau au cours d'un repas Évitez les repas riches en graisses
ESOMEPRAZOLE	ésoméprazole		20 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser les comprimés ou les gélules Gélules ouvrables mais sans écraser les microgranules gastro-résistantes : mélangez les granules à un verre d'eau non gazeuse, les boire dans les 30 minutes suivantes après avoir bien remué, rincer le verre avec le contenu d'un ½ verre d'eau et le boire ou injecter dans une sonde gastrique et rincer
			20 mg	gélule	 						
			40 mg	cp pelliculé	 						
			40 mg	gélule	 						
ESPERAL	disulfiram		500 mg	comprimé							A administrer le matin au cours d'un repas avec un ½ verre d'eau Abstinence d'alcool depuis au moins 24 heures
ESTIMA	progestérone		100 mg	capsule molle							A administrer le soir, avant le coucher, en dehors du repas Capsule orale et vaginale : peut être sucée
			200 mg	capsule molle							
ESTRACYT	estramustine		140 mg	gélule	 						femme enceinte
ESTREVA	estradiol		1,5 mg	cp bisécable							Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ESTROFEM	estradiol		1 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			2 mg	cp pelliculé							
ESTULIC	guanfacine		2 mg	cp bisécable							A avaler avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
ETHINYLESTRADIOL	éthinyloestradiol		0,05 mg	cp bisécable							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ETHINYLESTRADIOL DROSPIRENONE	éthinyloestradiol + drospirénone		0,02 mg / 3 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,03 mg / 3 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			0,05 mg / 0 mg	cp pelliculé							
ETHINYLESTRADIOL LEVONORGESTREL	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		30 µg / 150 µg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ETHIONAMIDE	éthionamide		250 mg	gélule				?	?		
ETIDRONATE	acide étidronique		200 mg	comprimé							A administrer, en une prise unique, 2 h avant ou après les repas, avec un liquide Évitez les aliments lactés ou contenant du calcium Ne pas croquer , ni écraser
			400 mg	comprimé							
ETIOVEN	naftazone		30 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en milieu de journée
EUCALCIC	carbonate de calcium		1,2 g / 15 ml	susp. buvable							A administrer au cours d'un repas
EUCALYPTINE	ciméole + codéine		3,2 mg / 18,3 mg (15 ml)	sirop							
EUCOL	oxoglurate d'arginine		1,5 g	cp effervescent bisécable							Dégazez la solution
EUCREAS	vildagliptine + metformine		50 mg / 1 000 mg	comprimé							la prise pendant ou juste après la prise d'aliments peut diminuer les symptômes gastro-intestinaux dus à la metformine Ne pas croquer , ni écraser
EUGLUCAN	glibenclamide		5 mg	cp bisécable							Administrer la dose initiale avant le petit déjeuner, puis avant les principaux repas Goût amer : broyage possible du comprimé si administration par sonde entérale
EULEXINE	flutamide		250 mg	cp bisécable							
EUPANTOL	pantoprazole		20 mg	comprimé enrobé	 						A administrer tel quel avec de l'eau, avant un repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimé gastro-résistant
			40 mg	comprimé enrobé	 						
EUPHON	codéine + érysimum		15 mg / 45 mg	gélule							Préférez la forme sirop
			15 mg / 45 mg (15 ml)	sirop							
			50 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
EUPHYLLINE	théophylline		100 mg	gélule							Gélules ouvrables, mais ne pas écraser ni trop remuer les microgranules Mélanger avec un aliment liquide ou semi-liquide : yaourt, compote A administrer immédiatement : la libération du principe actif débute dès le contact avec l'eau
			200 mg	gélule							
			300 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
EUPHYPERTUIS	millepertuis		500 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer à heure fixe, de préférence le matin ou le soir, pendant ou après un repas, avec un peu de liquide A éviter ou arrêter
EUPHYTOSE	aubépine + passiflore + valériane + ballote		10mg/40mg / 50mg/10mg	comprimé enrobé							A avaler tel quel avec de l'eau ou une solution buvable chaude Ne pas croquer, ni écraser
EUPNERON	éprozinol			sirop							
EUPRESSYL	urapidil		30 mg	gélule	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas écraser les microgranules A administrer immédiatement : la libération du principe actif débute dès le contact avec l'eau
			60 mg	gélule	 						
EURARTESIM	pipéraquline + dihydroartémisinine		320 mg / 40 mg	cp pelliculé biécable	 						A administrer avec de l'eau, à heure fixe, 3 heures avant ou après un repas
EURELIX LP	pirétanide		6 mg	gélule							Gélule ouvrable mais ne pas remuer ou écraser les microgranules: administration immédiate
EUROBIOL	poudre de pancréas		12 500 U / dose	granulés							A administrer au cours d'un repas Préférez les granulés administrés dans un aliment tiède ou froid Chez le nourrisson et le gastrectomisé : ouvrir les gélules et administrer les microgranules gastrorésistants immédiatement, dans un milieu non alcalin (pas de bicarbonate, Badoit, Vichy) pour éviter un délitement prématuré, préférez le jus d'orange
			25 000 U	gélule							
EUTHYRAL	liothyronine + lévothyroxine sodique		0,02 mg / 0,1 mg	comprimé sécable							A administrer le matin à jeun
EVANECIA	lévonorgestrel + éthinyloestradiol		0,05 mg / 0,03 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,075 mg/0,04 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			0,125 mg / 0,03 mg	comprimé							
EVEPAR	cyprotérone + éthinylestradiol		2 mg / 0,035 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
EVIPLERA	emtricitabine + rilpivirine + ténofovie		200mg/25mg/24 5mg	cp pelliculé	 						A administrer tel quel au cours d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser femme enceinte
EVISTA	raloxifène		60 mg	cp pelliculé	 						A administrer avec un verre d'eau, avant pendant ou après un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
EXACOR	cibenzoline		130 mg	cp pelliculé bisécable							
EXACYL	acide tranexamique		1 g / 10 ml	solution buvable							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la solution buvable
			500 mg	cp pelliculé							
EXELON	rivastigmine		1,5 mg	gélule							
			2 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, avec une solution buvable
			3 mg	gélule							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la solution buvable ou le patch transdermique ou de l'Aricept®
			4,5 mg	gélule							
			6 mg	gélule							
EXEMESTANE	exemestane		25 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, après un repas
			25 mg	cp enrobé							femme enceinte
EXFORGE	amlodipine + valsartan		5 mg / 80mg	comprimé							
			5 mg / 160 mg	comprimé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau
			10 mg / 160 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
EXFORGE HCTZ	amlodipine + valsartan + hydrochlorothizide		5mg/160m/12,5 mg	cp pelliculé	■						A administrer au même moment de la journée, le matin de préférence, tels quels, avec un peu d'eau
			5mg/160m/25m g	cp pelliculé	■						
			10mg/160m/12,5 mg	cp pelliculé	■						
			10mg/160m/25 mg	cp pelliculé	■						
EXIDOL	paracétamol + caféine		500 mg / 50 mg	cp effervescent						Boire immédiatement après dissolution Dégazer la solution	
EXJADE	déférasirox		125 mg	cp dispersible						A administrer à jeun, 30 minutes avant une collation/un repas, à heure fixe	
			250 mg	comprimé						Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Ne pas diluer dans du lait ou des solution buvables gazeuses , dissoudre dans de l'eau ou du jus de pomme ou d'orange	
			500 mg	cp dispersible							
EXOMUC	acétylcystéine		100 mg	granulés pour solution buvable						A administrer à heure fixe, à jeun, 30 minutes avant une collation/un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Ne pas diluer dans du lait ou des solution buvables gazeuses , dissoudre dans de l'eau ou des jus de pomme ou d'orange	
			200 mg	granulés pour solution buvable							
EXOTOUX	carbocystéine		50 mg / ml	solution buvable						Dissoudre dans un peu d'eau	
EXPANDOX	paracétamol		500 mg	comprimé						Goût très amer : broyage possible si administration par sonde entérale	
EXPANFEN	ibuprofène		200 mg	comprimé enrobé		?	?		?	A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser femme enceinte	
EXTOVYL	bétahistine		12 mg	gélule						A administrer au cours d'un repas avec un ½ verre d'eau Gélule ouvrable mais sans écraser les microgranules actifs	
EXTRANASE	bromélaïnes		900 nK	comprimé enrobé						Ne pas croquer , ni écraser : comprimé gastrorésistant	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
EZETROL	ezetimibe		10 mg	comprimé							A administrer pendant ou en dehors des repas
FAMOTIDINE	famotidine		20 mg	comprimé							A administrer avant le repas ou au coucher
			40 mg	comprimé							
FAMPYRA	fampridine		10 mg	comprimé							Respecter un intervalle de 12 heures entre les prises Ne pas sucer, ni croquer, ni mâcher, ni écraser, ni dissoudre
FANOLYTE	glucides + sodium + potassium + citrates		16g / 60mmol / 20 mmol / 10mmol (par litre)	poudre orale et entérale							Solution de réhydratation orale à diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée Conservation au réfrigérateur 24 h
FANSIDAR	sulfadoxine pyriméthamine		500 mg / 25 mg	cp quadriséable							A administrer en une seule fois, avec de l'eau
FANTOMALT	complément alimentaire oral			poudre orale et entérale							Alimentation modulaire glucidique A ingérer 90 minutes avant ou après un repas
FARESTON	torémifène		60 mg	comprimé							Cytotoxique femme enceinte
FARLUTAL	médroxyprogestérone		500 mg	cp bisécable							A administrer avant le repas, avec de l'eau
FASIGYNE	tinidazole		500 mg	comprimé enrobé							A administrer de préférence en dehors des repas
FASTENYL	arginine + vitamine C		1 500 mg / 500 mg	solution buvable							A diluer dans un verre d'eau
FEGENOR	fénofibrate		67 mg	gélule							A administrer en une prise au cours d'un repas
			140 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
FELDENE	piroxicam		10 mg	gélule							A administrer au cours du repas avec un grand verre d'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser, ni ouvrir les gélules Préférez Feldène® suppositoire à 20 mg ou Flexirox® poudre effervescente : 1 cp = 1 sachet = 20 mg
			20 mg	cp dispersible							
			20 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FELIXITA	gestodène + éthinylestradiol		0,75mg / 0,02mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,75mg / 0,03mg	comprimé							
FELODIPINE	félodipine		5 mg	cp pelliculé	 						Ne pas écraser : comprimé à libération prolongée
FEMARA	létrazole		2,5 mg	cp pelliculé	 						Cytotoxique femme enceinte
FENOFIBRATE	fénofibrate		67 mg	gélule	 						A administrer au cours du repas, en une prise
			100 mg	gélule	 						
			160 mg	cp pelliculé	 						
			200 mg	gélule	 						
			300 mg	gélule	 						
FER PH pour 2,5 mg	sulfate ferreux heptahydraté		0,5 mg	gélule							Diluer dans un peu de lait ou le biberon
			2,5 mg	capsule molle							
			5 mg	comprimé		?	?		?		
			50 mg/5 ml	poudre orale							
			66 mg	comprimé		?	?		?		
FERO GRAD VITAMINE C	sulfate ferreux heptahydraté + vitamine C		105 mg / 500 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer à jeun ou avant un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FERRIPROX	défériprone		100 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours ou en dehors des repas Goût désagréable métallique : broyage possible si administration par sonde : administration immédiate Préférez la solution buvable : utilisez la mesurette graduée
			500 mg	cp pelliculé bisécable							
			1 g	cp pelliculé bisécable							
FERROSTRANE	féredétate de sodium		34 mg / 5 ml	sirop							A administrer avant un repas
FERVEX adulte	phéniramine		25 mg / 500 mg / 200 mg	granulés pour susp. buvable							A dissoudre dans de l'eau froide ou chaude
FERVEX adulte framboise	paracétamol + phéniramine + vitamine C		25 mg / 500 mg / 200 mg	granulés pour susp. buvable							
FERVEX adulte sans sucre			25 mg / 500 mg / 200 mg	granulés pour susp. buvable							
FERVEX enfant			280 mg / 10 mg / 100 mg	granulés pour susp. buvable							
FEXOFENADINE	fexofénadine		120 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avec une quantité suffisante d'eau
			180 mg	cp pelliculé		?	?		?		
FIBRELINE fibres	complément alimentaire oral		5 g	poudre orale et entérale							Mélange de fibres, pour la constipation Goût neutre
			450 g	poudre orale et entérale							
FIBRELINE Purée de fruits	complément alimentaire oral		100 g	compote 2 saveurs							Purée de fruits, pour la constipation
FINASTERIDE	finastéride		1 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas diviser les comprimés, ni les écraser femme enceinte
			5 mg	cp pelliculé							
FIRDAPSE	amifampridine		10 mg	cp bisécable							A administrer au cours des repas pour améliorer la tolérance digestive Ne pas écraser, voie orale uniquement

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FITACNOL	grande bardane + pensée sauvage + ortie		103,33mg / 103,33 mg / 103,33mg	gélule				?	?		A administrer avant les repas, avec un grand verre d'eau
FITOFEBRIL	quinquina + reine des prés + saule blanc		0,495g / 0,495g / 0,742g (15 ml)	solution buvable							A diluer dans un verre d'eau, de préférence chaude
FIVASA	mesalazine		400 mg	comprimé							A administrer au cours des repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimé gastro-résistant
			800 mg	comprimé							
FIXICAL	carbonate de calcium		500 mg	cp à croquer ou à sucer							Ecrasement du comprimé possible, prendre un verre d'eau après la prise
FIXICAL VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	cp à croquer ou à sucer							Ecrasement du comprimé possible, prendre un verre d'eau après la prise
			1 g / 800 UI	cp à sucer seulement							Comprimé à sucer puis prendre un grand verre d'eau
FLAGYL	métronidazole		40 mg / ml	solution buvable							Préférez la solution buvable : 1 cuillère mesure = 125 mg
			250 mg	cp pelliculé							
			500 mg	cp pelliculé							
FLANID	acide thiaprofénique		100 mg	cp bisécable							A administrer tels quels, au cours des repas avec un grand verre d'eau
			200 mg	cp bisécable							Chez l'enfant : dissoudre dans de l'eau
FLAVAN	leucocianidol		60 mg	comprimé		?	?		?		
FLAVIASTASE	amylase fongique + protéase fongique		1 300 UI / 8,2 UI	cp bisécable							A croquer ou à avaler avec de l'eau, au cours d'un repas
FLAVOQUINE	amodiaquine		200 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer après le repas avec un peu d'eau
FLAVOURPAC	5 arômes : cassis, citron, framboise, orange, fruits tropicaux		4 g	poudre orale							Ajoutez ½ à 1 sachet de l'arôme choisi à 1 sachet de substitut de protéines
FLAVOUR SACHETS	3 arômes : cerise-vanille, citron-citron vert, pamplemousse		5 g	poudre orale							Ajoutez 1 sachet de l'arôme choisi à 100 g de mélange d'AA non aromatisé
FLECAINE	flécainide		100 mg	cp bisécable							A administrer avec un ½ verre d'eau Comprimé soluble dans l'eau PPI et les solutions glucosées, mais précipite dans les solutions salines
			50 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FLECAINE LP	flécaïnide		100 mg	gélule							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ouverture possible des gélules mais sans croquer, ni écraser les microgranules
			150 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
FLECAINIDE	flécaïnide		100 mg	comprimé sécable							A administrer avec un ½ verre d'eau Comprimé soluble dans l'eau PPI et les solutions glucosées, mais précipite dans les solutions salines
			100 mg	cp bisécable							
FLECTOR	dichlofénac épolamine		50 mg	granulés pour solution buvable							A administrer de préférence au cours du repas Si crise aiguë : administration avant le repas femme enceinte
FLEETPHOSPHOSODA	phosphate disodique dodécahydraté + phosphate monosodique dihydraté		10,8 g / 24,4 g (45 ml)	solution buvable							A administrer au cours des repas, diluée dans de l'eau Boire ensuite le plus de liquide possible pour remplacer les fluides perdus
FLEXEA	glucosamine		625 mg	comprimé							A administrer au cours ou en dehors des repas, avec un peu d'eau ou un autre liquide Ne doit pas être administré à des patients allergiques aux crustacés femme enceinte
FLEXIMAX	glucosamine + chondroïtine + harpagophytum + acide hyaluronique		750mg/600mg/50mg/5mg	poudre orale							Diluer le contenu du sachet dans un peu d'eau Ne doit pas être administré à des patients allergiques aux crustacés femme enceinte
FLISINT	fumagilline		20 mg	gélule				?	?		A administrer en dehors d'un repas
FLODIL LP	féلودipine		5 mg	comprimé enrobé							A administrer le matin avec de l'eau Ne pas diviser, ni croquer ou mâcher , ni écraser : comprimé à libération prolongée
FLORIDINE	complément alimentaire oral		150 kcal / 125 g	crème HP 5 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
FLORINEF	fludrocortisone		100 µg	cp sécable							Comprimés insolubles dans l'eau, à écraser puis dissoudre dans du jus de fruit : administration immédiate
FI OXYFRAI	fluvoxamine		50 mg	cp pelliculé							A administrer à la fin des repas sans croquer ni mâcher (principe actif provoque une irritation locale)

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FLUDARABINE	fludarabine	®	100 mg	cp pelliculé	■						Comprimés éventuellement broyables pour une utilisation par sonde : administration immédiate
FLUANXOL	flupentixol	®	40 mg / ml	solution buvable	■						
FLUBILAR	canphorate de méthyl	®	200 mg / 5 ml	solution buvable							A diluer dans de l'eau A administrer le matin à jeun ou au cours d'un repas
FLUCONAZOLE	fluconazole	■	50 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer avec un ½ verre d'eau Préférez la poudre orale à mettre en suspension dans de l'eau
		■	50 mg	gélule	■			?	?		
		■	100 mg	gélule	■			?	?		
		■	200 mg	gélule	■			?	?		
FLUDARA	fludarabine	■	10 mg	cp pelliculé	■						A administrer à jeun ou au cours d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
FLUDESTIN	testolactone		50 mg	comprimé		?	?		?		femme enceinte : cytostatique hormonal
FLUDEX Euthérapie	indapamide		2,5 mg	cp pelliculé	■						A administrer de préférence le matin avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
FLUDEX LP	indapamide	■	1,5 mg	cp pelliculé	■						
FLUDITEC expectorant	carbocistéine		50 mg / ml	sirop							
FLUDITEC toux sèche	carbocistéine		1,5 mg / ml	sirop							
FLUDITEC enfant nourrisson	carbocistéine		100 mg / 5 ml	sirop							
FLUDROCORTISONE	fludrocortisone	■	10 µg	cp bisécable							Comprimés insolubles dans l'eau, à écraser puis dissoudre dans du jus de fruit : administration immédiate
			50 µg	cp bisécable	■						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FLUIMUCIL	N-acétylcystéine		100 mg	granulés							A administrer dans une sonde ou avec du jus de fruit ou du soda : goût désagréable Dégagez la solution effervescente
			200 mg	granulés							
			20 mg / ml	solution buvable	 						
			200 mg	cp effervescent							
FLUISEDAL PROMETHAZINE	méglumine + prométhazine		130 mg / 2,5 mg (5 ml)	sirop							
FLUISEDAL sans PROMETH	méglumine + polysorbate		130 mg / 15 mg (5 ml)	sirop							
FLUMACH	spironolactone		50 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A avaler avec de l'eau
			75 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
FLUON	marron d'Inde + hamamélis + viburnum + méthesculetol		48mg/30mg/10mg/5mg	comprimé enrobé							A administrer avant un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
FLUOR	fluorure de sodium		0,25 mg	comprimé							A administrer en une prise quotidienne A avaler avec de l'eau ou croquer ou dissoudre dans de l'eau ou laisser fondre dans la bouche
FLUOREX	fluorure de sodium		1 mg / ml	solution buvable							A administrer pure ou diluée dans de l'eau ou un jus de fruit Evitez la prise simultanée de solution buvables lactées ou contenant du calcium
FLUORURE DE CALCIUM	fluorure de calcium		0,25 mg	comprimé	 						A administrer en une prise Comprimés peuvent être avalés, croqués, ou pris dissous dans un peu d'eau
FLUOSTEROL	fluorure de sodium + vit D ₃		1mg/3 200UI/ml	solution buvable							A administrer pure ou diluée dans de l'eau ou un jus de fruit Evitez la prise simultanée de solution buvables lactées ou contenant du calcium
FLUOXETINE	fluoxétine		20 mg / 5 ml	solution buvable							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Avaler plutôt que croquer (principe actif amer) : comprimé écrasé, dilué dans de l'eau administrable par sonde Préférez solution buvable : 1 cp ↔ 5 ml = 20 mg de fluoxétine
			20 mg	cp dispersible bisécable	 						
			20 mg	gélule	 				?	?	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FLUTAMIDE	flutamide		250 mg	comprimé							femme enceinte
FLUVASTATINE	fluvastatine		20 mg	gélule	 						A administrer entières, au cours ou en dehors des repas, avec un verre d'eau
			40 mg	gélule	 						
FLUVASTATINE LP	fluvastatine		80 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée
FLUVERMAL	flubendazole		20 mg / ml	susp. buvable							Possibilité de croquer le comprimé, mais au cours du repas
			100 mg	comprimé							Préférez la suspension buvable : 1 cp ↔ 1 cuillère à café
FLUVIC enfant nourrisson	carbocistéine		100 mg / 5 ml	sirop							
FLUVOXAMINE	fluvoxamine		50 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer, avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : risque d'irritation locale
			100 mg	cp pelliculé bisécable	 						
FOLICARE ATU	acide folique		0,4 mg / 5 ml	solution buvable							
FOLINORAL	folinate calcique		5 mg	gélule							Préférez la solution buvable de Lederfoline®
			25 mg	gélule							
FONCITRIL 4000	citrate de sodium + citrate de potassium + acide citrique		1,845g / 1,73g / 1,189g	granulés							A administrer après le repas avec un grand verre d'eau
FONLIPOL	tiadénol		400 mg	comprimé							A administrer immédiatement avec un grand verre d'eau
FONZYLANE	buflomédil		150 mg	cp pelliculé							La solution injectable (50 mg / 5 ml) peut être bue ou administrée par sonde
FORCICAL VIT D ₃	carbonate de calcium + vit D ₃ + saccharomyces cervisiæ		500 mg / 400 UI	cp à croquer							Comprimé à croquer ou sucer ou dispersible

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FORLAX	macrogol 4 000		4 g	poudre orale							A administrer le matin, diluée dans un verre d'eau
			10 g	poudre orale							
FORMOCARBINE	charbon activé		150 mg / ml	granulés							A administrer, avec de l'eau, après un repas ou au moment des troubles
FORMULE 515 PH	placebo			comprimé							
FORTIMEL CARE	complément alimentaire oral hyperprotidique hyperénergétique		200 ml (320 kcal)	solution buvable 2 saveurs							A administrer, de préférence, 90 minutes avant ou après un repas
FORTIMEL CREME	complément alimentaire oral hyperprotidique hyperénergétique		125 g (200 kcal)	crème 5 saveurs							
FORTIMEL ENERGY	complément alimentaire oral hyperénergétique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 5 saveurs							
FORTIMEL ENERGY MULTI FIBRE	complément alimentaire oral hyperénergétique enrichi en fibres alimentaires		200 ml (300 kcal)	solution buvable 6 saveurs							
FORTIMEL EXTRA	complément alimentaire oral hyperprotidique hyperénergétique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 7 saveurs							
FORTIMEL JUCY	complément alimentaire oral hyperénergétique glucides + protides : sans lactose		200 ml (300 kcal)	solution buvable 5 saveurs							
FORTIMEL SANS LACTOSE	complément alimentaire oral hyperprotidique hyperénergétique sans lactose		200 ml (260 kcal)	solution buvable 4 saveurs							
FORTIMEL YOG	complément alimentaire oral hyperprotidique hyperénergétique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 3 saveurs							
FORTINI	complément alimentaire oral hyperénergétique, sans fibres		200 ml (300 kcal)	solution buvable 1 saveur							
FORTINI MULTI FIBRE	complément alimentaire oral hyperénergétique, enrichi en fibres		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs						Boissons lactées hyperénergétiques prêtes à l'emploi, chez l'enfant de 1 à 12 ans	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FORTTRANS	macrogol 4 000 + sulfate de sodium + bicarbonate de sodium + chlorure de sodium + chlorure de potassium		64g/5,7g/1,68g/1,46g/0,75g	poudre orale							A dissoudre dans de l'eau, agitez jusqu'à dissolution complète
FORTZAAR	losartan + hydrochlorothiazide		100 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, pendant ou à distance des repas
			100 mg / 25 mg	cp pelliculé							femme enceinte
FOSAMAX	alendronate		10 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni sucer, ni laisser fondre dans la bouche : risque d'ulcérations A administrer, en position assise, au moins 30 minutes avant le repas avec un grand verre d'eau non minéralisée : les aliments ou d'autres médicaments peuvent en diminuer l'absorption
			70 mg	comprimé							
FOSAVANCE	alendronate + vitamine D ₃		70 mg / 2 800 UI	comprimé							Ne pas croquer, ni sucer, ni laisser fondre dans la bouche : risque d'ulcérations A administrer, en position assise, au moins 30 minutes avant le repas avec un grand verre d'eau non minéralisée : les aliments ou d'autres médicaments peuvent en diminuer l'absorption
			70 mg / 5 600 UI	comprimé							
FOSINOPRIL	fosinopril		10 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			20 mg	comprimé		?	?		?		femme enceinte
FOSINOPRIL HCTZ	fosinopril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer en une prise femme enceinte
FOSRENOL	lanthane		250 mg	cp à croquer							A administrer au cours ou à la fin d'un repas Ne pas avaler les comprimés entiers, les croquer, l'apport d'eau supplémentaire n'est pas nécessaire
			500 mg	cp à croquer							
			750 mg	cp à croquer							
			1 g	cp à croquer							
FOZIRETIC	fosinopril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp bisécable							A administrer en une prise femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FOZITEC	fosinopril		10 mg	comprimé sécable							A administrer avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			20 mg	comprimé							femme enceinte
FRACTAL	fluvastatine		20 mg	gélule							A administrer le soir, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas ouvrir, ni croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée
			40 mg	gélule							
FRACTAL LP	fluvastatine		80 mg	cp pelliculé							
FRANCE BEBE 1	préparation lactée pour nourrisson		400 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre dans 30 ml d'eau Pour les nourrissons de la naissance à 6 mois
			900 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
FRANCE BEBE 2	préparation lactée de suite		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre dans 30 ml d'eau Pour les nourrissons de 6 mois à 1 an
			900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
FRANCE BEBE 3	préparations lactées de croissance, enrichies en prébiotiques et en AG polyinsaturés à longue chaîne		400 g* (64 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre dans 30 ml d'eau Lait de croissance pour enfants à partir de 1 an
			800 g* (64 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
FRANCE BEBE 4	préparations lactées de croissance, enrichies en prébiotiques et en AG polyinsaturés à longue chaîne		400 g* (61 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette de poudre dans 30 ml d'eau Lait de croissance pour enfants à partir de 2 ans
			800 g* (61 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
FREBINI ENERGY	mélange ternaire hypercalorique, normoprotidique		500 ml (750 kcal)	easybag							Mélanges de nutrition entérale pédiatrique A administrer de préférence avec un régulateur de débit
FREBINI ENERGY FIBRE	mélange ternaire hypercalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (750 kcal)	easybag							
FREBINI ORIGINAL	mélange ternaire isocalorique, normoprotidique		500 ml (500 kcal)	easybag							
FREBINI ORIGINAL FIBRE	mélange ternaire isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (500 kcal)	easybag							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FRESUBIN CEREALES HP	complément alimentaire oral hyperprotéiné avec édulcorant et fibres		300 g (445 kcal)	poudre orale et entérale 1 saveur							A administrer, de préférence, 90 minutes avant ou après un repas
FRESUBIN CEREALES INSTANT	complément alimentaire oral isocalorique avec fibres		600 g (378 kcal)	poudre orale et entérale 1 saveur							
FRESUBIN CREME	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres		125 g (225 kcal)	crème dessert 5 saveurs							A administrer réfrigérée, comme seule source de nutrition ou comme complément (90 minutes avant ou après un repas)
FRESUBIN DB CREME	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotéiné, avec édulcorant et fibres		125 g (188 kcal)	crème dessert 4 saveurs							A administrer, de préférence, 90 minutes avant ou après un repas
FRESUBIN DB DRINK	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotéiné, avec édulcorant et fibres		200 ml (300 kcal)	solution buvable 3 saveurs							
FRESUBIN DESSERT FRUIT	complément alimentaire oral hypercalorique, protéiné, avec fibres		125 g (200 à 213 kcal)	compote 4 saveurs							
FRESUBIN 2 kcal DRINK	complément alimentaire oral lacté, hypercalorique, hyperprotidique		200 ml (400 kcal)	solution buvable 5 saveurs							A administrer réfrigérée, comme seule source de nutrition ou comme complément (90 minutes avant ou après un repas)
FRESUBIN 2 kcal DRINK FIBRE	complément alimentaire oral lacté, hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres		200 ml (400 kcal)	solution buvable 5 saveurs							A administrer réfrigérée, comme seule source de nutrition ou comme complément (90 minutes avant ou après un repas) La présentation au café peut être tiédie
FRESUBIN 1 500 complete	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		1 500 ml (1 500 kcal)	easybag							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
FRESUBIN DB CONTROL	mélange ternaire polymérique isocalorique, isoprotidique, hypoglycémique, enrichi en fibres		500 ml (525 kcal)	easybag							
FRESUBIN ENERGY	mélange ternaire polymérique hypercalorique, normoprotidique		500 ml (750 kcal) 1 000 ml (1 500 kcal)	easybag					 		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FRESUBIN ENERGY DRINK	complément alimentaire oral hypercalorique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs + 1 goût neutre							A administrer réfrigérée, comme seule source de nutrition ou comme complément (90 minutes avant ou après un repas)
FRESUBIN ENERGY DRINK FIBRE	complément alimentaire oral hypercalorique avec fibres		200 ml (300 kcal)	solution buvable 4 saveurs							
FRESUBIN ENERGY FIBRE	mélange ternaire polymérique hypercalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (750 kcal)	easybag							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 500 kcal)	easybag							
FRESUBIN GI CONTROL	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres (gomme de guar)		500 ml (530 kcal)	easybag							
FRESUBIN HP ENERGY	mélange ternaire polymérique hypercalorique hyperprotidique, enrichi en TCM		500 ml (750 kcal)	easybag							
			1 000 ml (1 500 kcal)	easybag							
FRESUBIN JUCY DRINK	complément alimentaire oral hypercalorique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 5 saveurs							
FRESUBIN MEGAREAL	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω -3		500 ml (700 kcal)	easybag							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 400 kcal)	easybag							
FRESUBIN MEGAREAL FIBRE	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω -3 et en fibres		500 ml (700 kcal)	easybag							
			1 000 ml (1 400 kcal)	easybag							
FRESUBIN ORIGINAL	mélange ternaire polymérique isocalorique normoprotidique		500 ml (500 kcal)	easybag							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 000 kcal)	easybag							
			1 500 ml (1 500 kcal)	easybag							
FRESUBIN ORIGINAL FIBRE	mélange ternaire polymérique isocalorique normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (500 kcal)	easybag							
			1 000 ml (1 000 kcal)	easybag							
FRESUBIN PROTEIN POWDER	poudre de protéines d'origine laitière (lactosérum)		300 g (360 kcal)	poudre orale goût neutre							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
FRESUBIN SOUPE	complément alimentaire oral hypercalorique, protéiné		200 ml (300 kcal)	potage 3 saveurs							A administrer comme seule source de nutrition ou comme complément (90 minutes avant ou après un repas)
FRESUBIN YO CREME	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		125 g (188 kcal)	crème texture fluide 4 saveurs + 1 goût neutre							
FRUBIOSE VITAMINE D	vitamine D ₂ + gluconate de calcium + lactate de calcium		1 000UI/129mg/36,8mg (5 ml)	solution buvable							A diluer dans de l'eau, du lait ou du jus de fruit
			5 000UI/500mg/350mg (5 ml)	solution buvable							
FUCIDINE	acide fusidique		250 mg	cp pelliculé	 						Mélanger à de l'eau, du jus de fruit ou de la compote Ne pas mélanger à du lait Préférez suspension buvable, à administrer immédiatement Goût amer : broyage du comprimé possible si administration par sonde entérale
			100 mg / 2 ml	susp. buvable							
			250 mg / 5 ml	susp. buvable							
FUMAFER	fumarate de fer		100 mg (cuillère dose)	poudre orale							A administrer avant le repas Préférez la poudre orale mélangée à de l'eau ou du lait
			66 mg	cp pelliculé							
FUMETERRE SUPERDIET	fumeterre		800 mg / 15 ml	solution buvable							A avaler telle quelle ou à diluer dans de l'eau
FUNGIZONE	amphotéricine B		100 mg / ml	susp. buvable	 						A administrer en dehors des repas 500 mg par cuillère à café
FUNGSTER	terbinafine		250 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau
FURADANTIN ATU	nitrofurantoïne		25 mg/5 ml	solution buvable							A administrer au cours des repas, le soir avant le coucher Préférez la solution buvable
FURADANTINE	nitrofurantoïne		5 mg	gélule							
FURADOINE	nitrofurantoïne		50 mg	comprimé							
FUROSEMIDE	furosémide		20 mg	cp bisécable	 	?	?		?		A administrer avec un verre d'eau
			40 mg	cp bisécable	 	?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			500 mg	cp sécable		?	?		?		
GA1 ANAMIX INFANT	mélange d'acides aminés sans lysine ni tryptophane ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		400 g	poudre orale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Indiqué à tout âge, si acidémie glutarique de type I
GABACET	piracétam		1,25 g / 10 ml	solution buvable							Ne pas croquer, ni ouvrir la gélule Préférez la solution buvable diluée dans un peu d'eau
			400 mg	gélule							
GABAPENTINE	gabapentine		100 mg	gélule							A administrer avec un grand verre de liquide ou d'eau, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni écraser les comprimés, ni ouvrir les gélules
			300 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
			600 mg	cp pelliculé							
			800 mg	cp pelliculé							
					5 mg	cp pelliculé sécable					
GABITRIL	thiagabine		10 mg	cp pelliculé sécable							A administrer au cours des repas Administration immédiate : stabilité de la solution inconnue

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			15 mg	cp pelliculé sécable							
GALACTOGIL	malte sirupeux + phosphate galega neutre de calcium		38,3 mg / 480 mg / 481 mg	granulés							A mélanger à de l'eau, du lait ou de la tisane 1 cuillère à soupe = 10 g
GALACTOMIN 17	aliment complet : protéines de lait de vache, glucose, lipides, vitamines, minéraux et oligo-éléments		400 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Indiquée si galactosémie congénitale ou déficit en galactokinase
GALACTOMIN 19	aliment complet : protéines de lait de vache, fructose, lipides, vitamines, minéraux, oligo-éléments et à minima lactose, galactose et glucose		400 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Indiquée si galactosémie congénitale ou intolérance au glucose-galactose
GALANTAMINE LP	galantamine		8 mg	gélule							A administrer en une prise, de préférence le matin, de préférence avec de la nourriture et du liquide Ne pas ouvrir la gélule, ni croquer, ni mâcher, ni écraser les microgranules : gélule à libération prolongée
			16 mg	gélule							
			24 mg	gélule							
GALIRENE	bromure de calcium + lactate de calcium		150 mg / 400 mg (10 ml)	solution buvable							A administrer au cours d'un repas
GALLIA 1	préparation lactée pour nourrisson		90 ml	solution buvable							Solution buvable prête à l'emploi Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons bien portants jusqu'à 6 mois
			500 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							
			400 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
			900 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
GALLIA 2	préparation lactée de suite		500 ml (73 kcal/100 ml)	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons bien portants de 6 mois à 1 an
			400 g* (73 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
			900 g* (73 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
GALLIA APAISIA 1	préparation lactée pour nourrisson + métabolites immunomodulateurs		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois, si réaction modérées cutanées, digestives et respiratoires

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
GALLIA APAISIA 2	préparation lactée de suite + métabolites immunomodulateurs		900 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons de 6 mois à 1 an, si réaction modérées cutanées, digestives et respiratoires	
GALLIA AR 1	aliment diététique lacté enrichi en caroube		900 g* (73 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de régurgitations sévères, de la naissance à 4 mois	
GALLIA AR 2			900 g* (71 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de régurgitations sévères, de 5 mois à 1 an	
GALLIA CALISMA 1	préparation lactée pour nourrisson laits fermentés ou avec probiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée	
			900 g	poudre orale et entérale							Pour les nourrissons non allaités ou au moment du sevrage, jusqu'à 4 mois	
GALLIA CALISMA 2	préparation de suite laits fermentés ou avec probiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée	
			900 g	poudre orale et entérale							Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage, de 5 mois à 1 an	
GALLIA CROISSANCE	lait de suite contenant moins de protéines que le lait de vache		250 ml (64 kcal/100 ml)	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons de 12 mois à 3 ans	
			500 ml (64 kcal/100 ml)	solution buvable								
			1 l (64 kcal/100 ml)	solution buvable								
			900 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale								
GALLIA DIGEST PREMIUM 1	préparation lactée pour nourrisson, épaissie, enrichie en bifidus		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Prise en charge des troubles digestifs bénins du nourrisson de la naissance à 6 mois	
			400 g	poudre orale et entérale								
			900 g	poudre orale et entérale								
GALLIA DIGEST PREMIUM 2	préparation lactée de suite, épaissie, enrichie en bifidus		400 g* (71 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Prise en charge des troubles digestifs bénins du nourrisson de 6 mois à 1 an	
			900 g* (71 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
GALLIA GROSSESSE	calcium + fer + iode + magnésium + zinc + vit. B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₅ , B ₆ , B ₈ , B ₉ , B ₁₂ , C, D ₃ , E		200mg/10mg/150µg/100mg/5mg/1,2mg/1,5mg/15mg/6mg/1,9mg/60µg/400µg/2µg	comprimé sécable							Complément alimentaire oral : prendre chaque jour un comprimé sécable + une gélule DHA, de préférence avec un verre d'eau à administrer avec un verre d'eau de l'arrêt de la contraception jusqu'à la fin de la grossesse
	DHA		200 mg	capsule molle							
GALLIA GUMILK	caroube + maltodextrines		250 g (251 kcal)	poudre orale							Mélangez 1 mesurette de 2 g de poudre à 100 ml de lait reconstitué à 60°C : agitez énergiquement Poudre instantanée épaississante : administration immédiate
GALLIA HA 1	lait hypoallergénique		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons à risque d'APLV, de la naissance à 6 mois
			900 g* (75 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
GALLIA HA 2	lait hypoallergénique		900 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons à risque d'APLV, de 6 mois à 1 an
GALLIA JUNIOR			900 g* (97 kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Dès 24 mois, pour les enfants bien portants, en complément d'une alimentation équilibrée
GALLIA LACTOFIDUS 1 ^{er} Age	préparation lactée pour nourrisson élaborée à partir de ferments lactiques (bifidus + lactase)		400 g* (69kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Facilite la digestion la vidange gastrique : en cas de troubles fonctionnels intestinaux persistants (coliques, ballonnements)
			900 g* (69kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
GALLIA LACTOFIDUS 2 ^e Age	préparation lactée de suite élaborée à partir de ferments lactiques (bifidus + lactase)		900 g* (69kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
GALLIA SOJA	préparation sans lactose ni saccharose, à base de protéines isolées de soja		900 g* (65,9kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Alternative végétale pendant et après diarrhées ou intolérance aux constituants du lait, de la naissance à 1 an
GALLIAGENE PROGRESS	hydrolysats enzymatique de caséine, glucides sans lactose ni saccharose, lipides		350 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 5 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les intolérances aux protéines du lait de vache et aux malabsorptions, de l'enfant en bas âge
GALVUS	vildagliptine	®	50 mg	comprimé							A administrer pendant ou en dehors des repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
GAOSEDAL CODEINE	paracétamol + codéine		500 mg / 20 mg	cp bisécable							A administrer avec de l'eau Evitez la prise d'alcool
GARDENAL	phénobarbital		10 mg	comprimé							A administrer au coucher Chez l'enfant de moins de 6 ans, mélanger le comprimé écrasé aux aliments Préférez Kaneuron® solution buvable : 1 mg = 1 goutte
			50 mg	comprimé							
			100 mg	comprimé							femme enceinte
GASTROGRAFINE	amidotrizoate sodique + amidotrizoate méglumine		10 g / 66 g (100 ml)	solution buvable							A diluer dans de l'eau
GASTROPULGITE	almasilate + hydroxyde d'alumine et carbonate de calcium		2,5 g / 0,5 g	poudre pour susp. buvable							A administrer après un repas, diluée dans un ½ verre d'eau
GAVISCON MENTHE	alginate de sodium + carbonate de calcium + bicarbonate de sodium		500 mg /267 mg /160 mg	comprimé à croquer							A administrer après les repas et au coucher Avalez les comprimés après les avoir soigneusement croqués Ne pas mélanger la suspension buvable au lait ou aux aliments
GAVISCON nourrisson	alginate de sodium + bicarbonate de sodium		50 mg /26 mg (ml)	susp. buvable	 						
GAVISCON	alginate de sodium + bicarbonate de sodium		50 mg /26 mg (ml)	susp. buvable							
GAVISCONELL CITRON	alginate de sodium + carbonate de calcium + bicarbonate de sodium		250 mg /133 mg /80mg	comprimé à croquer							
GAVISCONELL MENTHE	alginate de sodium + carbonate de calcium + bicarbonate de sodium		250 mg /133 mg /80mg	comprimé à croquer							
			500 mg /267 mg /160 mg	susp. buvable							
GAVISCONELL	alginate de sodium + carbonate de calcium + bicarbonate de sodium		500 mg /267 mg /160 mg	susp. buvable							
GDC-0449 ATU	vismodegib		150 mg	gélule							femme enceinte cytotoxique
GELODIET	poudre épaississante		225 g	poudre orale goût neutre							Poudre soluble instantanément à saupoudrer lentement sur de l'eau, jus de fruit, potages, yaourt ... en agitant avec une fourchette

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
GELOPECTOSE	pectine + cellulose + silice colloïdale		240 mg / 180 mg / 110 mg (cuillère à café)	poudre pour susp. buvable							Utilisez une eau faiblement minéralisée pour reconstituer le biberon de lait qui doit être très chaud (50 - 60°C), ajoutez la poudre puis agitez vigoureusement, laissez reposer jusqu'à obtention du gel et de la température souhaitée. Conservation 24h à +4°C : réchauffez au bain marie
GELOX	monmectite + hydroxyde d'alumine + hydroxyde de magnésium		2,5 g / 425 mg / 450 mg	susp. buvable							A administrer pure ou diluée dans de l'eau, à distance d'un autre traitement
GEL PHAN	gélatine		705 mg	gélule							A administrer au milieu des repas
GELUCYSTINE	L cystine		500 mg	gélule							
GELUFENE	ibuprofène		200 mg	gélule							A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser, insoluble dans l'eau Ne pas associer à la prise d'alcool femme enceinte
GELULE LCP	acides gras polyinsaturés : DHA, acide arachidonique et vitamine E		5 kcal/gélule	gélule							Gélule ouvrable chez l'enfant de moins de 8 ans : huile consommable directement ou ajoutée à différents mélanges nutritifs
GELUPRANE	paracétamol		500 mg	gélule							Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir. A avaler telle quelle avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit
GENESERINE	éséridine		3 mg / ml	solution buvable							A administrer 1/2 h à 2 h avant un repas ou une collation
			4,5 mg	comprimé							Préférez la solution buvable
GERIMAX	vit A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₉ + B ₁₂ + C + D + E + PP + magnésium + zinc + fer + manganèse + cuivre + sélénium + molybdène + chrome + ginseng + thé vert		800µg/1,4mg/1,6 mg/18mg/2mg/200µg/1µg/60mg/5µg/10mg/6mg/250mg/15mg/10mg/2,5mg/2mg/50µg/45µg/25 µg/85mg/37,2mg	comprimé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
GERIMAX 50 PLUS	vit A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₉ + B ₁₂ + C + D + E + PP + zinc + magnésium + cuivre + sélénium + molybdène + chrome + ginseng + guarana + cannelle + gingembre + menthe		800µg / 1,4mg / 1,6 mg / 18mg / 2mg / 200µg / 1µg / 60mg / 5µg / 10mg / 6mg / 15mg / 3,5mg / 2mg / 50µg / 45µg / 25µg / 85mg / 100 mg / 50mg / 48mg / 75mg	comprimé		?	?		?		
GERIMAX TONIQUE	ginseng		200 mg / 15 ml	solution buvable							
			200 mg	comprimé		?	?		?		
GES 45	solution de réhydratation orale : glucides + sodium + potassium + citrates		40g / 56mmol / 25 mmol / 15mmol (par litre)	poudre orale et entérale							A diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
GESTODENE ETHINYLESTRADIOL	gestodène + éthinylestradiol		60 µg / 15 µg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			75 µg / 20 µg	comprimé enrobé	 						
			75 µg / 30 µg	comprimé enrobé	 						
GEVATRAN	naftidrofuryl		200 mg	gélule							A administrer toujours avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer , ni ouvrir, ni écraser : microgranules à libération prolongée
GILENYA	fingolimod		0,5 mg	gélule							A administrer à heure fixe, avec ½ verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer , ni dissoudre, ni écraser femme enceinte
GINKOGINK	gingkobiloba		40 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, diluée dans de l'eau
GINKOR FORT	gingko biloba + heptaminol + troxérutine		14 mg / 300 mg / 300 mg	gélule							A administrer au cours du repas
			14 mg / 300 mg / 300 mg	poudre orale							Préférez la poudre orale : 1 gélule ↔ 1 sachet
			25 mg	comprimé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
GLIBENCLAMIDE	glibenclamide		2,5 mg	comprimé		•	•		•		A administrer immédiatement avant un repas, avec un ½ verre d'eau
			5 mg	comprimé sécable	 	?	?		?		
GLIBENESE	glipizide		5 mg	cp bisécable	 						A administrer 30 minutes avant le repas avec de l'eau : absorption retardée par les aliments
GLICLAZIDE	gliclazide		30 mg	comprimé	 						A administrer entier, en une seule prise, au petit déjeuner : comprimé à libération modifiée
GLIMEPIRIDE	glimépiride		1mg	comprimé							A administrer entiers, avec un ½ verre d'eau, juste avant ou pendant le premier repas principal Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			2 mg	comprimé							
			3 mg	comprimé							
			4 mg	comprimé							
GLIOLAN	acide 5-aminolévulinique		30 mg / ml	poudre orale							
GLIPIZIDE	glipizide		5 mg	cp bisécable							A administrer 30 minutes avant le repas avec de l'eau : absorption retardée par les aliments
GLIVEC	imatinib		100 mg	cp pelliculé							Comprimés à administrer au cours d'un repas, tels quels avec un grand verre d'eau ou dissous dans de l'eau ou du jus de pomme
			400 mg	cp pelliculé							femme enceinte
GLOSSITHIASE	éthanolamine + lysozyme		36 mg / 150 000 U	cp sublingual							Laissez fondre sous la langue sans croquer
GLUCIDORAL	carbutamide		500 mg	cp bisécable							A administrer au petit déjeuner, avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
GLUCOLESS	metformine		500 mg	comprimé							A administrer intacts, tels quels, au cours ou à la fin d'un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer, ni écraser
			850 mg	comprimé							Préférez la poudre orale de Glucophage® diluée dans 150 ml d'eau : administration immédiate
GLUCONATE DE POTASSIUM	gluconate de potassium		150 mg / ml (5 ml)	sirop							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PH	gliconate de potassium		150 mg / ml (15 ml)	sirop							
GLUCOPHAGE	metformine		500 mg	poudre orale							A administrer intacts, tels quels, au cours ou à la fin d'un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer , ni écraser les comprimés Préférez la poudre orale diluée dans 150 ml d'eau : administration immédiate
			500 mg	cp pelliculé							
			850 mg	poudre orale							
			850 mg	cp pelliculé							
			1 000 mg	poudre orale							
			1 000 mg	comprimé							
GLUCOR	acarbose		50 mg	comprimé							Les comprimés peuvent être avalés avec de l'eau avant le repas ou croqués avec les 1^{ères} bouchées
			100 mg	comprimé							
GLUCOVANCE	metformine + glibenclamide		500 mg / 2,5mg	cp pelliculé	 						A administrer intacts, tels quels, au cours ou à la fin d'un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer , ni écraser
			500 mg / 5 mg	cp pelliculé	 						
			1 000 mg / 5 mg	cp pelliculé							
GLUTRIL	glibornuride		25 mg	cp bisécable							A administrer avant le repas Goût désagréable : broyage du comprimé possible si administration par sonde entérale
GLYCINE L PH	glycine		500 mg	gélule							
GLYCOSAIDE	amidon de maïs modifié		60 g	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet dans 100 ml d'eau, de lait froid ou de soda : bien agiter - Mélange possible avec du yaourt ou du fromage blanc à 0% : bien mélanger Administration immédiate après reconstitution : tout surplus doit être jeté Indiquée dans les glycosémoses dès l'âge de 2 ans
GLYDIUM	gliclazide		30 mg	comprimé							A administrer en une prise à la fin du petit déjeuner Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé à libération modifiée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
											 femme enceinte
GOUTTES AUX ESSENCES	menthe poivrée + girofle + thym + cannelle + lavande		1,5g/0,5g/0,5g/0,5g/0,5g (100 g)	solution buvable							A administrer dans un grand verre d'eau ou une solution buvable chaude
GRAINS DE VALS	boldo + cascara + séné		0,1 mg / 6,25 mg / 6,25 mg	comprimé							
GRANIONS	argent		0,64 mg / 2 ml	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau, en dehors d'un repas
	bismuth		2 mg / 2 ml	solution buvable							
	cuiivre		0,3 mg / 2 ml	solution buvable							
	lithium		1 mg / 2 ml	solution buvable							 femme enceinte
	magnésium		3,82 mg / 2 ml	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau, en dehors d'un repas
	manganèse		0,1 mg / 2 ml	solution buvable							
	or		0,2 mg / 2 ml	solution buvable							
	sélénium		0,96 mg / 2 ml	solution buvable							
	soufre		19,5 mg / 2 ml	solution buvable							
	zinc		15 mg / 2 ml	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau, le matin à jeun
GRANISETRON	granisétron		1 mg	comprimé							A administrer dans l'heure qui précède l'administration des cytostatiques
			2 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni écraser
GRANUDOXY	doxycycline		100 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer avec de l'eau, au cours d'un repas Ne pas s'allonger après l'administration
GRISEFULINE	griséofulvine		250 mg	comprimé sécable							A administrer au cours du repas, avec de l'eau
			500 mg	cp pelliculé bisécable							Chez l'enfant de moins de 6 ans : broyez finement les comprimés et les mélanger à un aliment ou du liquide
GS7977 ATU	sofosbuvir		400 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
GUARAMATE	guarana + mate		125 mg / 125 mg	gélule	■			?	?		A administrer au cours du repas, avec un grand verre d'eau	
GUETHURAL	guaïétoline		300 mg	cp pelliculé	■						A administrer avant les repas, sans croquer	
GUIGOZ 1	préparation lactée pour nourrisson		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de 4,4 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois	
			500 ml (67 kcal / 100 ml)	solution buvable								
			400 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale								
			900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale								
GUIGOZ 1 hypoallergénique	préparation lactée pour nourrisson : protéines rendues hypoallergéniques		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de 4,4 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Pour la prévention des APLV, jusqu'à 5 mois révolus	
			900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale								
GUIGOZ 2	préparation lactée de suite		500 ml (67 kcal / 100 ml)	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Pour les nourrissons de 6 mois à 1 an	
			400 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale								
			900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale								
GUIGOZ 2 hypoallergénique	préparation lactée de suite : protéines rendues hypoallergéniques		900 g* (72 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,9 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Pour la prévention des APLV, de 6 mois à 1 an	
GUIGOZ 1 ^{er} Age	préparation lactée épaissie avec de l'amidon		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum Prise en charge des régurgitations	
GUIGOZ AR 2 ^e Age			900 g	poudre orale et entérale								
GUIGOZ CONFORT 1	préparation lactée pour nourrisson épaissie avec de l'amidon, enrichie en lactobacillus reuteri		900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,4 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Prise en charge des régurgitations, jusqu'à 6 mois	
GUIGOZ CONFORT 2	préparation lactée de suite épaissie avec de l'amidon, enrichie en lactobacillus reuteri		500 ml (67 kcal / 100 ml)	solution buvable							Solution buvable prête à l'emploi Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Prise en charge des régurgitations, de 6 mois à 1 an	
			900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale								
GUIGOZ CROISSANCE CEREALES	céréale lactée liquide		500 ml (80 kcal / 100 ml)	solution buvable							A administrer à température ambiante ou tiède Pour les nourrissons de 10 mois à 3 ans	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
GUGOZ CROISSANCE	lait de suite		500 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							Lait à administrer chaud ou froid ou utilisé dans les préparations lactées Pour les nourrissons de 10 mois à 3 ans
			1 000 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							
GUGOZ EVOLIA 1	préparation lactée pour nourrisson		900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,4 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois
GUGOZ EVOLIA 2	préparation lactée de suite		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate Pour les nourrissons de 6 mois à 1 an
			900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
GUGOZ TRANSIT 1	préparation lactée pour nourrisson légèrement épaissie, acifiée (ferments lactiques), enrichie en bifidus et lactobacillus reuteri		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,4 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate En cas de transit ralenti jusqu'à 6 mois
GUGOZ TRANSIT 2	préparation lactée de suite légèrement épaissie, acifiée (ferments lactiques), enrichie en bifidus et lactobacillus reuteri		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, tiédie à 40°C maximum : bien agiter administration immédiate En cas de transit ralenti de 6 mois à 1 an
GURONSAN	glucuronamide + caféine + vitamine C		400 mg / 50 mg / 500 mg	cp effervescent							Dégazez la solution
GUTRON	midodrine		2,5 mg	cp bisécable							A administrer avant le lever, à éviter au moment du coucher
GYMISO	misoprostol		200 µg	comprimé							A administrer avec un verre d'eau  femme enceinte
GYNERGENE CAFEINE	ergotamine + caféine		1 mg / 100 mg	comprimé							Préférez la forme suppositoire : 1 suppositoire ↔ 2 cp ou Seglor® ou Zomig® oro
HALDOL faible	halopéridol		2 mg / ml	solution buvable							Eviter la prise simultanée de café et surtout de thé
HALDOL	halopéridol		1 mg	comprimé							Photosensible : administration immédiate, ne pas préparer à l'avance
			5 mg	comprimé							Préférez la solution buvable : 1 ml = XX gouttes
HAI FAN	halofantrine		100 mg / 5 ml	susp. buvable							A administrer en dehors des repas Préférez la suspension buvable : administration

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	halopéridol		250 mg	comprimé sécable							immédiate - 1 cuillère mesure = 5 ml = 100 mg Évitez les repas riches en graisses
HALOPERIDOL	halopéridol		0,5 mg / 15 ml	solution buvable							
			1 mg / 15 ml	solution buvable							
HARMONET	gestodène + éthinylestradiol		75 µg / 20 µg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
HAVLANE	loprazolam		1 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer immédiatement avant le coucher
HAXIFAL	céfaclor		500 mg	cp effervescent							Dégazez la solution
HCU ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans méthionine, enrichi en vitamines, sels minéraux et prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Diluer une mesurette de 5 g de poudre dans 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie ne répondant pas à la vitamine B₆ jusqu'à 1 an et en supplémentation de 1 à 3 ans
HCU ANAMIX JUNIOR			125 ml	solution buvable							Prête à l'emploi A utiliser dans le traitement nutritionnel de l'homocystinurie à partir de 3 ans
HCU COOLER	mélange d'AA sans méthionine ; enrichi en AG ω-3, vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		130 ml	solution buvable							Prête à l'emploi - A administrer bien frais Conservation 24 heures - Peut être congelée Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, dès 3 ans et chez l'adulte
HCU EXPRESS	mélange d'AA sans méthionine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		25 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 sachet à 100 ml d'eau bien fraîche, bien agiter - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, dès 8 ans
HCU GEL	mélange d'AA sans méthionine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		20 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 sachet à 30 ml d'eau froide, bien agiter = consistance d'entremet + ajoutez 100 ml d'eau pour une solution buvable - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, entre 1 et 8 ans
HCU LV	mélange d'AA sans méthionine ; supplémenté en lipides, minéraux, vitamines, oligoéléments ; pauvre en glucides équivalent protidique = 20 g		27,8 g (92 kcal/sachet)	poudre orale et entérale 1 arôme + goût neutre							Mélangez 1 sachet de poudre à 65 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, entre la naissance à 1 an

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
HCY 1	mélange d'AA sans méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		400 g	poudre orale et entérale							Mélange 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, de la naissance à 18 mois
HCY 2			450 g	poudre orale et entérale							Mélange 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, après 18 mois et chez l'adulte
HELICIDINE	hélécidine		0,5 ml / 5 ml	sirop							
HELICOBACTER	urée		45 mg	poudre orale							Test pour les enfants de 3 à 11 ans
			75 mg	poudre orale							
HELI KIT	urée		75 mg	poudre orale							
HELMINTOX	pyrantel		125 mg / 2,5 ml	susp. buvable							
			125 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer en une prise, sans horaire particulier Préférez la suspension buvable Photosensible : administration immédiate
			250 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
HEMAGENE	ibuprofène		200 mg	cp pelliculé							A administrer avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser femme enceinte
HEMEDONINE	hématoporphyrine		5 mg / ml	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau
HEMIDAONIL	glibenclamide		2,5 mg	cp bisécable							A administrer immédiatement avant un repas, avec un ½ verre d'eau
HEMIGOXINE	digoxine		0,125 mg	comprimé							A administrer avec un peu d'eau
HEMIPRALON LP	propranolol		80 mg	gélule							Remplaçable par la solution buvable de Propranolol® → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
HEPACLEM	artichaut + boldo + curcuma + combretum		60mg/60mg/40 mg/40mg	cp pelliculé							A administrer avant un repas, avec de l'eau ou du yaourt Goût et odeur désagréables , broyage possible si administration par sonde
HEPADIAL	acide dimécrotique		50 mg	comprimé enrobé							A administrer avant les repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
HEPAGRUME	choline + bétaine + L-arginine + inositol + sorbitol		0,6g/0,35g/0,12g / 0,25g/3g	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau, après un repas
HEPANEPHROL	artichaut		2 g / 10 ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas ou au moment des troubles
HEPARGITOL	sorbitol + acide citrique		1,845 g / 0,878 g	poudre orale A							A administrer avant un repas ou au moment des troubles en diluant les 2 sachets A + B dans un ½ verre d'eau
	arginine + sorbitol + sulfate de sodium + phosphate disodique		500mg/1,57g/66mg/119mg	poudre orale B							
HEPATO SOLUTINES	citrate de sodium + romarin + lavande + thym		8 g / 6 g / 2 g / 1 g (100 ml)	solution buvable							A administrer diluée dans un ½ verre d'eau, avant un repas ou au moment des troubles
HEPATOUM BRULURE ESTOMAC	bicarbonate de sodium + phosphate tricalcique + hydroxyde de magnésium + carbonate de calcium + carbonate de magnésium		0,1g/0,01g/0,015 g/0,33g/0,005g	cp à croquer							A administrer après un repas ou au moment des troubles
HEPATOUM	anémone pulsatile + curcuma + alvéine		22,5mg/? / 2,1mg (15 ml)	solution buvable							
HEPSERA	adéfovir dipivoxil		10 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer au moment ou en dehors d'un repas femme enceinte
HEPT A MYL	heptaminol		0,305 g / ml	solution buvable							Préférez la solution buvable : XX gouttes = 254 mg 1 cp ↔ XV gouttes
			187,8 mg	comprimé							
HEXALEN ATU	altrétamine		50 mg	gélule							A administrer après les repas femme enceinte cytotoxique
HEXAPNEUMINE	pholcodine + chlorphénamine + bichlotimol		5mg/0,5mg/7,5mg (5 ml)	sirop							Privilégiez les prises vespérales (effet sédatif)
			6mg/0,6mg/10mg (5 ml)	sirop							
HEXAPNEUMINE nourrisson	chlorphénamine + bichlotimol		0,05 g / 0,1 g (100 ml)	sirop							
HEXAQUINE	quinine + vitamine B ₁		120 mg / 32 mg	comprimé enrobé							Préférez la forme suppositoire à 300 mg ou 90mg
HEXARHUME	bichlotymol + phényléphrine + chlorphénamine		30mg/10mg/2mg	comprimé		?	?		?		Administration vespérale

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
HEXASTAT	altrétamine		100 mg	gélule	 						A administrer après un repas et le soir avant le coucher Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir  femme enceinte
HICONCIL	amoxicilline		125 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer pendant ou entre les repas Préférez la poudre orale : reconstituez le flacon avec de l'eau non gazeuse
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg	gélule							
HISTAPASYL	isothipendyl		12 mg	cp pelliculé	  	?	?	?		Privilégiez les prises vespérales (effet sédatif prolongé) Evitez l'exposition au soleil : photosensibilisation La prise de boissons alcoolisées est fortement déconseillée	
HISTIDON	mélange d'AA sans histidine		500 g (328kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de l'histidinémie, chez le nourrisson l'enfant et l'adulte
HISTOFLUINE P	marron d'Inde + hamamélis + bourse à Pasteur + anémone pulsatile + esculoside		62,5mg/62,5mg/ 25mg/25mg/ 1,25mg	solution buvable							A administrer un peu avant les repas 1 ml = XXX gouttes
HN 25	préparation sans gluten à base de lait écrémé en poudre, banane, riz, caséinate de sodium, pomme, farine de maïs, dextrine-maltose, graisses végétales, enrichi en vitamines		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesure de 7 g avec 45 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Lait antidiarrhéique
HOLGYEME	cipotérone + éthinyloestradiol		2 mg / 0,035 mg	comprimé enrobé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
HUILE DE LORENZO	mélange de glycérol trioléate et de glycérol triéruicique		500 ml (806 kcal/100ml)	huile buvable							Laissez à température ambiante 1 h avant consommation et agitez avant l'emploi
HUILE GTE	glycérol triéruicique		1 000 ml (801 kcal/100ml)	huile buvable							A conserver au réfrigérateur Indiquée dans les adrénoleucodystrophies, chez l'enfant

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
HUILE GTO	glycérol trioléate		500 ml (819 kcal/100ml)	huile buvable							et l'adulte
HUILE FOIE DE MORUE	vitamine A + D		5 382 UI/600 UI (cuillère à café)	huile buvable							A administrer à jeun le matin ou à distance des repas
HUILE DE PARAFFINE	huile de paraffine		5 ml	ampoule buvable							
HUILE DE RICIN	huile de ricin		30 ml	huile buvable							A administrer en une prise le matin à jeun Peut être mélangée à du lait, yaourt, jus de fruit A éviter : toxique
HUMATIN ATU pour la gélule	paromomycine		125 mg / 5 ml	solution buvable							A administrer pendant les repas Préférez la solution buvable
			250 mg	gélule							
HUMEX adulte expectorant	carbocistéine		15 mg (cuillère mesure)	sirop							
HUMEX adulte expectorant sans sucre	acétylcystéine		100 mg	comprimé à sucer							
HUMEX toux sèche DEXTROMETORPHANE	dextrométhorphan		5 mg / 5 ml	sirop							Utilisez les gobelets doseurs
			20 mg / 15 ml	sirop							
HUMEX adulte toux sèche DEXTROMETORPHANE sans sucre	dextrométhorphan + saccharine		15 mg / 5 ml	solution buvable							
HUMEX adulte toux sèche PHOLCODINE	pholcodine		15 mg (7,5 ml)	sirop							
HUMEX allergie CETIRIZINE	cétirizine		10 mg	cp pelliculé sécable	 						A avaler avec un peu d'eau Préférez Cétirizine® ou Zyrtec® solution buvable ou Virlix® suspension buvable
HUMEX rhinite allergique	cp jour : pseudoéphédrine		60 mg	cp pelliculé							A administrer avec un grand verre d'eau
	cp nuit : cétirizine		10 mg	cp pelliculé	 						
HUMEXORAL	paracétamol + chlorphénamine		500 mg / 4 mg	gélule							
HUMEX rhume	paracétamol + pseudo éphédrine		500 mg / 60 mg	comprimé							Indication pour le jour : à administrer avec un grand verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvrature des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TRIMEX Injanc	paracétamol + chlorphénamine		500 mg / 4 mg	gélule							Indication pour la nuit
HUMORYL	toloxatone		200 mg	gélule				?	?		A administrer au cours du repas
HYCAMTIN	topotecan		0,25 mg	gélule	 						A administrer telles quelles au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer , ni ouvrir, ni écraser : cytotoxique
			1 mg	gélule	 						femme enceinte
HYDERGINE	dihydroergotoxine		1 mg	gélule	 			?	?		
			1 mg / ml	solution buvable	 						A administrer juste avant le repas principal Préférez la solution buvable : 1ml = XX gouttes = 1 mg
			4,5 mg	cp bisécable							
HYDREA	hydroxycarbamide		500 mg	gélule							Si impossible d'avaler une gélule : l'ouvrir et disperser le contenu dans un verre d'eau, administrer immédiatement Principe actif cytotoxique : hotte, masque et gants femme enceinte
HYDRIGOZ	glucides + sodium + potassium + citrates		82,5g/60mmol/20mmol/18mmol (par litre)	poudre orale et entérale							Solution de réhydratation orale à diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
HYDROCORTANCYL	prednisolone		5 mg	comprimé sécable							A administrer au cours des repas
HYDROCORTISONE	hydrocortisone		10 mg	comprimé sécable							Mélanger tel quel ou écrasé avec un aliment
HYDROCORTISONE	hydrocortisone		10 mg	comprimé							A avaler avec un verre d'eau Comprimé broyable : à mélanger avec un aliment
HYDROSOL VIT	vitamines A + B ₁ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₂ + E +		5000 UI/2mg/1,50mg /4mg/2mg/10 mg/50mg/1000UI/2mg (2 ml)	solution buvable							2 ml = L gouttes
HYDROXYDES AL ET MG	hydroxyde de magnésium + oxyde d'aluminium		400mg/400mg	cp à croquer							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
HYPERIUM	rilménidine		1 mg	comprimé							A administrer immédiatement au début du repas avec de l'eau ou un aliment Administration immédiate
HYPER LYS ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans lysine, sans gluten		400 g	poudre orale et entérale							Diluer 15 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel des hyperlysiniémies
HYPERPROTIDINE	aliment hyperprotidique		38 kcal / 10 g	poudre orale et entérale							
			500 g	poudre orale et entérale							
HYPOSTAMINE	tritoqualine		100 mg	comprimé							Possibilité de croquer le comprimé
HYTACAND	candésartan + hydrochlorothiazide		8 mg / 12,5 mg	comprimé							A administrer en une prise unique, avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			16 mg / 12,5 mg	comprimé							femme enceinte
HYTRINE	térazocine		1 mg	comprimé		?	?		?		
			5 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en une prise unique le soir au coucher
HYZAAR	losartan + hydrochlorothiazide		50 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
IBANDRONIQUE ACIDE	ibandronate sodique		150 mg	cp pelliculé							A administrer le matin à jeun (d'au moins 6 h) et 1 heure avant la 1^{ère} prise alimentaire, avec de l'eau du robinet ou faiblement minéralisée (pauvre en calcium) Ne pas associer à de l'eau minérale, du jus de fruit ou une autre boisson Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer, ni écraser Ensuite : ne pas s'allonger pendant 1 heure femme enceinte
			50 mg / ml	solution buvable							
			200 mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
IBUPROFENE	ibuprofène		200 mg	cp pelliculé							<p>A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser les comprimés Préférez la solution buvable</p> <p> femme enceinte</p>
			400 mg	comprimé enrobé							
			400 mg	cp pelliculé							
IBUPROFENE sans sucre	ibuprofène		20 mg / ml	solution buvable							
IBUTABS	ibuprofène		200 mg	cp pelliculé							
			400 mg	cp pelliculé							
ICAZ LP	isradipine		2,5 mg	gélule							<p>A administrer avec un verre d'eau en une seule prise le matin, avec un verre d'eau Ne pas mâcher, ni ouvrir : gélules à libération prolongée</p>
			5 mg	gélule							
IDARAC	floctafénine		200 mg	cp bisécable							<p>A administrer avec un verre d'eau entier, ou mieux, délayé dans l'eau (microgranules)</p>
IDEOLAXYL	aloès + séné		32 mg / 14 mg	cp pelliculé							<p>A administrer de préférence le soir après le dîner</p>
IDEOS	calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	cp à croquer ou à sucer							<p>Interactions alimentaires : - acide oxalique : épinards, oseille, rhubarbe, cacao, betteraves, bières, amandes, coriandre, persil, figues, pommes de terre, céleri, haricots verts, oignons, poireaux, carottes, cassis, chou, groseilles - acide phytique : pain complet, blé, seigle, avoine, orge, germes de soja, grains de maïs, arachide, sésame - phosphates</p>
			75 mg	cp pelliculé							<p>A administrer à heure fixe avec un liquide, au cours ou en dehors d'un repas</p>

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
IFIRMASTA	irbésartan		150 mg	cp pelliculé							en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser
			300 mg	cp pelliculé							femme enceinte foetotoxique
IKARAN	dihydroergotamine		2 mg / ml	solution buvable							A administrer au milieu du repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : préférez la solution buvable diluée dans de l'eau → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)
IKARAN LP	dihydroergotamine		5 mg	comprimé							
IKOREL	nicorandil		10 mg	comprimé							
			20 mg	comprimé							
IMETH	méthotrexate		10 mg	comprimé sécable							Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
IMGALT	5 probiotiques		10° / gélule	gélule				?	?		
IMIGRANE	sumatriptan		50 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser Préférez la présentation pour pulvérisation nasale à 10 ou 20 mg
IMMUNOSTIM	probiotiques (3 souches) + prébiotique		1,5 g	poudre orale							Poudre à mettre en suspension dans une boisson froide ou un dessert froid, de préférence avant le petit-déjeuner
IMODIUM	lopéramide		0,2 mg / ml	solution buvable							
			2 mg	gélule							A administrer avec un verre d'eau
IMODIUMCAPS	lopéramide		2 mg	gélule							Préférez le comprimé d'Imodium Duo® ou la solution buvable diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
IMODIUMDUO	lopéramide + siméticone		2 mg / 125 mg	comprimé							Photosensible : administration immédiate
IMODIUMLIQUICAPS	lopéramide		2 mg	capsule molle							
IMONOGAS	sinéticone		240 mg	capsule molle							Ne pas croquer ni écraser Préférez la présentation pour pulvérisation nasale à 10 ou 20 mg
IMOSSEL	lopéramide		2 mg	gélule							Préférez le comprimé d'Imodium Duo® ou la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
IMOSSEL DUO	lopéramide + siméticone		2 mg / 25 mg	cp à croquer							Comprimé à croquer, broyage possible

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
IMOVANE	zopiclone		3,75 mg	cp pelliculé	 						Goût amer : broyage du comprimé possible si administration par sonde entérale Photosensible : administration immédiate
			7,5 mg	cp pelliculé sécable	 						
IMPACT ENTERAL	mélange ternaire polymérique isocalorique hyperprotidique immuno-enrichi (arginine, AG ω-3, nucléotides)		500 ml (505 kcal)	flexibag							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
IMPACT GLUTAMINE	mélange ternaire polymérique isocalorique hyperprotidique immuno-enrichi (arginine, AG ω-3, nucléotides), enrichi en glutamine et gomme de guar		500 ml (550 kcal)	flexibag							
IMPAVIDO ATU	miltéfosine		10 mg	gélule							Cytotoxique femme enceinte
			50 mg	gélule							
IMPORTAL	lactitol		10 g	poudre orale							A administrer en une prise, au cours du repas, dissoute dans une solution buvable ou mélangée à un aliment (yaourt...)
			2,5 g	poudre orale							
			5 g	poudre orale							
IMUREL	azathioprine		25 mg	cp pelliculé	 						Antinéoplasique : éviter tout contact avec les mains A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : passer à la voie injectable femme enceinte
			50 mg	cp pelliculé	 						
INCIVO	télaprévir		375 mg	cp pelliculé							A avaler tel quel au cours d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
INDAPAMIDE	indapamide		1,5 mg	cp pelliculé	 						A administrer en une prise le matin, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			2,5 mg	comprimé enrobé	 						libération prolongée
INDAPAMIDE LP	indapamide		1,5 mg	cp pelliculé	  						A administrer le matin avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
INDIARAL	lopéramide		2 mg	gélule							Préférez le comprimé d'Imodium Duo® ou la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
INDOCID	indométacine		25 mg	gélule							Préférez la suspension buvable d'Indocin® ou la gélule de Chrono Indocid® 75 mg (ouvrable mais sans écraser les microgranules à libération modifiée) ou la forme suppositoire à 50 ou 100 mg → <i>adaptation de la nasologie</i>
INDOCIN ATU	indométacine		25 mg / 5 ml	susp. buvable							A administrer au cours des repas pour améliorer la tolérance digestive
INDO-PAED ATU	indométacine		25 mg / 5 ml	susp. buvable							 femme enceinte
INEGY	ézétimibe + simvastatine		10 mg / 20 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer le soir, au cours ou après un repas
			10 mg / 40 mg	comprimé	 	?	?		?		
INEXIUM	ésoméprazole		10 mg	granulés pour susp. buvable							Oralement : ajoutez 15 ml d'eau plate par dose de 10 mg dans un verre, remuez jusqu'à ce que les granulés se dispersent, attendre quelques minutes jusqu'à épaississement, remuez à nouveau et boire la suspension dans les 30 minutes - Rincez avec 15 ml d'eau pour obtenir l'ensemble des granulés
			20 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser les granulés ou les comprimés (microgranules gastrorésistants) Pour administration par sonde (≥ 6 Fr) : ajoutez 15 ml d'eau plate dans une seringue par dose de 10 mg de granulés, remuez, laissez quelques minutes jusqu'à

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			40 mg	cp pelliculé							épaississement, remuez à nouveau, administrez dans les 30 minutes, rincez la sonde avec avec 15 ml d'eau par 10 mg de granulés Comprimés dispersibles dans un verre d'eau non gazeuse (bien rincer le verre) et administrables par sonde
INFATRINI	complément alimentaire oral isocalorique		100 ml (100 kcal)	solution buvable goût neutre							Complément alimentaire de 0 à 1 an A administrer, de préférence, 90 minutes avant ou après un repas
INFATRINI 1.0	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique		500 ml (500 kcal)	pack souple							Mélange de nutrition entérale de 0 à 1 an, enfant de moins de 8 kg A administrer de préférence avec un régulateur de débit
INFIBRAN	son de blé		1,25 g	cp à croquer							
INFLACED	piroxicam		20 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas Ne pas ouvrir, ni sucer, ni mâcher, ni écraser la gélule
			20 mg	poudre effervescente							Préférez la poudre dissoute dans un 1/2 verre d'eau : dégazez la solution et administration immédiate
INIPOMP	pantoprazole		20 mg	comprimé enrobé							A administrer avant le repas, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni écraser : comprimés gastrorésistants
			40 mg	comprimé enrobé							Préférez Inexium® ou Ogastoro®
INKODIET FIBRES	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, avec fibres		500 ml	solution entérale							
INKODIET HP 20	mélange ternaire polymérique isocalorique hyperprotidique		500 ml	solution entérale							Mélange de nutrition entérale
INKODIET PLUS	mélange ternaire polymérique hypercalorique hyperprotidique		500 ml	solution entérale							A administrer de préférence avec un régulateur de débit
INKODIET STANDARD	mélange ternaire polymérique isocalorique normoprotidique		500 ml	solution entérale							
INLYTA	axitinib		1 mg	cp pelliculé							A administrer tels quels, au cours ou en dehors d'un repas, à 12 h d'intervalle
			5 mg	cp pelliculé							cytotoxique

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			5 mg	cp pelliculé							femme enceinte
INOD'AIL	ail		430 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau , au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir : gélule gastrorésistante
INOFER	acide succinique + succinate ferreux		100 mg / 100 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
INORIAL	bilastine		20 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer en une seule prise, avec de l'eau, 1 à 2 h avant ou après la prise de nourriture ou de jus de fruit
INOVELON	rufinamide		100 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer en dehors des repas, avec de l'eau Si broyage : à diluer dans ½ verre d'eau
			200 mg	cp pelliculé bisécable	 						
			400 mg	cp pelliculé bisécable	 						
INSADOL	insaponifiable de maïs		125 mg / 5 ml	solution buvable							A administrer au début du repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser le comprimé : préférez la solution buvable diluée dans de l'eau sucrée
			35 mg	comprimé enrobé							
INSPRA	éphérénone		25 mg	cp pelliculé	 						A administrer pendant ou en dehors des repas, avec un grand verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser
			50 mg	cp pelliculé	 						
INSTANT PROTEIN	complément alimentaire oral		100 mg / 5 ml	poudre orale goût neutre							Poudre de protéines lactées (sans lactose) à saupoudrer sur un aliment ou dans un liquide
INTELENCE	étravirine		100 mg	comprimé	 						A administrer après un repas, intact ou dissous dans un verre d'eau : à boire immédiatement ainsi que le rinçage du verre Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			200 mg	comprimé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
INTERCRON	acide cromoglicique		91 g / 100 g	solution buvable							A administrer avant un repas, pure ou diluée dans de l'eau : de préférence à conserver dans la bouche une minute avant d'avaler
INTERCYTON	acide flavodique		200 mg	gélule				?	?		
INTETRIX	tiliquinol laurysulfate + tilbroquinol + tiliquinol base		50 mg / 200 mg / 50mg	gélule							A administrer au début d'un repas Évitez la prise d'alcool
INTRAIT DE MARRON D'INDE	extrait de marron d'Inde + metesculetol		5,6352 mg / 11,27 mg (ml)	solution buvable							A administrer au cours d'un repas Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau
	extrait de marron d'Inde		200 mg	gélule							
INTRALGIS	ibuprofène		200 mg	comprimé							A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser femme enceinte
INVIRASE	saquinavir		200 mg	gélule							A administrer pendant ou après un repas avec de l'eau, en même temps que le ritonavir Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir
			500 mg	cp pelliculé							femme enceinte
IODURE DE POTASSIUM	iodure de potassium		130 mg	cp quadrisécable							Pour diminuer le goût métallique : dissoudre dans de l'eau ou un jus de fruit ou délayer dans un peu de lait puis administration immédiate
IONARTHROL	fer minéral + chlorure de nickel + sulfate de sodium + calcium minéral + sulfate de manganèse + sulfate de magnésium		0,00343mg/0,0000001mg/466mg/0,00133mg/0,00132mg/0,024mg	poudre orale							A administrer en dehors d'un repas, dissoute dans 2 cuillères à soupe d'eau tiède
IPECACUANHA PH	ipéca		1,4 g / 15 ml	sirop							
IPERTEN	manidipine		10 mg	comprimé							A administrer le matin après le petit déjeuner avec un peu de liquide
			20 mg	comprimé							
IPRAALOX	pantoprazole		20 mg	comprimé enrobé							A administrer avant un repas, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni écraser : comprimé gastro-résistant

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
IRBESARTAN	irbésartan		75 mg	cp pelliculé							<p>A administrer à heure fixe avec un liquide, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser : foetotoxique</p>
			150 mg	comprimé							
			150 mg	cp pelliculé	 						
			300 mg	comprimé	 						
			300 mg	cp pelliculé	 						
IRBESARTAN HCTZ	irbésartan + hydrochlorothiazide		150 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							<p> femme enceinte</p>
			150 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 						
			300 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 						
			300 mg / 25 mg	cp pelliculé	 						
IRENAT ATU	perchlorate de sodium		300 mg / ml	solution buvable							
IRESSA	gégitinib		250 mg	cp pelliculé							<p>A administrer à heure fixe, avec ou sans aliment Ne pas croquer, ni écraser, dispersable dans ½ verre d'eau non gazeuse (lent : 20') + rinçage avec ½ verre d'eau</p> <p> femme enceinte</p>
ISENTRESS	raltégravir		400 mg	cp pelliculé							<p>A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser</p> <p> femme enceinte</p>
ISIMIG	frovatriptan		2,5 mg	comprimé	 						Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ISKEDYL	raubasine + dihydroergocristine		4,8 mg / 0,6 mg	comprimé							A administrer au moment des repas Ne pas croquer les comprimés Préférez la solution buvable → <i>adaptation de la posologie</i>
			8 mg / 1 mg / ml	solution buvable							
ISKEDYL FORT	robazine + dihydroergocristine		19,2 mg / 2,4 mg	comprimé							
ISOBAR	métoclothiazide + triamtèrene		5 mg / 150 mg	cp bisécable	 	?	?		?		A administrer le matin
ISOLEUCINE L PH	L isoleucine		50 mg	gélule				?	?		
ISOPRINOSINE	inosine acédobène dimépranol		500 mg	cp bisécable							Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale
ISOPTINE	vérapamil		40 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours du repas Principe actif insoluble : ne pas mélanger dans du liquide mais du yaourt
			120 mg	gélule							Administration par sonde possible, mélangé aux produits de nutrition entérale
ISOPTINE LP	vérapamil		240 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
ISORYTHM	disopyramide		100 mg	gélule							
ISORYTHM LP	disopyramide		125 mg	gélule							Ne pas croquer , ni écraser mais gélules ouvrables sans écraser les microgranules
			250 mg	gélule							
ISOSORBIDE D LP	dinitrate d'isosorbide		20 mg	gélule	 						Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir : gélules avec microgranules à libération prolongée
			40 mg	gélule	 						
			60 mg	gélule	 						
			80 mg	gélule	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ISOSOURCE ENERGY	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique hypercalorique, normoprotidique		500 ml (785 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale, à administrer par voie orale ou par sonde : dans ce cas utiliser de préférence avec un régulateur de débit
ISOSOURCE ENERGY FIBRE	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique hypercalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (800 kcal)	SmartFlex							
ISOSOURCE JUNIOR	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique hypercalorique, normoprotidique		250 ml (305 kcal)	bouteille arôme vanille							
ISOSOURCE PROTEIN	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique		500 ml (650 kcal)	SmartFlex							
ISOSOURCE PROTEIN FIBRE	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres		500 ml (665 kcal)	SmartFlex							
ISOSOURCE STANDARD	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique		500 ml (500 kcal)	SmartFlex							
ISOSOURCE STANDARD FIBRE	mélange de nutrition entérale ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (515 kcal)	SmartFlex							
ISUDRINE	oxyde de magnésium + phosphate d'aluminium		0,152g / 2,476g	susp. buvable							
ITRACONAZOLE	itraconazole		100 mg	gélule							A administrer en une seule prise, 2 h avant ou 4 à 6 h après des supprimeurs de l'acidité gastrique : absorption diminuée → dans ce cas donner la gélule avec une solution buvable contenant du cola Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir Ne pas y associer la prise de pamplemousse
IUVACOR	ubidécarnone		50 mg	comprimé							A administrer après un repas Préférez la solution buvable de Decorenone® ou d'Ubicor® ou d'Ubiten®

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
IVA ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans leucine, enrichi en glucides, lipides, minéraux, vitamines, oligo-éléments et probiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Diluer 15 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la leucinosé jusqu'à 1 an
IXEL	milnacipran		25 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Principe actif très hydrophile au goût amer, si ouverture de la gélule administration uniquement par sonde entérale
			50 mg	gélule							
IXPRIM	paracétamol + tramadol		325 mg / 37,5 mg	cp effervescent							A administrer pendant ou en dehors des repas, tel quel le comprimé pelliculé, avec assez de liquide Ne pas mâcher ni fractionner le comprimé pelliculé Préférez le comprimé effervescent : dégazez la solution
			325 mg / 37,5 mg	cp pelliculé	 						
IZILOX	moxifloxacine		400 mg	cp pelliculé sécable	 						Avaler le comprimé tel quel, avec assez de liquide, pendant ou en dehors des repas
JAKAVI	ruxolitinib		5 mg	comprimé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
			15 mg	comprimé	 						
			20 mg	comprimé	 						
JAMYLENE	docusate de sodium		50 mg	comprimé enrobé							Ne pas écraser : risque de perte de principe actif car comprimé petit et dur
JANUMET	sitagliptine + metformine		50 mg / 1 000 mg	cp pelliculé							A administrer au cours des repas pour diminuer les effets indésirables gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer, ni écraser femme enceinte
JANUVIA	sitagliptine		25 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
			50 mg	cp pelliculé							
			100 mg	cp pelliculé							
JASMINE	drospirénone + éthinyloestradiol		3 mg / 0,03 mg	cp pelliculé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
JASMINELLE	drospirénone + éthinyloestradiol		3 mg / 0,02 mg	cp pelliculé	   						A administrer à heure fixe, avec un peu d'eau Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
JASMINELLECONTINU	drospirénone + éthinyloestradiol		3 mg / 0,02 mg	cp pelliculé	  						
JECOPEPTOL	hydroxyde d'aluminium + bicarbonate de sodium + boldo + carbonate de calcium + fusain noir + hydroxyde de magnésium		582mg/640mg/ 13,95mg/582mg/ 5,7mg/25,5mg (15 g)	poudre orale							A administrer le matin à jeun, diluée dans de l'eau
JOSACINE	josamycine		125 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable							Préférez les granulés ou le comprimé dispersible dilués dans de l'eau : bien agiter avant emploi
			250 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable							
			500 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable							
			500 mg	cp pelliculé	 						
			1 g	cp dispersible							
JOSIR LP	tamsulosine		0,4 mg	gélule	 						A administrer à heure fixe, à la fin d'un repas (petit déjeuner de préférence) Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser, mais gélule ouvrable sans écraser les micro granules à libération prolongée
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY	hamamélis + viburnum + calamus + piscidie		64mg/14mg/7mg/4,5mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas Préférez la solution buvable diluée dans un ½ verre d'eau
			191mg/42mg/21,15mg/13,55mg (5 ml)	solution buvable							
HISTOR	cilazapril		0,5 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un peu d'eau
			1 mg	cp pelliculé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
KALOR	ciazapim										peu d'eau Ne pas croquer, ni écraser
			2,5 mg	cp pelliculé	 						femme enceinte
KABI GLUTAMINE	L-glutamine, maltodextrines, fibres		10 g / 8g / 1,2 g (sachet 20 g)	poudre orale							Mélanger un sachet de 20 g à 200 ml d'eau froid, bien agiter, attendre 1 minute puis remélanger Peut être additionné à jus de fruits, yaourt, compote de fruit, etc ... puis consommation immédiate Après reconstitution avec de l'eau : garder au réfrigérateur au maximum 24 h
KALEORID LP	chlorure de potassium		600 mg	comprimé enrobé							A administrer avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser : comprimés à libération prolongée
			1 000 mg	comprimé enrobé							
KALETRA	lopinavir+ritonavir		80 mg/20mg (ml)	solution buvable	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser Préférez la solution buvable
			100 mg/25 mg	cp pelliculé							
			200 mg/50 mg	cp pelliculé							femme enceinte
KALYDECO ATU	ivacaftor		150 mg	cp pelliculé							A administrer intact, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser, ni diluer dans de l'eau
KANEURON	phénobarbital		54 mg / ml	solution buvable							A administrer le soir au coucher Utiliser la capsule compte-gouttes ou la pipette doseuse 1 goutte de solution = 1 mg de phénobarbital femme enceinte
KAOBROL	carbonate de calcium + kaolin lourd + carbonate de magnésium		140mg/210mg/210mg/10mg	cp à croquer							A administrer après un repas ou au moment des douleurs et le soir au coucher Comprimé à croquer : écrasement possible
KAOLOGEAIS	oxyde de magnésium + sulfate de magnésium + méprobamate + gomme de sterculia + kaolin lourd		0,1mg/0,3703mg / 0,2g/6g/2g (10g)	granulés							A administrer avant un repas Granulés à avaler sans croquer, ni écraser avec un grand verre d'eau
KAOMUTH	kaolin lourd + hydroxyde de magnésium		1,1 mg / 7,7 mg	poudre orale							A administrer avec un verre d'eau 1h à 1h30 après le repas et au moment du coucher

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
KAPANOL LP	sulfate de morphine		20 mg	gélule	 						Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : gélule à libération prolongée : ouverture possible, mélangez les microgranules avec un aliment ou administrez avec une sonde gastrique
			50 mg	gélule	 						
			100 mg	gélule	 						
KARAYAL	sulfate de magnésium + oxyde de magnésium		3,704 g / 1 g (100 g)	granulés							A administrer au début d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser
KARDEGIC	acétylsalicylate de lysine		75 mg	poudre orale							Versez le contenu du sachet dans un grand verre d'eau : une dissolution totale est obtenue rapidement
			160 mg	poudre orale							
			300 mg	poudre orale							
KAYEXALATE	polystyrène sulfonate de sodium		454 g	poudre orale							A administrer après mise en suspension dans un peu d'eau, adjonction éventuelle de sucre vanillé ou de sirop Bien rincer la sonde La mise en suspension dans un jus de fruit est à proscrire : teneur élevée en potassium
KEAL	sucralfate		1 g	comprimé sécable		?	?		?		A administrer ½ h à une heure avant le petit déjeuner ou 2 heures après le repas du soir Préférez la suspension buvable
			1 g	susp. buvable							
			2 g	susp. buvable							
KEFORAL	céfalexine		125 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer de préférence en dehors des repas, avec de l'eau Préférez la poudre orale Ne pas écraser les comprimés car la solution est instable Evitez la prise de lait : diminution de 40 % de la biodisponibilité
			250 mg / 5 ml	poudre orale	 						
			500 mg	cp pelliculé							
			1 g	cp pelliculé							
KELSEF	céfradine		500 mg	gélule				?	?		
KEMADRINE	procyclidine		5 mg	cp bisécable		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
KENZEN	candésartan		4 mg	cp bisécable		?	?		?		<p>A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un peu d'eau</p> <p> femme enceinte</p>
			8 mg	cp bisécable		?	?		?		
			16 mg	cp bisécable		?	?		?		
			32 mg	cp bisécable		?	?		?		
KEPPRA	lévétiracétam		100 mg / ml	solution buvable							<p>A administrer au cours ou en dehors des repas, avec de l'eau</p> <p>Goût amer : comprimés écrasables si administration par sonde entérale</p> <p>Préférez la solution buvable diluée dans un peu d'eau</p>
			250 mg	cp pelliculé sécable							
			500 mg	cp pelliculé sécable							
			1 000 mg	cp pelliculé sécable							
KERLONE	bétaxolol		20 mg	cp pelliculé bisécable							Ne pas croquer , ni écraser
KESTIN	ébastine		10 mg	comprimé							<p>A administrer en dehors d'un repas</p> <p>Ne pas croquer, ni écraser le comprimé</p> <p>Préférez le lyophilisat oral placé sur la langue où il se disperse instantanément : peut être administré sans liquide</p>
KESTINLYO	ébastine		10 mg	lyophilisat oral							
KETEK	télitromycine		400 mg	cp pelliculé							<p>A administrer à heure fixe, le soir au coucher, avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas</p> <p>Ne pas croquer, ni écraser</p>
KETESSE	dexkétoprofène trométamol		12,5 mg	cp pelliculé bisécable							<p>A administrer 30' avant un repas ou au cours d'un repas (pour éviter effets indésirables digestifs), avec une grande quantité d'eau</p> <p> femme enceinte</p>
			25 mg	cp pelliculé bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
KETOCAL	mélange protéiné hyper lipidique, hypoglucidique ; supplémenté en AA, vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		300 g* (146 kcal/100ml)	poudre orale 1 saveur + 1 goût neutre							Mélange 20 g de poudre à 80 ou 100 ml d'eau chaude : conservation au réfrigérateur 24 h Mélange nutritif complet cétogène indiqué dès 1 an
KETOPROFENE	kétoprofène		50 mg	gélule							A administrer au cours des repas Impossible par sonde Préférez Biprofenid® forme suppositoire
			100 mg	comprimé	 						
KETOPROFENE LP	kétoprofène		100 mg	cp sécable	 						femme enceinte
			200 mg	gélule							
KETOTIFENE	kétotifène		1 mg	gélule							Impossible par sonde Préférez Zaditen® en solution buvable (1mg/5 ml)
KETUM	kétoprofène		100 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours des repas Ne pas croquer, ni écraserle comprimé, ni ouvrir la gélule Préférez Biprofenid® forme suppositoire
KETUM LP	kétoprofène		200 mg	gélule							femme enceinte
KIVEXA	abacavir + lamivudine		600mg/300mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repa Ne pas croquer, ni écraser femme enceinte
KLEAN PREP	bicarbonate de sodium + chlorure de sodium + chlorure de potassium + macrogol + sulfate de sodium		1,685g/1,465g/ 0,7425g/59g/ 5,685g	poudre orale							Dissoudre le contenu du sachet n°1 dans un litre d'eau, puis rajouter le sachet n°2
KLIOGEST	estradiol + noréthistérone		2 mg / 1 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
KLIPAL CODEINE	paracétamol + codéine		300 mg/25 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni écraser : goût très amer Préférez Efférgan® codéiné comprimé effervescent : dégagez la solution
			600 mg/50 mg	comprimé							
KOLOSSORB	complément alimentaire oral à base d'argile		180 g	poudre orale et entérale							Prendre une cuillère à soupe avec un grand verre d'eau avant chaque repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
KOMBOGLYZE	saxagliptine + metformine		2,5 mg / 1 g	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser femme enceinte
KOREC	quinapril		5 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
			20 mg	cp bisécable		?	?		?		femme enceinte
KORETIC	quinapril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		A administrer en une seule prise femme enceinte
KREDEX	carvédilol		6,25 mg	cp bisécable							A administrer à heure fixe, au moment des repas avec un volume d'eau suffisant pour ralentir la vitesse d'absorption
			12,5 mg	cp bisécable							
			25 mg	cp bisécable							
KREON FÜR KINDER ATU	pancréatine d'origine porcine		60 mg	granulés pour susp. buvable							A administrer au cours des repas A dissoudre dans du lait
KUVAN	saproptérine		100 mg	comprimé pour solution buvable							A administrer à heure fixe, en une prise unique le matin A dissoudre (après éventuel broyage) dans 120 ml d'eau chez l'enfant et 120 à 240 ml chez l'adulte
KYTRIL	granisétron		1 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni écraser
			2 mg	cp pelliculé	 						
LABURIDE ATU	phénétureide		200 mg	cp quadrisécable		?	?		?		
LACTEL EVEIL BÉBÉ	lait de croissance		250 ml	solution buvable							Solution prête à l'emploi, en relais du lait 2 ^e âge jusqu'à 3 ans
			1 000 ml	solution buvable							
LACTEOL	lactobacillus		170 mg	gélule							Préférez la poudre orale dispersée dans un ½ verre ou un biberon d'eau
			340 mg	gélule							
			340 mg	poudre orale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LACTULOSE	lactulose		10 g / 15 ml	solution buvable							A administrer diluées dans de l'eau Administration orale, entérale ou rectale
			10 g	poudre orale							
LAMALINE	paracétamol + opium + caféine		300 mg / 10 mg / 30 mg	gélule							A avaler intacte avec un grand verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir Préférez la forme suppositoire
LA MANDORLE	pulpe d'amandes dégraissées + probiotiques + AG w-3 + calcium		400 g (405 kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 8 g de poudre à très peu d'eau, puis délayez progressivement avec le reste de liquide : ne pas chauffer Alternative au lait animal en cas d'allergies alimentaires,
			800 g (405 kcal/100g)	poudre orale et entérale							
LAMICSTART	lamotrigine		25 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez les comprimés de Lamictal® femme enceinte
			50 mg	comprimé							
LAMICTAL	lamotrigine		2 mg	cp dispersible							A administrer au cours des repas Comprimés peuvent être mâchés ou sont dispersibles dans l'eau, écrasement possible femme enceinte
			5 mg	cp dispersible							
			25 mg	cp dispersible							
			50 mg	cp dispersible							
			100 mg	cp dispersible							
			200 mg	cp dispersible							
LAMISIL	terbinafine		250 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas
LAMIVUDINE	lamivudine		150 mg	cp pelliculé sécable							A administrer intact à heure fixe, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la solution buvable d'Epivir® (10mg/ml) ou de Zeffix® (5mg/ml)
			300 mg	cp pelliculé							
LAMIVUDINE ZIDOVUDINE	lamivudine + zidovudine		150 mg / 300 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer de préférence intact, au cours ou en dehors des repas Broyage possible et administration immédiate mélangé

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
											a une petite quantité de liquide ou de nourriture semi-solide
LAMOTRIGINE	lamotrigine		25 mg	cp dispersible ou à croquer							Comprimés à mâcher, puis avaler avec un d'eau ou à dissoudre dans de l'eau femme enceinte
			50 mg	cp dispersible ou à croquer							
			100 mg	cp dispersible ou à croquer							
			200 mg	cp dispersible ou à croquer							
LAMPIT ATU	nifurtimox		120 mg	comprimé							
LAMPRENE	clofazimine		50 mg	capsule molle							A administrer au cours d'un repas ou avec une solution buvable lactée pour assurer une absorption maximale
			100 mg	capsule molle							
LANGORAN LP	dinitrate d'isocorbide		20 mg	gélule							Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir : gélules à libération prolongée avec microgranules
			40 mg	gélule							
			80 mg	gélule							
LANSOPRAZOLE	lansoprazole		15 mg	gélule							A administrer en une seule prise le matin, au moins 30 minutes avant le repas Ne pas croquer , ni écraser, mais ouverture possible : gélules avec microgranules gastro-résistantes saupoudrables sur une petite quantité de nourriture non liquide (yaourt, compote de pomme) ou mélangeables à une petite quantité d'eau ou de jus de pomme ou de tomate
			30 mg	gélule							
LANSOYL framboise	paraffine liquide		11,734 g (15 g)	gel oral							A administrer en dehors d'un repas
LANSOYL sans sucre	paraffine liquide		78,23 g (100 g)	gel oral							
LANVIS	tioguanine		40 mg	cp bisécable							A administrer en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Cytotoxique : évitez le contact avec la peau et d'inhaler des particules pulvérulentes

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
											 femme enceinte
LANZOR	lansoprazole		15 mg	gélule							A administrer au moins 30 minutes avant les repas Ne pas croquer , ni écraser, mais ouverture possible : gélules avec microgranules gastrorésistantes saupoudrables sur une petite quantité de nourriture non liquide (yaourt, compote de pomme) ou
			30 mg	gélule							
LARGACTIL	chlorpromazine		40 mg / ml	solution buvable							Ne pas croquer , ni écraser Préférez la solution buvable : 1 mg = I goutte, 1 ml = XL gouttes
			25 mg	cp bisécable	  						
			100 mg	cp bisécable	  						
LARIAM	méfloquine		250 mg	cp bisécable	 						A administrer au cours du repas Principe actif amer et irritant : broyage possible si administration par sonde entérale
LAROSCORBINE	vitamine C		1 g	cp effervescent							Préférez les comprimés effervescents dissous dans au moins un ½ verre d'eau : dégazez la solution
LAROSCORBINE sans sucre	vitamine C		500 mg	cp à croquer							
			1 g	cp effervescent							
LAROXYL	amitriptyline		40 mg / ml	solution buvable							A administrer avec un peu d'eau, au cours ou en dehors d'un repas Préférez la solution buvable : 1 mg = I goutte
			25 mg	comprimé enrobé	  						
			50 mg	comprimé enrobé	  						
LASILIX	furosémide		10 mg / ml	solution buvable							A administrer le matin avant le petit déjeuner Ne pas croquer la gélule , mais ouverture possible sans écraser les microgranules Préférez la solution buvable telle quelle ou diluée dans
			40 mg	cp bisécable	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LASILIX FAIBLE	furosémide		20 mg	comprimé							Prenez la solution buvable telle que ou diluée dans un ½ verre d'eau ou une petite quantité de lait → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i> Photosensible : administration immédiate
LASILIX RETARD	furosémide		60 mg	gélule							
LASILIX SPECIAL	furosémide		500 mg	cp bisécable							A administrer la veille et l'avant-veille de la dialyse
LAXARON	lactulose		10 g / 15 ml	solution buvable							
LAXILO	aloès + séné + sterculia		3,9mg/6mg/50mg	gélule				?	?		A administrer avec un verre d'eau
L-CITRULLINE PH	L-citrulline		500 mg	comprimé							Comprimé dispersible , ne pas écraser
LCP CAPSULES	produit énergétique sans protéines enrichi en ω-3 et ω-6		500 mg	gélule							Gélule à avaler entière ou ouvrable : versez le contenu dans une cuillère Indiqué au-delà de 8 ans, en cas de phénylcétonurie
L DOPS ATU	droxidopa		100 mg	gélule				?	?		
			200 mg	gélule				?	?		
LECTIL	bétahistine		8 mg	comprimé							A administrer au milieu du repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
			16 mg	cp bisécable							
			24 mg	comprimé							
LEDERFOLINE	acide folinique		5 mg	comprimé sécable							
			15 mg	comprimé sécable							
			25 mg	comprimé sécable							
LEELOO	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		0,2 mg / 0,11 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe, avec un peu d'eau Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
LEGALON	silymarine		70 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
LEMIEL 2 ^e Âge	préparation lactée pour nourrisson		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée.

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LEMIEL CONFORT 2 ^e Âge	préparation lactée enrichie en fer + petite quantité de miel		900 g	poudre orale et entérale							Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage, de 5 mois à 1 an
LEPONEX	clozapine		25 mg	cp bisécable	 						
			100 mg	cp bisécable	 						
LEPTICUR	tropatépine		5 mg	comprimé sécable	 						A administrer avec un verre d'eau
			10 mg	comprimé sécable	 						
LERCAN	lercarnidipine		10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer à heure fixe, de préférence le matin, avant le petit déjeuner
			20 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
LERCANIDIPINE	lercanidipine		10 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		Préférez les gélules d'Amlor® Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			20 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
LERCAPRESS	énalapril + lercadipine		20 mg / 10 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer le matin au moins 15 minutes avant le repas Ne pas associer avec du pamplemousse
LESCOL	fluvastatine		20 mg	gélule							A administrer de préférence le soir, au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée, ni ouvrir les gélules
			40 mg	gélule							
LESCOL LP	fluvastatine		80 mg	cp pelliculé							
LETROZOLE	létrozole		2,5 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas, avec un verre d'eau ou d'autre boisson Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LEUFREE COOLER ROUGE	mélange d'AA sans leucine, enrichi en glucides, AG ω-3, minéraux, vitamines et oligo-éléments équivalent protéique = 15 g		130 ml	solution buvable							Prête à l'emploi A utiliser dans le traitement nutritionnel de la leucinose à partir de 3 ans
LEVETIRACETAM	lévétiracétam		250 mg	cp pelliculé sécable							A administrer au cours ou en dehors des repas, avec une quantité suffisante d'eau ou d'autre liquide Goût amer : comprimés écrasables si administration par sonde entérale
			500 mg	cp pelliculé sécable							Préférez la solution buvable de Keppra® diluée dans un peu d'eau
			1 g	cp pelliculé sécable							
LEVITRA	vardénafil		5 mg	cp pelliculé		?	?		?		Comprimés à administrer avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas Le comprimé orodispersible doit être pris sans liquide, immédiatement après avoir été sorti de la plaquette Évitez les graisses, l'alcool et le jus de pamplemousse
			10 mg	cp orodispersible							
			10 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			20 mg	cp pelliculé		?	?		?		
LEVOCARNIL	L carnitine		1 g / 10 ml	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau
LEVOCETIRIZINE	lévocétirizine		5 mg	cp pelliculé							A administrer intact, au cours ou en dehors des repas, de préférence en une prise, avec une boisson Ne pas croquer, ni écraser
LEVOFLOXACINE	lévofloxacine		500 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
LEVONORGESTREL	lévonorgestrel		1,5 mg	comprimé							A avaler avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			25 µg	comprimé sécable							A administrer en une seule prise. le matin à jeun. juste
			50 µg	comprimé sécable							
			75 µg	comprimé sécable							
			100 µg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LEVOTHYROX	lévothyroxine sodique		100 µg	sécable							<p>avant le repas</p> <p>Préférez la solution buvable de L-Thyroxine® : 1 goutte = 5 µg</p>
			125 µg	comprimé sécable							
			150 µg	comprimé sécable							
			175 µg	comprimé sécable							
			200 µg	comprimé sécable							
LEVOTHYROXINE	lévothyroxine sodique		25 µg	comprimé sécable							<p>A administrer en une seule prise, le matin à jeun, juste avant le repas</p> <p>Préférez la solution buvable de L-Thyroxine® : 1 goutte = 5 µg</p>
			50 µg	comprimé sécable							
			75 µg	comprimé sécable							
			100 µg	comprimé sécable							
			125 µg	comprimé sécable							
			150 µg	comprimé sécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			175 µg	comprime sécable	 						
			200 µg	comprimé sécable	  						
LEVOTONINE	oxitriptan		100 mg	gélule							A administrer avec un verre d'eau, au milieu des repas
LEXOMIL	bromazéпам		6 mg	cp quadri sécable							A administrer immédiatement après dissolution Comprimé administrable par voie sub-linguale
LEXPEC ATU	acide folique		2,5 mg / 5 ml	solution buvable							
LIBRAX	clidinium bromure + chlordiazépomide		2,5 mg / 5 mg	comprimé enrobé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un peu d'eau Si broyage du comprimé, évitez les phénomènes d'échauffement : administration immédiate
LIDENE	doxylamine		15 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		A administrer en une seule prise le soir, 15 à 30 minutes avant le coucher Ne pas associer à la prise d'alcool
LINCOCINE	lincomycine		500 mg	gélule							Ne rien ingérer, excepté de l'eau 2 h avant ou après la prise de la gélule Ne pas croquer , ni écraser
LINDILANE	paracétamol + codéine		400 mg / 25 mg	comprimé							Goût très amer - Préférez Efférgan® codéiné comprimé effervescent : dégazez la solution
LIORESAL ATU pour la solution buvable 5 mg/5 ml	baclofène		1 mg / 1 ml	solution buvable							
			5 mg / 5 ml	solution buvable							A administrer au cours des repas avec un verre d'eau Préférez les solutions buvables
			10 mg	cp bisécable	 						
LIPANOR	ciprofibrate		100 mg	gélule	 			?	?		A administrer avec un verre d'eau
LIPANTHYL	fénofibrate		67 mg	gélule	 						
			145 mg	comprimé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer , ni écraser les comprimés à libération prolongée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			160 mg	comprimé							Contenu des gélules peu soluble dans l'eau : mélangez à de la compote
			200 mg	gélule	 						
LIPISTART	mélange de nutrition complet, enrichi en TCM, vitamines et oligoéléments, pauvre en AG à longue chaîne		400 g	poudre orale et entérale							1 mesure = 5 g Mélanger chaque mesure rase à 3à ml d'eau à 70°C A administrer tiède ou froide, en cas de malabsorption, de troubles du métabolisme des AG à longue chaîne, au-delà de l'âge de 1 an
LIPROCIL	pur mélange lipidique à teneur garantie en TCM et en AG essentiels, vitamine E		500 ml (900 kcal/100 g)	huile							A incorporer dans l'alimentation habituelle en remplacement ou en complément des matières grasses (huile/beurre) ou dans la solution de nutrition entérale
			1 000 ml (900 kcal/100 g)	huile							
LIPUR	gemfibrozil		450 mg	cp pelliculé	 						A administrer une demi heure avant le petit déjeuner ou le dîner Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale
LIQUID MAXIJUL	solution glucidique hyper énergétique : 50 % de Maxijul + eau		200 ml (200 kcal/100ml)	briquette							A consommer tel quel ou mélangé à des solution buvables ou aliments ou transformé en bâton glacé Indiqué au-delà de 6 mois
LIQUIGEN	émulsion fine de TCM		250 ml	huile							A incorporer dans l'alimentation habituelle ou dans la solution de nutrition entérale
LISINOPRIL	lisinopril		5 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas, avec un verre d'eau
			20 mg	cp quadrisécable		?	?		?		
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE	lisinopril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp bisécable		?	?		?		femme enceinte
LITHIAGEL	carragaheen + hydroxyde et carbonate d'alumine		80 mg / 920 mg (15 ml)	susp. buvable							A administrer au cours ou à la fin d'un repas : mélangé à l'alimentation ou dans 100 à 150 ml d'eau aromatisée ou non
LIVIAL	tibolone		2,5 mg	comprimé							A administrer à heure fixe, avec de l'eau ou une autre solution buvable
LOBAMINE CYSTEINE	méthionine + cystéine		350 mg / 150 mg	gélule							
LOCASOL	vitamines, minéraux et oligoéléments		400 g	poudre orale							Dans les hypercalcémies, et hypervitaminoses D
			20 mg	comprimé enrobé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LODALES	savastatine		40 mg	cp pelliculé	   						A administrer en une seule prise le soir, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer , ni écraser
LODINE	étodolac		200 mg	cp pelliculé	 						A administrer au milieu des repas
			300 mg	cp pelliculé	 						 femme enceinte
LODOSYN ATU	carbidopa		25 mg	comprimé		?	?		?		
LODOZ	bisoprolol + hydrochlorothiazide		2,5 mg / 6,25 mg	cp pelliculé	 						A administrer le matin, au cours ou en dehors d'un repas, avec un peu de liquide Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
			5 mg / 6,25 mg	cp pelliculé	 						
			10 mg / 6,25 mg	cp pelliculé	 						
LOFENALAC	aliment hyperprotidique		9,5 g (mesure)	poudre orale et entérale							Diluez 1 mesure de poudre dans 60 ml d'eau tiède Indiqué en cas de phénylcétonurie
LOGIFLOX	loméfloxacin		400 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer le soir, au cours ou en dehors des repas
LOGIMAX LP	fénodipine + métoprolol		5 mg / 47,5 mg	cp pelliculé							A administrer le matin, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
LOGIRENE	furosémide + amiloride		40 mg / 5 mg	cp bisécable	 	?	?		?		Goût amer : administrable par sonde ou mélangé à des aliments pauvres en potassium Ne pas administrer avec des sels de potassium
LOGROTON	chlortalidone + métoprolol		25 mg / 200 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		A administrer le matin au petit déjeuner ou à midi, avec de l'eau
LONOTEN	minoxidil		5 mg	cp bisécable	 						Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
			10 mg	cp bisécable	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LOPERAMIDE	lopéramide		2 mg	cp pelliculé	 						<p>Ne pas croquer les comprimés Préférez le lyophilisat oral à laisser fondre sur la langue ou à dissoudre dans un verre d'eau</p>
			2 mg	lyophilisat oral	 						
			2 mg	gélule							
LOPHLEX LQ	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, minéraux, vitamines et oligoéléments		125 ml (115 kcal)	solution buvable							<p>Boisson prête à l'emploi - A administrer bien frais Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie dès 8 ans, chez l'adulte et la femme enceinte</p>
LOPHLEX POWDER	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en minéraux, vitamines et oligoéléments		27,8 g (91 kcal/sachet)	poudre orale et entérale 2 saveurs + goût neutre							<p>Mélangez 1 sachet avec un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau 80 ml Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie dès 8 ans, chez l'adulte et la femme enceinte</p>
LOPRESSOR	métoprolol		100 mg	cp pelliculé bisécable							<p>A administrer pendant ou juste après les repas : la prise alimentaire augmente la biodisponibilité</p>
LOPRESSOR LP	métoprolol		200 mg	cp pelliculé bisécable							<p>A administrer pendant ou juste après les repas : la prise alimentaire augmente la biodisponibilité Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée Préférez Lopressorl® 100 mg ou Seloken® 100 mg → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i></p>
LOPRIL	captopril		25 mg	cp bisécable	 						<p>A administrer avec un verre d'eau, avant, pendant ou après un repas</p>
			50 mg	cp bisécable	 						<p> femme enceinte</p>
LOPROFIN	farine hypoprotidique		500 g	poudre orale et entérale							<p>Indiqués dans les maladies rénales et maladies héréditaires du métabolisme des acides aminés</p>
	lait hypoprotidique		200 ml	solution buvable							
	substitut de blanc d'œuf hypoprotidique		100 g	poudre orale et entérale							
	substitut d'œuf hypoprotidique		250 g	poudre orale et entérale							
			1 mg / ml	sirop	 						<p>A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un</p>

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LORATADINE	loratadine		10 mg	comprimé	  	?	?		?		verre d'eau Préférez la forme sirop
LORATADINE HCTZ	loratidine + hydrochlorothiazide		100 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							
LORAZEPAM	lorazépam		1 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau
			2,5 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
LOSARTAN	losartan		50 mg	cp pelliculé sécable	 						A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas, avec un verre d'eau  femme enceinte
			100 mg	cp pelliculé	 						
			100 mg	cp pelliculé	  						
LOSARTAN HCT	losartan + hydrochlorothiazide		50 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas, avec un verre d'eau  femme enceinte
			100 mg / 25 mg	cp pelliculé							
LOVAVULO	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		0,02 mg / 0,1 mg	cp pelliculé							
LOXAPAC	loxapim		25 mg / ml	solution buvable							A administrer en une seule prise le soir ou en prises fractionnées au cours de la journée Préférez la solution buvable mélangée à un jus de fruit ou un liquide sucré
			25 mg	cp pelliculé	 						
			50 mg	comprimé	 						
			100 mg	cp pelliculé	 						
LOXEN	nicardipine		20 mg	cp bisécable						A administrer avec de l'eau, juste avant le repas Ne pas croquer , ni écraser le comprimé ou la gélule à	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LOXEN LP	nicardipine		50 mg	gélule	 						libération prolongée : gélule ouvrable sans écraser les micro granules Forme injectable instillable par voie sublinguale ou nasale Ne pas y associer la prise de pamplemousse
L THYROXINE	L-thyroxine		0,15 mg / ml	solution buvable	 						A administrer le matin, à jeun, juste avant le repas, directement dans la bouche : I goutte = 5 µg
LUBENTYL	paraffine liquide + paraffine solide		2,89g / 0,36575 g (5 ml)	gelée orale							A administrer le soir au coucher
LUBENTYL A LA MAGNESIE	paraffine liquide + hydroxyde de magnésium		2,8 g / 0,75 g (5 g)	gelée orale							
LUDEAL	lévonorgestrel + éthinyloestradiol		0,15 mg / 0,03 mg	comprimé enrobé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
LUDIOMIL	maprotiline		25 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			75 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
LUMALIA	ciprotérone + éthinyloestradiol		2 mg / 0,035 mg	comprimé enrobé	 						A administrer à heure fixe
LUMIRELAX	méthocarbamol		500 mg	comprimé sécable		?	?		?		A administrer au début des repas, avec de l'eau
LUMIREM	férumoxsil		17,5 mg / 100 ml	susp. buvable							
LUTENYL	nomégestrol		3,75 mg	comprimé							A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			5 mg	cp bisécable							
LUTERAN	chlormadinone		2 mg	comprimé		?	?		?		
			5 mg	comprimé		?	?		?		
			10 mg	comprimé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LYO BIFIDUS	bacillus bifidus		1 000 M germes	poudre orale							A administrer à la fin d'un repas, diluée dans un verre d'eau
LYRICA	prégabaline		25 mg	gélule	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			50 mg	gélule	 						
			75 mg	gélule	 						
			100 mg	gélule	 						
			150 mg	gélule	 						
			200 mg	gélule	 						
			300 mg	gélule	 						
LYSANXIA	prazépam		15 mg / ml	solution buvable							Les comprimés se délitent rapidement dans la bouche par voie sub-linguale
			10 mg	comprimé	 						Préférez la solution buvable : 1 cp à 10 mg ↔ XX
			40 mg	comprimé sécable	 						gouttes 1 cp à 40 mg ↔ LXXX gouttes
LYSO 6	vitamine B ₆ + lysozyme		10 mg / 20 mg	cp sublingual	 						Ne pas croquer, ni écraser : laissez fondre sous la langue
LYSOCLINE	métacycline		300 mg	gélule							A administrer en dehors des repas avec une quantité suffisante de liquide Evitez la prise simultanée de lait : l'association à des cations bi ou trivalents (Al, Ca, Mg) forme des complexes non absorbables
LYSODREN	mitotane		500 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
LYSOPAINE	cétylpyridinium + muramidase	®	1,5 mg / 20 mg	comprimé à sucer							A laisser fondre dans la bouche Ne pas croquer , ni écraser
LYTOS	acide chlodromine sel disodique		520 mg	cp pelliculé	 						A administrer à distance des repas, avec une solution buvable peu riche en calcium Ne pas associer à du lait ou des aliments contenant des cations divalents (calcium, magnésium ...)
MAALOX ballonnements	alumine + hydroxyde de magnésium + siméticone		100 mg / 200 mg / 25 mg	cp à croquer							A administrer au moment des troubles
MAALOX digestion difficile	boldine + sulfate de sodium anhydre + phosphate monosodique anhydre		0,5 mg / 54 mg / 132 mg	cp effervescent							A administrer avant les repas ou au moment des troubles, dissous dans un verre d'eau : dégazez la solution
MAALOX maux d'estomac	hydroxyde de magnésium + hydroxyde d'aluminium		525 mg / 600 mg (15 ml)	susp. buvable							A administrer au moment des troubles Malaxez bien le sachet de suspension buvable avant l'ouverture : absorption telle quelle sans diluer
			400 mg / 400 mg	cp à croquer ou à sucer							
MAALOX maux d'estomac fruits rouges	hydroxyde de magnésium + hydroxyde d'aluminium		600 mg / 525 mg	susp. buvable							
MAALOX maux d'estomac fruits rouges sans sucre	hydroxyde de magnésium + hydroxyde d'aluminium		400 mg / 400 mg	cp à croquer ou à sucer							
MAALOX maux d'estomac sans sucre	hydroxyde de magnésium + hydroxyde d'aluminium		400 mg / 400 mg	cp à croquer ou à sucer							
MADECASSOL	hydrocotyle	®	10 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours d'un repas
MAG 2	pidolate de magnésium	®	1,5 g / 10 ml	solution buvable							Avaler le comprimé avec un ½ verre d'eau avant ou au cours d'un repas, insoluble dans l'eau Préférez la solution buvable ou la poudre orale diluées dans un ½ verre d'eau
			2,25 g	poudre orale							
	carbonate de magnésium		100 mg	comprimé							
MAGIC MIX	amidon de maïs, sans gluten, ni lactose, ni sucre simple		30 g	poudre goût neutre							Poudre épaississante soluble instantanément à chaud ou à froid, saupoudrer lentement sur un liquide ou un plat en agitant avec une fourchette
			300 g	poudre goût neutre							
MAGNE B ₆	lactate de magnésium + vitamine B ₆	®	48 mg / 5 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours du repas avec un grand verre d'eau ou un jus de fruit
MAGNESIE COMPOSEE	bicarbonate de sodium + carbonate de magnésium + hydroxyde de magnésium + trisilicate de magnésium + thym		20g/30g/10g/30g / 10g (100 g)	poudre orale							A administrer au moment des douleurs, délayée dans un verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MAGNESIE ANISEE	hydroxyde de magnésium		2 g /5,5 ml	poudre orale effervescente	■		☞		☞		A administrer le matin à jeun et au coucher, diluée dans un ½ verre d'eau : dégazez la solution effervescente
			2 g /5,5 ml	poudre orale	■		☞		☞		
MAGNESIUM	oxyde de magnésium		150 mg cp efferv	cp effervescent		☞	☞		☞		A administrer avant ou au cours d'un repas, dissous dans un grand verre d'eau
MAGNESIUM GLYCOLLE	glycine + lactate de magnésium		190 mg / 50 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		A administrer avec un grand verre d'eau, pendant les repas Ne pas croquer , ni écraser
MAGNESIUM VIT B ₆	lactate de magnésium + vitamine B ₆		470 mg / 5 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		A administrer au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser
MAGNESPASMYL	lactate de magnésium		47,4 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser : préférez les granulés dissous dans un verre d'eau
			47,4 mg / 2,5 g	granulés	■	☞	☞		☞		
MAGNEVIE B ₆	lactate de magnésium + vitamine B ₆		100 mg /10 mg	comprimé enrobé	■	☞	☞		☞		A administrer au cours du repas avec un grand verre d'eau ou un jus de fruit Ne pas croquer , ni écraser
MAGNOGENE	chlorure de magnésium		55 mg	gélule		☞		?	?		A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau
MALARONE	atovaquone + proguanil		62,5 mg /25 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		A administrer à heure fixe, avec un repas ou une solution buvable lactée pour favoriser l'absorption de l'atovaquone
			250 mg /100 mg	cp pelliculé	■	☞	☞		☞		
MALOCIDE	pyriméthamine	®	50 mg	comprimé	■	☞	☞		☞		
MALTO-DEXTRIDINE	complément alimentaire oral			poudre orale et entérale			☞		☞		Alimentation modulaire glucidique A ingérer 90 minutes avant ou après un repas
MANICOL	mannitol		5 g	poudre orale			☞		☞		A administrer le matin à jeun et au coucher, diluée dans un ½ verre d'eau froide
MANTADIX	amantadine	®	100 mg	capsule molle		☞		☞	☞		Ne pas ouvrir : excipient huileux Préférez le sirop de Symtrex® (en ATU)
MAPLEFLEX	mélange d'AA sans méthionine ni thréonine ni valine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		29 g (113kcal/sachet)	poudre orale et entérale			☞		☞		Mélangez 1 sachet de poudre à 30 ml d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml Traitement nutritionnel de la leucine entre 1 et 10 ans
MARCOUMAR ATU	phenprocoumone		3 mg	cp bisécable		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MARGA	oxyde d'aluminium + carbonate de calcium + hydroxyde de magnésium		100mg/50mg/60mg	comprimé à sucer							A administrer après les repas ou au moment des troubles
MARIBAVIR ATU	maribavir		100 mg	comprimé		?	?		?		
MARINOL ATU	dronabinol		2,5 mg	capsule molle							
MARSILID	ipromiazide		50 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas
MAXALT	rizatriptan		5 mg	comprimé							A administrer en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser les comprimés Préférez le lyophilisat oral qui se désintègre en quelques secondes sur la langue sans liquide, ce qui diminue les risques de nausées et vomissements
			10 mg	comprimé							
MAXALT LYO	rizatriptan		10 mg	lyophilisat oral							Comprimé qui se désintègre en quelques secondes sur la langue, sans liquide
MAXIFLORE	prébiotique + probiotique		10 ¹⁰ cellules vivantes / cp	comprimé							
MAXIJUL LIQUID	solution aqueuse de Maxijul Super soluble à 50 %		200 ml (200kcal/100 ml)	solution buvable 1 arôme + goût neutre							Solution prête à boire fraîche ou congelée (bâton glacé) Mélangez 50 g ou 75 g de poudre à 150 ml d'eau : mélangez vigoureusement à la fourchette
MAXIJUL SUPER SOLUBLE	petits polymères de glucose		132 g (500kcal/sachet)	poudre orale et entérale							Complément énergétique apportant peu de liquide, chez les nourrissons, enfants et les adultes lors des maladies du métabolisme des AA
MAXILASE	α amylase		200 U.CEIP / ml	sirop							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser : préférez le sirop
			3 000 U. CEIP	comprimé enrobé							1 cp ↔ 1 cuillère à soupe
MEBEVERINE	mébévérine		100 mg	capsule molle							A administrer avant un repas, avec un grand verre d'eau Ne pas ouvrir les capsule et gélule : excipient huileux
			200 mg	gélule							
			200 mg	cp bisécable		?	?		?		
MECIR LP	tamsulodine		0,4 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé à libération prolongée
			30 mg	gélule							A administrer au cours ou en dehors d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MEDIATENSYL	urapidil		50 mg	gélule							Gélules ouvrables, mais ne pas écraser les microgranules A administrer immédiatement : la libération du principe actif débute dès le contact avec l'eau
			60 mg	gélule	 						
MEDIBRONC	carbocistéine		100 mg / 5 ml	sirop							
MEDIVEINE	diosmine		50 mg / ml	solution buvable	 						A administrer, avec de l'eau, au cours d'un repas Administration immédiate, mélangé à de l'eau ou un aliment Préférez la poudre orale
			300 mg	comprimé							
			600 mg	poudre orale							
			600 mg	comprimé sécable							
MEDROL	méthylprednisolone		4 mg	comprimé							A administrer le matin pour faire coïncider avec la sécrétion naturelle de cortisol A administrer après dispersion dans l'eau et à associer à une prise alimentaire Préférez les formes de Solupred® solubles dans l'eau
			16 mg	comprimé							
			32 mg	comprimé							
			100 mg	comprimé sécable							
MEGACE	mégéstrol		160 mg	comprimé							A administrer en une seule prise Ne pas croquer , ni écraser : cytotoxique femme enceinte
MEGAMAG	aspartate de magnésium		45 mg	gélule						A administrer au cours d'un repas	
MEGAMYLAZE	α amylase		200 U.CEIP / ml	sirop							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser : préférez le sirop 1 cp ↔ 1 cuillère à soupe
			3 000 U. CEIP	comprimé enrobé							
MELADININE	méthoxsalène		10 mg	comprimé	 						A administrer en une seule prise, avec du yaourt, 2 h avant exposition solaire ou PUVA

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MELANGE SPECIAL D'ACIDES AMINES	supplément azoté anallergénique : mélange d'AA essentiels 100 g = 79 g équivalent protéidique		200 g (316kcal/100 g)	poudre orale et entérale goût neutre							Mélangez 5 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel des déficits du cycle de l'urée, chez les prématurées et dès l'âge de 6 mois
MELAXOSE	lactulose + paraffine liquide + vaseline		1,75g /2,145g/1,0725g (5 g)	gelée orale							
MELDASPIN	metformine		500 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			850 mg	cp pelliculé							femme enceinte
MELIANE	gestodène + éthinylestradiol		75 µg / 20 µg	comprimé enrobé							
MELODIA	gestodène + éthinylestradiol		0,06 mg/0,015 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MELOXICAM	méloxicam		7,5 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau ou un autre liquide
			15 mg	cp bisécable		?	?		?		
MEMANTHINE	mémantine		10 mg	cp pelliculé sécable							A administrer à heure fixe, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Goût amer : broyage possible si administration par sonde
			20 mg	cp pelliculé							Préférez la solution buvable d'Ebixa® : 1 cp à 10 mg ↔ XL gouttes
MENAELE	progestérone		100 mg	capsule mole							A administrer en dehors d'un repas, de préférence avant le coucher
MEPACRINE PH	dichlorhydrate de mépacrine		100 mg	gélule				?	?		A administrer après les repas
MEPROBAMATE	méprobamate		200 mg	comprimé							
			400 mg	cp bisécable							A administrer ½ h avant le coucher Ne pas croquer, ni écraser
MEPRONIZINE	méprobamate + acéprométazine		400 mg / 10 mg	comprimé enrobé bisécable							
MERCALM	dimenhydrinate + caféine		50 mg / 10 mg	cp pelliculé							A administrer ½ h avant le départ, avec un verre d'eau énergée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MERCALIM	camphénylamine + caféine		50 mg / 10 mg	bisécable	 						sucree Ecrasement possible
MERCILON	désoestrogel + éthynylestradiol		50 mg / 10 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MESTACINE	ménocycline		100 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer au cours d'un repas
MESTINON ATU pour la forme sirop	pyridostigmine		60 mg / 5 ml	sirop							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés très hygroscopiques et à libération prolongée Préférer la forme sirop → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
MESTINON RETARD ATU	pyridostigmine		60 mg	comprimé enrobé							Possibilité d'utiliser par voies orale et entérale la solution injectable de Prostigmine® (0,5 mg/ml) mélangée à de l'eau PPI → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
METABOLIQUES BCAD 1	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de la leucinose, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES BCAD 2	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel de la leucinose, après 18 mois et chez l'adulte
METABOLIQUES GA	mélange d'AA libres sans lysine et tryptophane ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'acidémie glutarique de type 1, à tout âge
METABOLIQUES HCY 1	mélange d'AA libres sans méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES HCY 2	mélange d'AA libres sans méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel après 18 mois et chez l'adulte si homocystinurie
METABOLIQUES LMD	mélange d'AA sans leucine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de l'acidémie isovalérique ou autre anomalie du catabolisme de la leucine, à tout âge
METABOLIQUES OA 1	mélange d'AA sans thréonine, valine, isoleucine et méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES OA 2	mélange d'AA sans thréonine, valine, isoleucine et méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, de la naissance à 18 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
METABOLIQUES PFD 1	complément glucido-lipidique sans protéines ni AA, supplémenté en vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel des troubles du métabolisme des acides aminés, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES PFD 2			450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 15 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel des troubles du métabolisme des acides aminés, après 18 mois et chez l'adulte
METABOLIQUES PHENYL FREE 1	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES PHENYL FREE 2			450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie, après 18 mois et chez l'adulte
METABOLIQUES PHENYL FREE 2 HP			450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 15 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie, après 18 mois et chez l'adulte et la femme enceinte
METABOLIQUES PORTAGEN	aliment complet contenant 85 % de TCM		450 g* (100 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,3 g de poudre à 17 ml d'eau Traitement nutritionnel de la malabsorption des graisses, chez l'enfant et l'adulte
METABOLIQUES TYROS 1	mélange d'AA sans phényl alanine et tyrosine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie de type I et II ou de l'alcaptonurie, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES TYROS 2			450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie de type I et II ou de l'alcaptonurie, après 18 mois et chez l'adulte
METABOLIQUES WND 1	mélange d'AA sans AA essentiels ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux		450 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel des déficits enzymatiques du cycle de l'urée, de la naissance à 18 mois
METABOLIQUES WND 2			450 g* (85 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 14,5 g de poudre à 60 ml d'eau Traitement nutritionnel des déficits enzymatiques du cycle de l'urée, après 18 mois et chez l'adulte
METEOSPASYL	alvérine + siméticone		60 mg / 300 mg	capsule molle							A administrer au début d'un repas
METEOXANE	siméticone + phloroglucinol		125 mg / 80 mg	gélule							A administrer avant un repas ou au moment des troubles, avec un peu d'eau
METFORMINE	metformine		500 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou après un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer, ni écraser
			850 mg	cp pelliculé							
			1 000 mg	cp pelliculé sécable							Préférez la poudre orale de Glucophage® diluée dans 150 ml d'eau : administration immédiate

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
METHADONE	méthadone chlorhydrate		1 mg	gélule				?	?		<p>A administrer à heure fixe</p> <p>La 1^{ère} prise de gélule doit avoir lieu le lendemain de la dernière prise de sirop, à l'heure habituelle</p> <p>Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir les gélules : préférez la forme sirop</p>
			1,33 mg / ml	sirop							
			5 mg (3,75 ml)	sirop							
			5 mg	gélule							
			10 mg (7,5 ml)	sirop							
			10 mg	gélule							
			20 mg (15 ml)	sirop							
			20 mg	gélule							
			40 mg (15 ml)	sirop							
			40 mg	gélule							
			60 mg (15 ml)	sirop							
METHERGIN	méthylergométrine		0,25 mg / ml	solution buvable							<p>Préférez la solution buvable</p>
			0,125 mg	cp pelliculé		?	?		?		
METHOTREXATE	méthotrexate		2,5 mg	comprimé							<p>Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique</p> <p> femme enceinte</p>
METOCALCIUM	calcium + vitamine D ₃		600 mg / 400 UI	cp à croquer ou à sucer							<p>A administrer en dehors d'un repas</p> <p>Comprimé à croquer (puis avaler de l'eau) ou à sucer</p>
METOCLOPRAMIDE	métoclopramide		10 mg	cp bisécable							<p>A administrer avant le repas, avec de l'eau</p> <p>Préférez la solution buvable de Primperan®</p>
METOPIRONE	métyrapone		250 mg	capsule molle							A administrer avec du lait ou du yaourt ou après le repas
			50 mg	comprimé							A administrer avec un verre d'eau, pendant ou juste après un repas : prise alimentaire augmentée le

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
METOPROLOL	métoprolol		50 mg	comprimé							après un repas : prise alimentaire augmente la biodisponibilité Goût désagréable : écrasement du comprimé possible, mais difficile, non recommandé
			100 mg	cp bisécable							
MEXILETINE	mexilétine		200 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas, ne pas s'allonger après l'administration
MIANSERINE	aniansérine		10 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni mâcher : la molécule est anesthésique au contact des muqueuses = broyage possible si aucun contact avec les muqueuses : administration uniquement par sonde entérale et immédiate
			30 mg	cp pelliculé	 						
			60 mg	cp pelliculé	 						
MICARDIS	telmisartan		20 mg	comprimé							A administrer avec un verre d'eau femme enceinte
			40 mg	comprimé							
			80 mg	comprimé							
MICARDIS PLUS	telmisartan + hydrochlorothiazide		40 mg / 12,5 mg	comprimé	 						A administrer en une seule prise à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau ou une autre solution buvable femme enceinte
			80 mg / 12,5 mg	comprimé	 						
			80 mg / 25 mg	comprimé	 						
MICRODOÏNE	nitrofurantoïne		50 mg	gélule						A administrer au cours d'un repas	
MICROPAKINE LP	acide valproïque		100 mg	granulés							A administrer au cours d'un repas, saupoudrés sur aliment mou ou solution buvable : froid ou à température ambiante (yaourt, jus de fruit, compote ...) Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : granulés à libération prolongée Ne pas administrer avec un aliment chaud ou une solution buvable chaude (soupe, café, thé ...) femme enceinte
			250 mg	granulés							
			500 mg	granulés							
			750 mg	granulés							
			1 000 mg	granulés							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MICROPAQUE	sulfate de baryum		5 g / 100 ml	susp. buvable							Diluez 500 ml de produit dans 750 ml d'eau
			100 g / 100 ml (500 ml)	susp. buvable et rectale							
			100 g / 100 ml (2 000 ml)	susp. buvable et rectale							
MICROPAQUE SCANNER	sulfate de baryum		5 g / 100 ml	susp. buvable							Suspension prête à l'emploi à additionner de 350 ml d'eau, agitez soigneusement Absorber 250 ml (½ flacon) de suspension 60', 45', 30' et juste avant l'examen = total de 2 flacons soit 1 000 ml
MICROSOL	cuivre		0,4 mg/ ml	solution buvable							A administrer le matin à jeun ou loin des repas femme enceinte
	lithium		0,04 mg/ ml	solution buvable							
	magnésium		1 mg / ml	solution buvable							
	cuivre + manganèse		0,03mg / 0,06mg (ml)	solution buvable							
	sélénium		0,04 mg/ ml	solution buvable							
MICROVAL	lévonorgestrel		0,03 mg	comprimé enrobé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MIFEGYNE	mifépristone		200 mg	comprimé							A administrer en une seule prise, avec un peu d'eau
MIGPRIV	acétylsalicylate de lysine + métoclopramide		900 mg / 10 mg	poudre orale							A dissoudre dans un verre d'eau
MIGRALGINE	paracétamol + caféine + codéine		400 mg / 62,5 mg / 20 mg	gélule							A avaler entière avec une solution buvable : eau, lait ou jus de fruit
MILDAC	millepertuis		300 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, de préférence le matin, avec un grand verre d'eau Comprimés broyés peuvent être mélangés à du yaourt ou des aliments plutôt sucrés A éviter ou arrêter Evitez la prise d'alcool
			600 mg	comprimé enrobé							
MILLIGYNON	noréthistérone		0,6 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MILNACIPRAN	milnacipran		25 mg	gélule							A administrer avec de l'eau, au cours d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			50 mg	gélule				?	?		A administrer avec de l'eau, au cours d'un repas
MILUMEL 1 ^{er} Age	préparation lactée pour nourrisson		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Destiné aux nouveaux-nés non allaités ou au moment du sevrage, jusqu'à 4 mois
MILUMEL 2 ^e Age	préparation lactée de suite		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Destinée aux nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage de 5 mois à 1 an
MILUPA 2 ^e Age	préparation lactée de suite, enrichie en prébiotiques		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée
MILUPA AR 2 ^e Age	préparation lactée de suite épaissie à la farine de caroube		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de régurgitations
MILUPA BABYSOIF	préparation aux extraits naturels de plantes		sachet	granulés 5 saveurs							Mélangez 1 sachet dans 100 ml d'eau chaude ou froide Boisson non nutritive, dès 5 mois
MILUPA CONFORMIL 1 ^{er} Age	préparation lactée enrichie en fibres et prébiotiques		600 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée
MILUPA CONFORMIL 2 ^e Age			900 g	poudre orale et entérale							Indiquée en cas de constipation
MILUPA DIGEST 1 ^{er} Age	préparation lactée de suite épaissie, contenant des protéines fragmentées		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée
MILUPA DIGEST 2 ^e Age			900 g	poudre orale et entérale							Indiquée si petits troubles digestifs
MILUPA HN 25	préparation lactée appauvrie en lactose		500 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Indiquée en cas de diarrhées
MILUPA HOM 1 MIX	mélange d'AA libres sans méthionine, enrichi en cystéine, minéraux, vitamines et oligo-éléments		470 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesure de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Indiqué si homocystéinurie, jusqu'à 1 an
MILUPA HOM 2 PRIMA	mélange d'AA libres sans méthionine, enrichi en		500 g (290kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez au maximum 10 g de poudre par 100 ml d'eau Indiqué si homocystéinurie, à partir de 1 an
MILUPA HOM 2 SECUNDA	minéraux, vitamines et oligo-éléments		500 g (292kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez au maximum 10 g de poudre par 100 ml d'eau Indiqué si homocystéinurie, à partir de 9 ans
MIMPARA	cimacalcet		30 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou juste après un repas : la prise alimentaire augmente la biodisponibilité Ne pas croquer, ni écraser
			60 mg	cp pelliculé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			90 mg	cp pelliculé	 						
MINALFENE	alminoprofène		300 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours des repas femme enceinte
MINAPHLEX	mélange d'AA sans phénylalanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments équivalent protéidique = 8,4 g		29 g (113kcal/sachet)	poudre orale et entérale 3 saveurs + goût neutre							Mélangez 1 sachet de poudre à 100 ml d'eau froide, bien agiter Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez les enfants de 1 à 10 ans
MINERVA	cyprotérone + éthinylestradiol		35 µg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MINESSE	gestodène + éthinylestradiol		0,06 mg / 0,015 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MINIDIAB	glipizide		5 mg	comprimé sécable							A administrer 15 à 20 minutes avant les repas
MINIDRIL	lévonorgestrel + éthinylestradiol		0,15 mg / 0,03 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MINIPHASE	noréthistérone + éthinylestradiol		1 mg / 0,03 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			2 mg / 0,04 mg	comprimé enrobé							
MINIPRESS	prazosine		1 mg	comprimé sécable							Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale
			5 mg	comprimé sécable							
MINIRIN	desmopressine		0,1 mg	comprimé							Préférez le spray nasal 1 µg / ml ou la solution endonasale 0,1 µg / ml ou Minirinmelt® lyophilisat
			0,2 mg	comprimé							
MINIRINMELT	desmopressine		60 µg	cp sub lingual							Comprimés lyophilisés qui fondent dans la bouche
			120 µg	cp sub lingual							
MINISINTROM	acénocoumarol		1 mg	comprimé	 						A administrer avec un verre d'eau Ne pas écraser car comprimé trop petit femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MINOCYCLINE	minocycline		50 mg	gélule				?	?		
			100 mg	gélule				?	?		
			100 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
MINOLIS	minocycline		50 mg	gélule							Aucune incompatibilité alimentaire, sauf l'alcool
			100 mg	gélule							
MINULET	gestodène + éthinylestradiol		0,075 mg / 0,03 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MIOREL	thiocolchicoside		4 mg	gélule							
MIRTAZAPINE	mirtazapine		15 mg	cp orodispersible							Préférez le comprimé dispersible : ne pas croquer, ni écraser, laissez fondre dans la bouche
			15 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
MISSILOR	spiramycine + métronidazole		750 000 UI / 125 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
MIZORIBINE ATU	brédinine		50 mg	comprimé		?	?		?		
MIZOLLEN LP	mizolastine		10 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération modifiée
MMA / PA ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans méthionine ni thréonine ni valine, pauvre en isoleucine, enrichi en vitamines, sels minéraux et prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Diluer 15 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel des acidémies méthylmalonique ou propionique jusqu'à 1 an et en supplémentation de 1 à 3 ans

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MMA / PA GEL	mélange d'AA sans méthionine ni thréonine ni valine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		20 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 sachet dans 30 ml d'eau fraîche, bien agiter = consistance d'entremet + ajoutez 100 ml d'eau pour une solution buvable - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel des acidémies méthylmalonique ou propionique entre 1 et 8 ans
MMA / PA EXPRESS	mélange d'AA sans méthionine ni thréonine ni valine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		25 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 sachet dans 100 ml d'eau fraîche, bien agiter - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel des acidémies méthylmalonique ou propionique dès 8 ans
MNESIS ATU	idébénone		45 mg	comprimé		?	?		?		
MOBIC	méloxicam		7,5 mg	comprimé							A administrer au cours du repas avec de l'eau Ne pas écraser, mais se délitent facilement dans la bouche ou préférez la forme suppositoire (toxicité locale : à utiliser le temps le plus court possible)
			15 mg	comprimé sécable							
MOCLAMINE	moclobénide		150 mg	cp pelliculé sécable	 						A administrer à la fin des repas
MODAMIDE	amiloride		5 mg	comprimé							Goût amer : administrable par sonde ou mélangé à des aliments pauvres en potassium Ne pas administrer avec des sels de potassium A administrer immédiatement
MODANE	pentothénate de calcium + séné		12,5 mg / 26 mg	comprimé enrobé							
MODIGRAF	tacrolimus		0,2 mg	granulés pour susp. buvable	 						A administrer 1 h avant ou 2 à 3 h après le repas ou toujours aux mêmes heures par rapport aux repas Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			1 mg	granulés pour susp. buvable	 						
MODILAC 1	laits infantiles épaissis à l'amidon de maïs et au tapioca		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour le bébé bien portant dès la naissance ou en relais de l'allaitement
MODILAC 2			900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour le bébé bien portant lors de la diversification alimentaire
MODILAC BISCUIT MIEL	recette aux 8 céréales dextrinisées, enrichie en bifidus, fer, calcium et vitamines		300 g	poudre orale et entérale							Mélange de céréales indiqué dès 6 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MODILAC CONFORT PLUS 1	laits infantiles épaissis à l'amidon de maïs et au tapioca		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de rejets physiologiques, de la naissance jusqu'à 3 ans
MODILAC CONFORT PLUS 2			900 g	poudre orale et entérale							
MODILAC CROISSANCE	lait infantile, sans saccharose ni arôme		800 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour les enfants de 1 à 3 ans
MODILAC DIGEST 1	laits infantiles enrichis en bifidus, à teneur réduite en lactose, sans sucres ajoutés ni arôme		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de troubles digestifs (coliques, gaz, ballonnements), de la naissance jusqu'à 3 ans
MODILAC DIGEST 2			900 g	poudre orale et entérale							
MODILAC EXPERT 1	préparation lactée pour nourrisson enrichie en ω-3 et 6, à haute teneur en alpha-lactalbumine		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour un bébé en bonne santé, dès la naissance ou en relais de l'allaitement maternel
MODILAC EXPERT 2			900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour un bébé en bonne santé, de 6 mois à 1 an
MODILAC EXPERT AR 2	préparation lactée épaissie : caroube + amidon de maïs		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Prise en charge ditététiques des régurgitations, de 6 mois à 1 an
MODILAC EXPERT RIZ 1	préparation diététique contenant 100 % de protéines de riz hydrolysées, sans lactose		800 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Alternative 100 % végétale, en cas d'APLV
MODILAC EXPERT RIZ 2			800 g	poudre orale et entérale							
MODILAC EXPERT SANS LACTOSE	préparation diététique contenant 0 % lactose et des nucléotides		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de diarrhée aiguë.
MODILAC EXPERT SOJA 1	préparation à base de protéines de soja, sans lait ni dérivés du lait, sans lactose ni saccharose, ni gluten		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Alternative 100% végétale en cas d'APLV et/ou d'intolérance au lactose, de la naissance jusqu'à 3 ans
MODILAC EXPERT SOJA 2			900 g	poudre orale et entérale							
MODILAC EXPERT TRANSIT +	préparation lactée riche en lactose et en huiles végétales		400 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Indiqué en cas de onstipation ou de transit ralenti
MODILAC HA 1 ^{er} Age	laits hypoallergéniques		400 g* (71,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Indiquée en prévention du risque allergique, en allaitement mixte et en période de sevrage
MODILAC HA 2 ^e Age			800 g* (81,9kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
MODILAC NUIT CALME	préparation à base de céréales sans gluten, aux extraits de plantes apaisantes		300 g	poudre orale et entérale							Préparation indiquée entre 4 et 6 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MODILAC NUTRIFIBRES	préparation de 8 céréales, enrichie en fibres et prébiotiques		300 g	poudre orale et entérale							Préparation pour régulariser le transit intestinal, à partir de 6 mois
MODILAC PRECISION 1 ^{er} Age	lait écrémé contenant des huiles végétales, formule épaissie		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau
MODILAC PRECISION 2 ^e Age			900 g	poudre orale et entérale							
MODILAC RELAIS	préparation lactée		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau, en relais du lait 2 ^{ème} âge jusqu'à 3 ans
MODILAC SANS LACTOSE	préparation lactée sans lactose			poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de diarrhée
MODILAC SATIETE 1	laits infantiles, pour une meilleure satiété, sans apport de calories supplémentaires		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour les bébés gros mangeurs
MODILAC SATIETE 2			900 g	poudre orale et entérale							
MODIODAL	modafinil		100 mg	comprimé	 						Le comprimé se dissout rapidement dans l'eau : administration immédiate
MODOPAR	lévodopa + bensérazide		50 mg / 12,5 mg	gélule							Préférez le comprimé orodispersible à boire dans les 30 minutes avec de l'eau ou du jus d'orange La dissolution du contenu des gélules entraîne la destruction du principe actif
			100 mg / 25 mg	cp orodispersible							
			100 mg / 25 mg	gélule							
			200 mg / 50 mg	gélule							
MODOPAR LP	lévodopa + bensérazide		100mg/25mg	gélule							Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée Préférez le comprimé orodispersible à boire dans les 30 minutes avec de l'eau ou du jus d'orange → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)
MODUCREN	amiloride + hydrochlorothiazide + timolol		2,5 mg/25 mg / 10 mg	comprimé sécable							A administrer à distance des repas Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale ou mélangé à des aliments pauvres en potassium Ne pas administrer avec des sels de potassium
MODULEN IBD	mélange nutritif complet isocalorique, avec TCM, acides gras essentiels ; sans lactose, ni gluten, ni fibres		400 g* (100kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 50 g de poudre à 210 ml d'eau faiblement minéralisée (ou bouillie et refroidie) Administration immédiate, de préférence avec un régulateur de débit

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MODURETIC	amiloride + hydrochlorothiazide		5 mg / 50 mg	comprimé sécable							A administrer à distance des repas Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale ou mélangé à des aliments pauvres en potassium Ne pas administrer avec des sels de potassium
MOEX	moexipril		7,5 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec une solution buvable Ne pas croquer , ni écraser
			15 mg	cp pelliculé bisécable							femme enceinte
MOGADON	nitrazépam		5 mg	cp bisécable							A administrer avec un verre d'eau, le soir au coucher Si broyage du comprimé, évitez les phénomènes d'échauffement : administration immédiate
MOLSIDOMINE	molsidomine		2 mg	cp bisécable		?	?		?		
			4 mg	cp bisécable		?	?		?		
MOLVAL	peptides gabolysat + ω-3 + EPA + DHA		150mg/95mg/52,5mg/35,5mg								A administrer avant les repas
MONEVA	gestodène + éthinylestradiol		0,075 mg/0,03 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
MONICOR LP	mononitrate d'isosorbide		20 mg	gélule							Ne pas croquer , ni écraser, mais gélules ouvrables sans écraser les microgranules à libération prolongée A administrer immédiatement après ouverture avec de l'eau ou de la compote
			40 mg	gélule							
			60 mg	gélule							
MONOALGIC LP	tramadol		100 mg	comprimé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec une solution buvable
			200 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
		®	300 mg	comprimé							Préférez les comprimés effervescents de Zumalgic® ou de Biodalgic® ou le comprimé orodispersible
MONOCRIXO LP	tramadol		100 mg	gélule							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : gélules à libération prolongée
			150 mg	gélule							Préférez les comprimés effervescents de Zumalgic® ou de Biodalgic® ou le comprimé orodispersible
			200 mg	gélule							d'Orozamudol® ou la solution buvable de Topalgic®
MONOFLOCET	ofloxacine		200 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A avaler avec un grand verre d'eau
MONOGEN	mélange complet de protéines, glucides, minéraux, vitamines et oligoéléments, riche en TCM, et pauvre en TCL		400 g* (74,2kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 17,5 g de poudre à 100 ml d'eau : bien agiter Traitement nutritionnel chez le nourrisson et l'enfant, de l'hyperlipoprotéïnémie de type 1, les déficits du métabolisme des AG à longue chaîne, le chylothorax, les lymphangiectasies intestinales
MONONAXY	clarithromycine		500 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération modifiée
MONO TILDIEM LP	diltiazem		200 mg	gélule							A administrer au cours du repas
			300 mg	gélule							Ne pas ouvrir : gélules à libération prolongée
MONOTRAMAL LP	tramadol		100 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			200 mg	comprimé							Préférez les comprimés effervescents de Zumalgic® ou de Biodalgic® ou le comprimé orodispersible
			300 mg	comprimé							d'Orozamudol® ou la solution buvable de Topalgic®
MONOZECLAR	clarithromycine		500 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours des repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération modifiée
MONTELUKAST	montelukast sodique		5 mg	comprimé à croquer							A administrer le soir, au moins 1 heure avant ou 2 heures après la prise alimentaire
			10 mg	cp pelliculé	 						A administrer le soir, au cours ou en dehors d'un repas Peut être croqué

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MONURIL	fosfomycine	®	3 g	granulés pour solution buvable							A administrer avec un ½ verre d'eau, à jeun : 2 h avant ou 3 h après un repas
MOPRAL	oméprazole		10 mg	gélule							A administrer 30 minutes avant le repas du soir Gélules ouvrables mais sans écraser les microgranules gastrorésistants Mélanger à de l'eau, du jus d'orange, du yaourt ou de la compote (pH < 5) : bien rincer la sonde, risque d'obstruction Préférez Inexium® ou Ogastoro®
			20 mg	gélule							
MOPRALPRO	oméprazole		20 mg	cp pelliculé							A administrer avant un repas, tel quel, avec de l'eau ou du jus de fruit ou dissous dans de l'eau Ne pas croquer , ni écraser : comprimé formé de microgranules gastrorésistants Évitez les boissons gazeuses et la prise simultanée de lait
MORPHINE SULF	sulfate de morphine		5 mg / ml	sirop							Peut être mélangé à des aliments semi-solides (purée, compote, yaourt, confiture) ou administré dans une sonde entérale : rinçage de la sonde avec 30 à 50 ml d'eau
MOSCONTIN LP	sulfate de morphine		10 mg	comprimé enrobé							A administrer au milieu du repas, en position assise Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez le sirop de sulfate de morphine ou les gélules de Skenan®LP à ouvrir mais sans écraser les microgranules : à mélanger avec de la purée, confiture ou compote ou possible par voie entérale dans des sondes ≥ 16 Fr, puis bien rincer avec 30 à 50 ml d'eau
			30 mg	comprimé enrobé							
			60 mg	comprimé enrobé							
			100 mg	comprimé enrobé							
			200 mg	comprimé enrobé							
MOSIL	midécamycine		400 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours des repas ou dans les 30 minutes qui précèdent
			800 mg	poudre orale							
MOTILIUM	dompéridone		1 mg / ml	poudre orale							A administrer avant un repas Ne pas croquer , ni écraser le comprimé pelliculé : préférez les granulés ou la poudre orale : 1 cuillère mesure = 1 ml = 2,5 mg Dégazez la solution pour la présentation effervescente
			10 mg	granulés effervescents							
			10 mg	cp pelliculé							
MOVICOL	macrogol + bicarbonate de sodium + chlorure de		0,565 g / 0,5 g / 23,3 mg / 175,4 mg	solution buvable							A administrer en une seule prise le matin A dissoudre dans un ½ verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MOVICOL	potassium + chlorure de sodium		13,125 g / 176,5 g / 46,6 mg / 350,7 mg	poudre orale							Conservation 24 h au réfrigérateur, dans un récipient fermé
MOVIPREP	vitamine C + macrogol 3350 + chlorure de potassium + ascorbate de sodium, + chlorure de sodium + sulfate de sodium		4,7g/100g/1,015g / 5,9g/2,691g/ 7,5g	poudre orale							La solution reconstituée doit être bue sur une période de 1 à 2 h : y ajouter la prise d'un litre de liquide non alcoolisé : eau, soupe claire, jus de fruit sans pulpe, thé et/ou café sans lait
MOXONIDINE	moxonidine		0,2 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer le matin et au début d'un repas
			0,4 mg	cp pelliculé		?	?		?		
MOXYDAR	oxyde d'aluminium + oxyde de magnésium + phosphate d'aluminium + gomme guar		500 mg / 500 mg / 300 mg / 200 mg	comprimé pour susp. buvable							A administrer dans un ½ verre d'eau, au moment des troubles et à distance d'un autre traitement
			500 mg / 500 mg / 300 mg / 200 mg	susp. buvable							
MSUD			130 ml	solution buvable							Boisson prête à l'emploi Traitement nutritionnel de la leucinose
MSUD AID III	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine		500 g (326kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml = 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de la leucinose chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte
MSUD ANALOG	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de la leucinose de la naissance à 1 an
MSUD ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments, prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de la leucinose de la naissance à 1 an et en supplémentation de 1 à 3 ans
MSUD ANAMIX JUNIOR	mélange d'AA sans leucine ni isoleucine ni valine ; enrichi en AG ω-3, vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		29 g	poudre orale et entérale							
MSUD COOLER	mélange d'AA sans leucine ni isoleucine ni valine ; enrichi en AG ω-3, vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		130 ml	solution buvable							Boisson prête à l'emploi - A administrer bien frais Conservation 24 heures - Peut être congelée Traitement nutritionnel de la leucinose dès 3 ans et chez l'adulte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MSUD EXPRESS NEUTRE	mélange d'AA sans leucine ni isoleucine ni valine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		25 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 sachet de poudre à 100 ml d'eau bien fraîche, bien agiter : administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de la leucinose dès 8 ans et chez l'adulte
MSUD GEL	mélange d'AA sans leucine ni isoleucine ni valine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		20 g	poudre orale et entérale 1 saveur + goût neutre							Mélangez 1 sachet de poudre à 30 ml d'eau bien fraîche, bien agiter = consistance d'entremet + ajoutez 100 ml d'eau pour une solution buvable - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de la leucinose entre 1 et 8 ans
MSUD MAXAMAID	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml = 1 volume de poudre pour 7 d'eau Traitement nutritionnel de la leucinose entre 1 et 8 ans
MSUD MAXAMUM			500 g (297kcal/100 g)	poudre orale et entérale 1 arôme + goût neutre							Mélangez 1 sachet de poudre à 30 ml d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 7 d'eau Traitement nutritionnel de la leucinose après 8 ans, chez l'adulte et la femme enceinte
MSUD 1 MIX MILUPA	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine, supplémenté en glucides et prébiotiques, enrichi en vitamines, minéraux et oligoéléments		1 000 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesure de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de la leucinose, de la naissance à 1 an
MSUD 2 PRIMA MILUPA	mélange d'AA sans leucine, isoleucine et valine, enrichi en vitamines, minéraux et oligoéléments		500 g* (288kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Traitement nutritionnel de la leucinose à partir de 1 an
MSUD 2 SECUNDA			500 g* (290kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Traitement nutritionnel de la leucinose à partir de 9 ans
MUCICLAR enfant nourrisson	carbocistéine		100 mg /5 ml	sirop							
MUCICLAR adulte	carbocistéine		750 mg /15 ml	sirop							
MUCINUM	séné + cascara + boldo + anis vert		30 mg / 40 mg / 50 mg / 30 mg	comprimé enrobé							A administrer le soir au coucher
MUCIPULGITE	attapulgite de Mormoiron + gomme guar		850 mg / 200 mg (5 ml)	granulés							A administrer au début d'un repas, avec un peu d'eau
MUCIVITAL	licsaphol		5 g	poudre orale							A administrer au cours d'un repas Préférez la poudre orale dissoute dans un grand verre

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MUCIVITAL	ispaghane		430 mg	gélule	■			?	?		d'eau, de lait ou de jus de fruit ou dans du yaourt : administration immédiate
MUCOLATOR	acétylcystéine		200 mg	granulés pour solution buvable							A diluer dans un verre d'eau, de lait ou de jus de fruit : administration immédiate
MUCOMYST	acétylcystéine		100 mg / 5 ml	susp. buvable							Mauvais goût : à administrer de préférence par sonde gastrique, à défaut dissoudre dans un jus de fruit ou un soda
			200 mg / 5 ml	susp. buvable							
			200 mg	poudre orale							
MUCOSPIRE	acétylcystéine		200 mg	poudre orale							A dissoudre dans un peu d'eau
MUCOTHIOL	diacétylcystéine		150 mg	poudre orale							Ne pas croquer , ni écraser le comprimé Préférez la poudre orale dissoute dans un peu d'eau
			200 mg	cp pelliculé							
MULKINE	montmorillon + gomme guar		0,85 g / 0,2 g (3,4 g)	granulés	■						A administrer au cours d'un repas
			600 g	granulés	■						
MULTAQ	dronédarone	®	400 mg	cp pelliculé	■ ■ ■						A administrer au moment des repas, tel quel, avec un verre d'eau Ne pas y associer la prise de jus de pamplemousse
MUPAX	hydroxyde d'aluminium + hydroxyde de magnésium		400 mg / 400 mg	cp à croquer ou à sucer	■						A administrer au moment des troubles
MUTESA	oxétacaine + oxyde d'aluminium + oxyde de magnésium		0,187g/3,8g/1,35g (100 g)	susp. buvable	■						A administrer au moment des troubles, puis absorbez un verre d'eau pour éviter l'anesthésie des muqueuses buccales et de la glotte (risque de fausse route)
MUXOL	ambroxol		3 mg / ml	solution buvable	■						Préférez la solution buvable
			30 mg	cp bisécable	■						
MYAMBUTOL	éthambutol	■	400 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer le matin à jeûn, mélangé à de la compote ou du yaourt. Attendre 30' avant la prise alimentaire
MYCOPHENOLATE MOFETIL	mycophénolate mofétil		250 mg	gélule							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la solution buvable de Cellcept®
			500 mg	cp pelliculé	■						femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
MYCOSTATINE	nystatine		100 000 UI (cuillère mesure)	susp. buvable	 						Suspension buvable peut également être utilisée en badigeonnage local intra buccal
			500 000 UI	comprimé enrobé	 						
MYFORTIC	acide mycophénolique		180 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas : faire toujours le même choix Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés gastrorésistants
			360 mg	cp pelliculé	 						
MYLERAN	busulfan		2 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : cytotoxique femme enceinte
MYNOCINE	minocycline		50 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas Gélules ouvrables mais ne pas écraser les microgranules
			100 mg	gélule							
MYOCHOLINE ATU	bétanécholine		10 mg	comprimé							Comprimés broyés à mélanger avec de l'eau : administration immédiate La solution buvable pédiatrique est en attente de commercialisation
			25 mg	cp sécable							
MYOPLEGE	thiocolchicoside		4 mg	gélule	 			?	?		A administrer avec un verre d'eau
MYOTONINE	bétanécholine		25 mg	comprimé		?	?		?		
MYSOLINE	primidone		250 mg	cp bisécable							
MYTELASE	ambénonium		10 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer pendant ou à la fin des repas
NABUCOX	nabumétone		500 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser le comprimé pelliculé Préférez le comprimé dispersible dissous dans un verre d'eau
			1 g	cp dispersible bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NABUTIL	lopéramide		2 mg	gélule	 						Préférez la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
NAEMIS	estradiol + nomégestrol		1,5 mg / -	comprimé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			1,5 mg / 3,75 mg	cp pelliculé							
NAFTIDROFURYL	naftidrofuryl		100 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas, toujours avec un grand verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir
			200 mg	cp pelliculé	 						
NAFTILUX	naftidrofuryl		200 mg	gélule							Ne pas croquer , ni écraser, mais ouverture possible : incorporer les microgranules dans un aliment semi liquide
NALGESIC	fénoprofène		300 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours du repas Goût désagréable, ne pas croquer : broyage possible si administration par sonde entérale
NALOREX	naltrexone		50 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		A administrer avec un grand verre d'eau
NALTREXONE	naltrexone		50 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
NAPROSYNE	naproxène		250 mg	comprimé							A administrer au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser : préférez la forme suppositoire à 500 mg
			500 mg	comprimé							
			750 mg	comprimé							
			1 g	comprimé							
NAPROXENE SODIQUE	naproxène		275 mg	comprimé							
			550 mg	cp pelliculé sécable							
NAPROXENE	naproxène		250 mg	comprimé							
			550 mg	comprimé							
NARAMIG	naratriptan		2,5 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer ni mâcher , ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	naratriptan		2,5 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
NARATRIPTAN	naratriptan		2,5 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
NARDELZINE ATU	phénelzine		15 mg	comprimé		?	?		?		
NARDIL ATU	phénelzine		15 mg	comprimé		?	?		?		
NATECAL VITAMINE D3	calcium + vitamine D ₃		600 mg / 400 UI	cp orodispersible							A administrer après les repas, les comprimés doivent être sucés
NATI K	tartrate de potassium		500 mg	comprimé							A administrer après un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser : comprimé gastro-résistant
NATULAN	procarbazine		50 mg	gélule							A administrer avec beaucoup d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir : cytotoxique  femme enceinte
NAUSETUM	cocculus indicus + nuxvomica + tabacum		0,708mg / 0,708mg / 0,708mg	cp sublingual							A administrer en dehors d'un repas Laissez fondre sous la langue
NAUSICALM	dimenhydrinate		15,7 mg / 5 ml	sirop							Préférez la forme sirop
			50 mg	gélule				?	?		
NAVELBINE	vinorelbine		20 mg	capsule molle	  					?	A administrer avec de l'eau, à la fin d'un repas ou d'une collation Ne pas croquer, ni mâcher, ni sucer, ni écraser : cytotoxique Ne pas mettre en contact avec la peau ou l'œil : lavage au sérum physiologique, à défaut avec de l'eau  femme enceinte
			30 mg	capsule molle	  						
NAVOBAN	tropisetron		5 mg	gélule	 			?	?		
NAXY	clarithromycine		25 mg / ml	susp. buvable							A administrer au cours des repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser les comprimés à libération modifiée Préférez les suspensions buvables diluées dans de l'eau
			50 mg / ml	susp. buvable							
			250 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			250 mg	cp pelliculé							Préférez les suspensions ou autres formes dans de l'eau ou du lait
			500 mg	cp pelliculé							
NEBILOX	nébivolol		5 mg	cp quadriséable	 	?	?		?		A administrer à heure fixe, avec de l'eau, avant au cours ou en dehors d'un repas
NEBIVOLOL	nébivolol		5 mg	cp quadriséable	 	?	?		?		
NEOCATE	mélange nutritionnel complet : 100 % d'AA libres, sans soja, haute teneur en vitamines et minéraux		400 g (67 kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement diététique des APLV, après échec des hydrolysats, de la naissance à 1 an
NEOCATE ADVANCE			50 g* (100kcal/100ml)	poudre orale et entérale 2 arômes + goût neutre							Mélangez 1 mesurette de 4,9 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement diététique des poly-allergies alimentaires, de 1 à 10 ans
			100 g* (100kcal/100ml)								
NEOCATE INFANT	mélange nutritionnel : 100 % d'AA libres, enrichi en AG polyinsaturés, petits polymères de glucose, vitamines et minéraux		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 8,2 g de poudre à 30 ml d'eau Traitement diététique des APLV, intolérances protéiques multiples, entéropathies, grêle court, dès la naissance
NEO-CODION nourrisson	grindélia + polygala + benzoate de sodium		0,6175g / 79,287g / 1,482g (100 ml)	sirop							Préférez les sirops
NEO-CODION enfant	codéine + benzoate de sodium		3,3 mg / 61,2 mg (5 ml)	sirop							
NEO-CODION adulte	codéine		0,1027 g (100 ml)	sirop							
	codéine + grindélia + sulfogaiacol		25mg / 20mg / 100mg	comprimé enrobé	 						
NEODEX ATU	dexaméthasone		40 mg	cp bisécable		?	?		?		
NEOMERCAZOLE	carbimazole		5 mg	comprimé sécable							A administrer au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser
			20 mg	comprimé sécable							femme enceinte
			100 mg / ml	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NEORAL	cyclosporine		100 mg / ml	solution buvable							<p>Possibilité de mâcher la capsule avec un grand verre d'eau</p> <p>Préférez la solution buvable : à diluer juste avant l'administration, dans un récipient en verre, avec du chocolat froid, du jus de fruit ou de l'eau gazeuse</p> <p>Ne pas associer à la prise de jus de pamplemousse</p> <p> femme enceinte</p>
			10 mg	capsule molle							
			25 mg	capsule molle							
			50 mg	capsule molle							
			100 mg	capsule molle							
NEOSTIGMINE ATU	néostigmine		15 mg	comprimé						?	A avaler tel quel avec un grand verre d'eau
NERVIFENE ATU	chloral		100 mg / ml	solution buvable							
NESTLE CROISSANCE CEREALES CACAO	préparation de suite : apport optimisé en acides gras essentiels et en fer		500 ml (79 kcal/100 ml)	solution buvable							Solution prête à l'emploi, en relais du lait 2 ^{ème} âge jusqu'à 3 ans
NESTLE CROISSANCE DECOUVERTE	préparation lactée de suite : apport modéré en protéines ; enrichie en vitamines, fer, iode, phospholipides		500 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							Solution prête à l'emploi, à partir de 20 mois
			1 000 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							
NESTLE CROISSANCE PROTECTION	préparation lactée de suite : apport modéré en protéines ; enrichie en vitamines, fer, zinc, sélénium, oligoéléments, AG essentiels		500 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							Solution prête à l'emploi, en relais du lait 2 ^{ème} âge, dès 10 mois
			1 000 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							
NESTLE CROISSANCE VITALITE	préparation lactée de suite : apport modéré en protéines ; enrichie en vitamines, fer, magnésium, AG essentiels		500 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							Solution prête à l'emploi, à partir de 30 mois
			1 000 ml (70 kcal/100 ml)	solution buvable							
NESTLE JUNIOR DRINK	farine de blé, sucre, huiles végétales, extrait de vanille, vitamines		375 g (410 kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 2 à 3 cuillères à soupe pleines de poudre à 200-250ml de lait tiède ou froid A partir de 12 mois
NFSVITAL	protéines de lait,		20 g (75 kcal)	poudre orale et entérale goût neutre							Mélangez à froid, en agitant avec une fourchette, 1 sachet ou 3 mesurette de poudre à 200 ml maximum

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	hypocaloriques		800 g (375 kcal / 100g)	poudre orale et entérale goût neutre							d'aliments salés ou sucrés : entremets, yaourts, fromage blanc, flans, gratins ...
NESVITAL MINCEUR	boisson hypocalorique, hyperprotidique		375 ml (285 kcal)	solution buvable 4 arômes							
NEULEPTIL	périciazine		10 mg / ml	solution buvable							Ne pas écraser le comprimé ou ouvrir la gélule : très photosensibles Préférez les solutions buvables : 1 gélule à 10 mg ↔ XL gouttes à 1 % 1 comprimé à 25 mg ↔ XXV gouttes à 4 %
			40 mg / ml	solution buvable							
			10 mg	gélule							
			25 mg	cp bisécable							
NEUROFLORINE	passiflore + valériane + aubépine		50mg/80mg/10mg	comprimé enrobé		?	?		?		
NEURONTIN ATU pour la solution buvable	gabapentine		250 mg / 5 ml	solution buvable							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre de liquide Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir Préferer la solution buvable
			100 mg	gélule							
			300 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
			600 mg	comprimé							
			800 mg	comprimé							
NEUTROSES	carbonate de calcium + carbonate de magnésium + trisilicate de magnésium + silicate d'aluminium		160mg/114mg/20mg/30mg	cp à croquer							A administrer après un repas ou au moment des troubles
NEXAVAR	sorafénib		200 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau, en dehors d'un repas (1 h avant ou 2 h après) ou lors d'un repas pauvre en graisses femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NEXEN	nimésulide		100 mg	granulés pour solution buvable							A administrer avec un grand verre d'eau, à la fin des repas Ne pas croquer , ni écraser le comprimé : préférez les granulés dissous dans un grand verre d'eau : administration immédiate
			100 mg	comprimé							femme enceinte
NIASPAN LP	acide nicotinique		375 mg	comprimé							A administrer au coucher, après une collation pauvre en graisses (pomme, yaourt allégé, tranche de pain) Ne pas croquer, ni mâcher , ni casser, ni écraser : comprimés à libération prolongée
			500 mg	comprimé							
			750 mg	comprimé							
			1 000 mg	comprimé							
NICERGOLINE	nicergoline		5 mg	gélule				?	?		A administrer avec un 1/2 verre d'eau, avant les trois principaux repas
			10 mg	gélule				?	?		
NICOBION	vitamine PP		500 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer : goût amer : broyage possible si administration par sonde entérale
NICORANDIL	nicorandil		10 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau
			20 mg	comprimé		?	?		?		
NIDAL AR 1	aliments lactés de régime, épaissis aux amidons de maïs et pomme de terre		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate En cas de régurgitations, jusqu'à 4 mois révolus
NIDAL AR 2			400 g* (71 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 5 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate En cas de régurgitations, du 5^e mois à 1 an
NIDAL CONFORT 1		préparations lactées à apport protéique réduit et optimisé,		900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NIDAL CONFORT 2	formule épaissie : amidons de maïs et de pomme de terre		900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum Prise en charge des remontées physiologiques banales de lait, à partir du 6 ^e mois jusqu'à 1 an
NIDAL CROISSANCE + 10	préparations lactées de suite		500 ml (70 kcal / 100 ml)	solution buvable							Solution prête à boire chaude ou froide ou utilisée dans les préparations lactées sucrées, dès l'âge de 10 mois
			1 000 ml (70 kcal / 100 ml)	solution buvable							
NIDAL CROISSANCE + 20			1 000 ml (70 kcal / 100 ml)	solution buvable							Solution prête à boire chaude ou froide ou utilisée dans les préparations lactées sucrées, dès l'âge de 20 mois
NIDAL CROISSANCE + 30			1 000 ml (70 kcal / 100 ml)	solution buvable							Solution prête à boire chaude ou froide ou utilisée dans les préparations lactées sucrées, dès l'âge de 30 mois
NIDAL EXCEL HA 1	laits hypoallergéniques, enrichis en AG polyinsaturés à chaînes longues		900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate Pour les nourrissons aux antécédents familiaux allergiques, de la naissance jusqu'à 5 mois révolus
NIDAL EXCEL HA 2			900 g* (72 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,9 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate Pour les nourrissons aux antécédents familiaux allergiques, de 6 mois à 1 an
NIDAL NATEA 1	préparation lactée pour nourrisson, enrichie en AG polyinsaturés à chaînes longues et bifidus		900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate Alimentation du nourrisson de la naissance à 6 mois
NIDAL NATEA 2	préparation lactée de suite, enrichie en AG polyinsaturés à chaînes longues et bifidus		900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate Alimentation du nourrisson de 6 mois à 1 an
NIDAL NOVAIA 1	préparation lactée pour nourrisson à haut rendement protéique		500 ml (67 kcal / 100 ml)	solution buvable							Solution prête à l'emploi chaude ou froide Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate Alimentation du nourrisson de la naissance à 6 mois
			900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							
NIDAL NOVAIA 2	préparation lactée de suite : protéines à assimilation optimisée		500 ml (67 kcal / 100 ml)	solution buvable							Solution prête à l'emploi chaude ou froide Mélangez 1 mesurette de 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate Alimentation du nourrisson de 6 mois à 1 an, en relais ou complément de l'allaitement maternel
			900 g* (67 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NIDAL PELARGON 1	préparations lactées enrichies en ferments lactiques, pauvres en lactose		900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate En cas de ballonnements, de la naissance à 6 mois
NIDAL PELARGON 2			900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau minérale ou de source, à 40°C maximum, bien agiter : administration immédiate En cas de ballonnements, de 6 mois à 1 an
NIDREL	nitrendipine		10 mg	comprimé		?	?		?		A administrer avant le repas Taux sériques modifiés par le jus de pamplemousse
			20 mg	comprimé		?	?		?		
NIFEDIPINE PH pour la solution sublinguale ATU pour la solution buvable	nifédipine		7,5 mg / 3 ml	solution sublinguale							Ne pas croquer, ni rompre, ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la solution buvable ou la sublinguale : photosensible = administration immédiate Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			20 mg / ml	solution buvable							
			20 mg	comprimé							
			30 mg	comprimé							
NIFLURIL	acide niflumique		250 mg	gélule						A administrer au cours des repas Goût amer : ouverture possible si administration par sonde entérale Forme suppositoire à 400 et 700 mg	
NIFUROXAZIDE	nifuroxazide		40 mg / ml	susp. buvable							Préférez la suspension buvable
			200 mg	gélule							
NILEVAR	noréthandrolone		10 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
NIMODIPIN ATU	nimodipine		30 mg	cp pelliculé							Dégazez la solution effervescente : photosensible = administration immédiate Ne pas y associer la prise de pamplemousse
NIMOTOP ATU pour les granulés	nimodipine		30 mg	granulés effervescents							
			30 mg	cp pelliculé							
NIOUITIN mentholé sans sucre	nicotine cationisée		2 mg	comprimé à sucer							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NIQUITINMINIS sans sucre	carboxylate		4 mg	comprimé à sucer							Ne pas croquer, ni écraser, ni avaler Laissez dissoudre dans la bouche, en déplaçant le comprimé d'un côté à l'autre, jusqu'à dissolution complète (20 à 30 minutes) Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni avaler
NIQUITINMINIS sans sucre	nicotine cationrésine carboxylate		1,5 mg	comprimé à sucer							
			4 mg	comprimé à sucer							
NIQUITINMINIS cerise sans sucre	nicotine résinate		1,5 mg	comprimé à sucer							
NISIS	valsartan		40 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer en une seule prise, le matin à jeun ou au cours d'un repas (mais toujours dans les mêmes conditions)
			80 mg	cp pelliculé							
			160 mg	cp pelliculé							
NISISCO	valsartan + hydrochlorothiazide		80mg / 12,5mg	cp pelliculé							femme enceinte
			160mg / 12,5mg	cp pelliculé							
			160mg / 25mg	cp pelliculé							
NITRENDIPINE	nitrendipine		10 mg	comprimé		?	?		?		Taux sériques modifiés par le jus de pamplemousse
			20 mg	cp bisécable		?	?		?		
NITROFURANTOINE ATU	nitrofurantoïne		5 mg / ml	solution buvable							
NIVAQUINE	chloroquine		25 mg (cuillère mesure)	poudre pour sirop							A administrer après un repas (réduire les nausées) le matin ou le midi (troubles du sommeil) Prise de nourriture facilite l'absorption et augmente la biodisponibilité Goût très amer des comprimés : broyage possible si administration par sonde entérale : préférez le sirop
			100 mg	cp bisécable							
			300 mg	cp pelliculé							
NIZAXID	nizatidine		150 mg	gélule				?	?		
			300 mg	gélule				?	?		
NIZORAL ATU	kétoconazole		200 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours des repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NIZORAL ATC	ketocanazole		200 mg	sécable							A administrer au cours des repas
NOCERTONE	oxétorone		60 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer avec un verre d'eau, au cours du repas du soir et au coucher
NOCTAMIDE	lormétazépan		1 mg	cp bisécable							A administrer avant le coucher, avec un verre d'eau Principe actif très amer : broyage possible si administration par sonde entérale : administration immédiate
			2 mg	cp bisécable							
NOCTRAN	clorazébate + acépromazine + acétoprométazine		10 mg / 0,75mg / 7,5mg	cp multicouche bisécable							A administrer avec un verre d'eau, immédiatement avant le coucher Ne pas croquer, ni écraser : comprimé triple couche
NOCTYL	doxylamine		15 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer en une seule prise, avec un peu d'eau 15 à 30 minutes avant le coucher Comprimés broyés peuvent être mélangés à du yaourt ou des aliments plutôt sucrés
NODEX	dextrométhorpane		25 mg / 10 ml	sirop							A administrer au moment des troubles
NOLVADEX	tamoxifène		10 mg	cp pelliculé							A administrer avec un aliment si irritation gênante Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
			20 mg	comprimé enrobé							
NOMEGESTROL	nomégestrol		5 mg	cp bisécable							A avaler avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
NOOTROPYL	piracétam		1,2 g (6 ml)	ampoule buvable							Préférez les formes buvables Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : préférez les formes buvables diluées dans un peu d'eau
			200 mg / ml	solution buvable							
			800 mg	cp pelliculé							
NOPRON	niaprazine		15 mg / 5 ml	sirop						Utilisez la seringue doseuse	
NORAVID ATU	défibrotide		400 mg	gélule							
			7,5 mg	cp bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NORDAZ	nordazépam		7,5 mg	cp bisécable		.	.		.		
			15 mg	cp quadrisécable		?	?		?		
NORFLOXACINE	norfloxacin		400 mg	cp pelliculé							A administrer avec un grand verre d'eau Evitez la prise simultanée de lait ou de produits laitiers
NORLEVO	lévonorgestrel		1,5 mg	comprimé							A administrer avec un verre d'eau Si broyage : attention de ne pas perdre de produit actif
NORMACOL			10 g	granulés							
NORMISON	témazépam		10 mg	comprimé		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau, en une seule prise juste avant le coucher
			20 mg	comprimé		?	?		?		
NORMIX ATU	rifaximine		200 mg	cp pelliculé		?	?		?		
NOROXINE	norfloxacin		400 mg	comprimé enrobé							A administrer pendant les repas, avec un grand verre d'eau Evitez la prise simultanée de lait ou de produits laitiers
NORPROLAC	quinagolide		25 µg	comprimé							A administrer en une seule prise au coucher, avec une légère collation
			50 µg	comprimé							
			75 µg	comprimé							
			150 µg	comprimé							
											

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NORSET	mirtazapine		15 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas, de préférence le soir, avec ou sans eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : préférez la solution buvable diluée avec un peu d'eau
			15 mg / ml	solution buvable							
NORTRILEN ATU	nortriptyline		25 mg	comprimé							
NORTUSSINE enfant	dextrométhorphan + mépyramine + guaifénésine		5 mg / 5 mg / 20 mg (5 ml)	sirop							
NORTUSSINE adulte	dextrométhorphan + mépyramine		10 mg / 10 mg (5 ml)	sirop							
NORVIR	ritonavir		80mg/ml	solution buvable	 						A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer , ni écraser : préférez la solution buvable diluée dans du lait chocolaté pour atténuer le goût amer Ne pas diluer dans de l'eau  femme enceinte
			100 mg	cp pelliculé	  						
NOTEZINE	diéthylcarbamazine		100 mg	cp bisécable	 						
NOTGAZ enfant	<i>bleue</i> : charbon activé + siméticone		70 mg / 22,5 mg	gélule							Administrez les 2 gélules simultanément, au début d'un repas Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir : gélule bleue gastro-soluble, rouge gastrorésistante
	<i>rouge</i> : charbon activé + siméticone		70 mg / 22,5 mg	gélule							
NOTGAZ adulte	<i>bleue</i> : charbon activé + siméticone		140 mg / 45 mg	gélule							Administrez les 2 gélules simultanément, avant ou après un repas Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir : gélule bleue gastro-soluble, rouge gastrorésistante
	<i>rouge</i> : charbon activé + siméticone		140 mg / 45 mg	gélule							
NOTRINO	L-cystine + soufre + vit A + saccharomyces cerevisiae		72,6mg/22mg/3,3mg/77,4mg	gélule							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Préférez la suspension buvable dissoute dans un liquide froid
			36,3mg/11mg/2mg/38,7mg	susp. buvable							
NOVACETOL	acide acétylsalicylique + codéine + paracétamol		300mg/10mg/250mg	comprimé							
NOVALAC 1 ^{er} âge	préparation lactée pour nourrisson		400 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nouveaux-nés non allaités ou au moment du sevrage, jusqu'à 5 mois
			900 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NOVALAC 2 ^e âge	préparation lactée de suite		400 g* (64,2kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les nourrissons au moment du sevrage, de 6 mois à 1 an
			900 g* (64,2kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC AC 1 ^{er} âge	préparation lactée pour nourrisson, 2/3 du lactose remplacés par maltodextrines		400 g* (65,4kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de ballonnements ou de flatulences, jusqu'à 6 mois
			900 g* (65,4kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC AC 2 ^e âge	préparation lactée de suite, 2/3 du lactose remplacés par maltodextrines		400 g* (62,8kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de ballonnements ou de flatulences, de 6 mois à 1 an
			900 g* (62,6kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC ALLERNOVA	préparation lactée aux hydrolysats de protéines		400 g* (61,7kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas d'APLV, chez le nourrisson et l'enfant en bas âge
NOVALAC ALLERNOVA AR	hydrolysat extensif à base de caséine, épaissi avec un amidon de maïs		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les enfants ayant de nombreuses régurgitations
NOVALAC AR 1 ^{er} âge	préparation lactée pour nourrisson épaissie à l'amidon de maïs		400 g* (65,8kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de régurgitations peu fréquentes, jusqu'à 6 mois
			800 g* (65,8kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC AR 2 ^e âge	préparation lactée de suite épaissie à l'amidon de maïs		400 g* (64,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée En cas de régurgitations peu fréquentes, de 6 mois à 1 an
			800 g* (64,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC AR DIGEST	préparation lactée épaissie (amidon + caroube), pauvre en lactose et amylose		800 g* (63,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Aliment diététique en cas de régurgitations fréquentes, entre 0 et 12 mois
NOVALAC CEREALES diastasée	formule sans gluten, sans saccharose ajouté		379 kcal / 100 g	poudre orale et entérale							A préparer avec le lait 1 ^{er} ou 2 ^e âge habituel Dès 4 mois
NOVALAC CEREALES HA	repas lacté complet sans gluten, sans saccharose ajouté, enrichi en AG ω-3 et 6		453 kcal / 100 g	poudre orale et entérale							A préparer avec le lait 1 ^{er} ou 2 ^e âge habituel En cas de risque d'allergies, dès 4 mois
NOVALAC CEREALES riz carottes	formule sans gluten, sans saccharose ajouté		379 kcal / 100 g	poudre orale et entérale							A préparer avec le lait 1 ^{er} ou 2 ^e âge habituel Dès 4 mois, après un épisode de diarrhée

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NOVALAC CEREALES et fruits	formule sans gluten, sans saccharose ajouté, enrichie en fruits et prébiotiques		379 kcal / 100 g	poudre orale et entérale							A préparer avec le lait 1 ^{er} ou 2 ^e âge habituel Dès 4 mois, facilite le transit
NOVALAC lactée biscuitée	repas lacté complet avec gluten, sans saccharose ajouté, enrichi en AG ω -3 et 6		453 kcal / 100 g	poudre orale et entérale							A préparer avec de l'eau Dès 6 mois
NOVALAC CROISSANCE	lait de croissance enrichi en calcium, AG ω -3 et 6		800 g* (58,9kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette avec 30 ml d'eau faiblement minéralisée, à administrer chaud ou froid ou mélangé à des desserts lactés A partir de 12 mois, avant le passage au lait de vache
NOVALAC DIARINOVA	aliment de régime énergétique : monosaccharides, TCL, maltodextrines, amidon		450 g* (62 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,1 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée, bien agiter avant administration Lait de substitution transitoire en cas de diarrhée ± associé à Hydranova
NOVALAC HYDRANOVA	solution de réhydratation orale : sels minéraux + glucides		6,5 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 sachet de 6,5 g de poudre à 200 ml d'eau
NOVALAC HYPOAALERGENIQUE 1 ^{er} âge	préparation lactée pour nourrisson sans caséine, 100 % des protéines hydrolysées		400 g* (71,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour réduire le risque d'allergies, jusqu'à 6 mois
			800 g* (71,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC HYPOAALERGENIQUE 2 ^e âge	préparation lactée de suite sans caséine, 100 % des protéines hydrolysées		400 g* (61,9kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour réduire le risque d'allergies, chez le nourrisson de plus de 6 mois
			800 g* (61,9kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC MULTICEREALES	mélange d'avoine, blé et maïs		200 g	poudre orale et entérale							A préparer avec le lait 2 ^e âge habituel Pour les bébés gros mangeurs, dès 6 mois
NOVALAC SATIETE 1 ^{er} âge	préparation lactée pour nourrisson normo calorique ; enrichie en maltodextrines, amidon, caséine et TCL		400 g* (67,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les bébés gros mangeurs, jusqu'à 6 mois
			800 g* (67,1kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC SATIETE 2 ^e âge	préparation lactée de suite normocalorique ; enrichie en maltodextrines , amidon, caséine et TCL		400 g* (65,2kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau tiède faiblement minéralisée Pour les bébés gros mangeurs, dès 6 mois
			800 g* (65,2kcal/100ml)	poudre orale et entérale							
NOVALAC TRANSIT 1 ^{er} âge	préparation lactée pour nourrisson ; enrichie en lactose, magnésium		400 g* (70,7kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée En cas de constipation, jusqu'à 6 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NOVALAC TRANSIT 2 ^e âge	préparation lactée de suite ; enrichie en lactose, magnésium		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 4,6 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée En cas de constipation, de 6 mois à 1 an
NOVALGIC	krill OLA ³⁰ + huile de colza		300 mg	capsule molle							A administrer de préférence le matin Ne pas administrer à des patients allergiques aux crustacés
NOVASOURCE DIABET PLUS	mélange ternaire polymérique isocalorique, hyperprotidique, enrichi en gomme guar, index glycémique bas : 33		500 ml (600 kcal)	bouteille arôme vanille							Mélanges de nutrition entérale, à administrer par voie orale ou par sonde : dans ce cas utiliser de préférence avec un régulateur de débit
NOVASOURCE GI CONTROL	mélange ternaire polymérique isocalorique normoprotidique, enrichi en gomme guar		500 ml (550 kcal)	SmartFlex goût neutre							
NOVASOURCE GI FORTE	mélange ternaire polymérique hypercalorique, isoprotidique, enrichi en gomme guar		500 ml (775 kcal)	SmartFlex							
			1 000 ml (1 550 kcal)	SmartFlex							
NOVASOURCE GI JUNIOR	mélange ternaire polymérique isocalorique, isoprotidique, pauvre en lactose, enrichi en fibres		250 ml (250 kcal)	bouteille goût neutre							
NOVATREX	méthotrexate		2,5 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
NOVOFEMME	estradiol + noréthistérone		1 mg / 1 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
NOVONORM	répaglinide		0,5 mg	comprimé							A administrer avec de l'eau, 15 à 30 minutes avant les repas
			1 mg	comprimé							
			2 mg	comprimé							
NOXAFIL	posaconazole		40 mg / ml	susp. buvable	 						A administrer au cours d'un repas
			40 mg / ml	solution buvable							Préférez la solution buvable
			2 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NOZINAN	lévopromazine		25 mg	cp pelliculé sécable							Ne pas écraser les comprimés car principe actif photosensible +++
			100 mg	cp pelliculé sécable							
NUCTALON	estazolam		2 mg	comprimé		?	?		?		
NUREFLEX enfant	ibuprofène		20 mg / ml	susp. buvable							<p>A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser les comprimés Préférer les suspensions buvables dissoutes dans un ½ verre d'eau ou la suspension buvable pédiatrique : utilisez la seringue graduée pour administration orale de la suspension buvable uniquement en pédiatrie</p> <p> femme enceinte</p>
NUREFLEX	ibuprofène		200 mg	comprimé enrobé							
			400 mg	comprimé							
NUREFLEX LP	ibuprofène		300 mg	gélule							
NUROFEN	ibuprofène		200 mg	capsule molle							
			200 mg	comprimé enrobé							
			400 mg	comprimé enrobé							
NUROFENFLASH	ibuprofène		200 mg	cp pelliculé							
			400 mg	cp pelliculé							
			400 mg sachet	poudre orale							
NUROFENFEM	ibuprofène		400 mg	cp pelliculé							
NUROFENPRO enfant sans sucre	ibuprofène		20 mg / ml	susp. buvable							
NUROFEN RHUME	ibuprofène + pseudoéphédrine		200mg/30mg	comprimé							
NUROFEN TABS	ibuprofène		200mg	cp orodispersible							
NUROFLASH	ibuprofène		200mg	cp pelliculé							
NI/III IS	<i>poudre épaississante</i>		9 g	poudre orale goût neutre							

Se mélange facilement à de l'eau, du thé ou du lait

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	poudre épaississante		225 g	poudre orale goût neutre							Se mélanger facilement à de l'eau, du lait, ou du lait
NUTRA'CREME	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		300 kcal / 200 ml	solution buvable 5 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
NUTRAMIGEN AA	caséine hydrolysée, amidon de tapioca, huile de maïs, saccharose ; enrichie en vitamines, minéraux et Lipil		454 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Indiqué si allergies sévères aux protéines ou aux hydrolysats du lait de vache, intolérances alimentaires multiples
NUTRAMIGEN 1 LGG	mélange de protéines hydrolysées hypo-allergéniques, polymères de glucose et amidon de maïs, lipides d'origine végétale ; enrichi en vitamines et sels minéraux et Lipil		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette rase à 30 ml d'eau Aliment de régime pour les nourrissons jusqu'à 5 mois si APLV, intolérance au lactose et au saccharose ou galactosémie congénitale
NUTRAMIGEN 2 LGG	mélange de protéines hydrolysées hypo-allergéniques, polymères de glucose et amidon de maïs, lipides d'origine végétale ; enrichi en vitamines et sels minéraux et Lipil		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez une mesurette rase à 30 ml d'eau Aliment complet équilibré de substitution au lait pour les nourrissons à partir de 6 mois si APLV, intolérance au lactose et au saccharose ou galactosémie congénitale
NUTRA'POTE	complément alimentaire oral hyperprotidique		300 kcal / 200 ml	compote 4 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
NUTRA'POTE 300	complément alimentaire oral hypercalorique		200 kcal / 200 g	flan 4 saveurs							
NUTRIBEN 1	préparation lactée standard pour nourrisson		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie
			900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							En cas d'allaitement impossible ou en relais de l'allaitement maternel, de la naissance à 6 mois
NUTRIBEN 2	préparation lactée standard de suite		400 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie
			900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							En relais de l'allaitement maternel, de 6 mois à 1 an
NUTRIBEN AC	lait infantile		400 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dosette de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie
			900 g (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Pour réduire les coliques, dès la naissance
NUTRIBEN APLV	aliment diététique complet contenant un hydrolysat de protéines		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de 4,3 g de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie En cas d'APLV
NUTRIBEN AR 1	préparation lactée pour nourrisson, enrichie en caroube et oligosaccharides		900 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie En cas de régurgitations, de 6 mois à 1 an

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NUTRIBEN AR 2	préparation lactée de suite, enrichie en caroube et oligosaccharides		900 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie En cas de régurgitations, de 6 mois à 1 an
NUTRIBEN CROISSANCE	préparation lactée standard de croissance, enrichie en taurine		900 g* (74 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de 5,5 g de poudre à 240 ml d'eau peu minéralisée tiédie Pour les nourrissons de 1 à 3 ans
NUTRIBEN HA	préparation lactée pour nourrisson : 100 % des protéines partiellement hydrolysées		400 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie Dès la naissance pour réduire les risques allergiques
NUTRIBEN SANS LACTOSE	préparation lactée pour nourrisson sans lactose		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de 4,2 g de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie Aliment diététique dès la naissance, lors de gastro-entérites
NUTRIBEN SYMBIOTIQUE 2	préparation lactée standard de suite		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie En relais de l'allaitement maternel et si flore intestinale fragilisée, de 6 mois à 1 an
NUTRIBEN TRANSIT 1	préparation lactée pour nourrisson contenant de l'acide palmitique		900 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie En cas de transit ralenti ou de constipation, de la naissance à 6 mois
NUTRIBEN TRANSIT 2	préparation lactée de suite contenant de l'acide palmitique		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie En cas de transit ralenti ou de constipation, de 6 mois à 1 an
NUTRICIA 1 ^{er} Age	préparation lactée pour nourrisson		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau destiné aux nouveaux-nés dont les mamans qui ne désirent pas allaiter ou au moment du sevrage, jusqu'à 4 mois
NUTRICIA 2 ^e Age	préparation lactée de suite		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour les nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage, de 5 mois à 1 an
			1 000 ml	solution buvable							
NUTRICIA 3	lait de suite apauvri en protéines de lait de vache, épaissi avec de l'amidon, goût vanille		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Lait de relais destiné aux enfants de 7 mois à 1 an
NUTRICIA BONNE NUIT	préparation lactée de suite, épaissie : flocons de riz et de pomme de terre		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Favorise la satiété et l'endormissement
NUTRICIA CONFORT PLUS 2 ^e Age	enrichi en amidon et en fibres solubles en prébiotiques		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour les nourrissons constipés, à partir de 6 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NUTRICIA CROISSANCE	lait de croissance enrichi en vitamines, fer et AG essentiels		900 g (485 kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau A partir de 10 mois
			1 000 ml	solution buvable							
NUTRICIA CROISSANCE KID	Lait de croissance enrichi en fer		1 000 ml	solution buvable							Préparation prête à l'emploi, à partir de 2 ans
NUTRICIA SOJA 2	lait de soja épaissi, sans lactose ni protéines de lait		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Destiné aux nourrissons qui n'ont pas été allaités ou au moment du sevrage, de 5 mois à 1 an, en cas d'APLV
NUTRINI	mélange ternaire polymérique isocalorique		500 ml (500 kcal)	flexibag							Mélange de nutrition entérale, adapté à l'enfant de 1 à 6 ans, ou d'un poids compris entre 8 et 20 kg A administrer de préférence avec un régulateur de débit
NUTRINI DRINK	complément alimentaire oral hypercalorique		200 ml (300kcal/100 ml)	solution buvable 1 saveur							Solutions de nutrition orale prêtes à l'emploi, pour les enfants dès 1 an
NUTRINI DRINK MULTI FIBRE	complément alimentaire oral hypercalorique, enrichi en fibres		200 ml (300kcal/100 ml)	solution buvable 4 saveurs							
NUTRINI ENERGY	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique		500 ml (750kcal)	pack souple							Mélanges de nutrition entérale, adaptés à l'enfant de 1 à 6 ans, ou d'un poids compris entre 8 et 20 kg A administrer de préférence avec un régulateur de débit
NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres		500 ml (750kcal)	pack souple							
NUTRINI MAX	mélange ternaire polymérique isocalorique		500 ml (500kcal)	pack souple							
NUTRINI MAX ENERGY	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique,		500 ml (750kcal)	pack souple							
NUTRINI MAX ENERGY MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres		500 ml (750kcal)	pack souple							Mélanges de nutrition entérale, adaptés à l'enfant de 7 à 12 ans ou d'un poids compris entre 21 et 45 kg A administrer de préférence avec un régulateur de débit
NUTRINI MAX MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique isocalorique, enrichi en fibres		500 ml (500kcal)	pack souple							Mélange de nutrition entérale, adapté à l'enfant de 1 à 6 ans, ou d'un poids compris entre 8 et 20 kg A administrer de préférence avec un régulateur de débit
NUTRINI MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique isocalorique, enrichi en fibres		500 ml (500kcal)	pack souple							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
NUTRINI PEPTISORB	mélange semi-élémentaire isocalorique, enrichi en TCM		500 ml (500 kcal)	pack souple							Mélange de nutrition entérale, adapté à l'enfant de 1 à 6 ans, présentant une dénutrition associée à un syndrome de malabsorption digestive A administrer de préférence avec un régulateur de débit
NUTRI SANTE MULTIVITAMINES OLIGOELEMENTS	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + B ₈ + B ₉ + magnésium + zinc + fer + cuivre + manganèse + molybdène		400µg/1,4mg/1,6mg/6mg/2mg/0,001mg/18mg 120mg/0,005mg/0,15mg/0,2mg/45mg/3,75mg/3,5mg/0,5mg/1,8mg/0,075mg	cp effervescent							Dégazez la solution
NUTRISON 1.0	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique		500 ml (500 kcal)	pack souple							
			1 000 ml (1 000 kcal)	pack souple							
			1 500 ml (1 500 kcal)	pack souple							
NUTRISON 1.0 MULTIFIBRE	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (500 kcal)	pack souple							
			1 000 ml (1 000 kcal)	pack souple							
			1 500 ml (1 500 kcal)	pack souple							
NUTRISON ADVANCED CUBISON	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		1 000 ml (1 000 kcal)	pack souple							
NUTRISON ADVANCED DIASON	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		1 000 ml (1 000 kcal)	pack souple							
NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	mélange semi-élémentaire isocalorique, normoprotidique		500 ml (500 kcal)	pack souple							
			1 000 ml (1 000 kcal)	pack souple							
NUTRISON ENERGY	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique		500 ml (750kcal)	pack souple							Mélanges de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 500 kcal)	pack souple							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	hyperprotidique		1 500 ml (2 250 kcal)	pack souple							
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique hypercalorique normoprotidique enrichi en fibres		500 ml (750kcal)	pack souple							
			1 000 ml (1 500 kcal)	pack souple							
NUTRISON LOW ENERGY MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique hypocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		1 000 ml (750 kcal)	pack souple							
NUTRISON PRE	mélange ternaire polymérique hypocalorique, normoprotidique		1 000 ml (500 kcal)	pack souple							
NUTRISON PROTEIN PLUS	mélange ternaire polymérique hypercalorique hyperprotidique, sans résidu		500 ml (625kcal)	pack souple							
			1 000 ml (1 250kcal)	pack souple							
NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres		500 ml (625kcal)	pack souple							
			1 000 ml (1 250kcal)	pack souple							
ODDIBIL	fumeterre		250 mg	comprimé enrobé							A administrer avant un repas et le soir au coucher
ODRIK	trandolapril		0,5 mg	gélule				?	?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec un 1/2 à 1 verre d'eau femme enceinte
			2 mg	gélule				?	?		
			4 mg	gélule				?	?		
OFLOCET	ofloxacin		200 mg	cp pelliculé bisécable							
OFLOXACINE	ofloxacin		200 mg	cp pelliculé bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OGAST	lansoprazole		15 mg	gélule							A administrer au moins 30 minutes avant un repas, à avaler entier avec un liquide Ne pas croquer , ni écraser Gélules ouvrables mais ne pas écraser les microgranules gastrorésistants, les mélanger à 40 ml d'eau, de jus de pomme ou de tomate ou un aliment non solide (yaourt, compote de pomme) : administration immédiate
			30 mg	gélule							
OGASTORO	lansoprazole		15 mg	cp orodispersible							A administrer au moins 30 minutes avant un repas, à avaler entier avec un verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser (microgranules gastrorésistants) Comprimé dispersible dans une seringue (piston enlevé) + 10 ml d'eau et 1 ml d'air : bien agiter après repose du piston et avant d'instiller dans une sonde entérale
			30 mg	cp orodispersible							
OKIMUS	quinine + aubépine		80 mg / 60 mg	comprimé enrobé							
OLANZAPINE	olanzapine		5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Comprimés enrobés : ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Comprimés orodispersibles (friables) doivent être placés dans la bouche immédiatement après l'ouverture de la plaquette : dissolution rapide dans la salive. Peuvent être dissouts dans un grand verre d'eau ou de jus d'orange ou de pomme, lait ou café immédiatement avant administration Bio-équivalence entre les comprimés orodispersibles et les comprimés pédiculés
			5 mg	cp orodispersible							
			7,5 mg	cp pelliculé							
			10 mg	cp pelliculé							
			10 mg	cp orodispersible							
			20 mg	cp orodispersible							
OLIGOBION	cuivre		0,5 mg / ml	solution buvable							A administrer le matin à jeun, diluée dans un verre d'eau femme enceinte : pour le lithium
	lithium		5 mg / ml	solution buvable							
	magnésium		30 mg / ml	solution buvable							
OLIGOCURE	manganèse + cuivre + or colloïdal		92,5µg/105µg/15µg (5 ml)	solution buvable							A administrer le matin à jeun ou loin des repas Gardez la solution sous la langue 1 à 2 minutes avant de l'avalier

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OLIGOGRANUL	cobalt		0,1 mg	cp sublingual							A administrer le matin à jeun ou à distance des repas Laissez fondre sous la langue sans croquer
	cuivre+ or + argent		0,1mg/0,01254mg/0,00056mg	cp sublingual							
	cuivre		0,1 mg	cp sublingual							
	fluor		0,1 mg	cp sublingual							
	lithium		1,6 mg	cp sublingual							 femme enceinte
	manganèse		0,1 mg	cp sublingual							A administrer le matin à jeun ou à distance des repas Laissez fondre sous la langue sans croquer
	manganèse + cuivre		0,1 mg / 0,1 mg	cp sublingual							
	manganèse + cuivre + cobalt		0,1mg/0,1mg/0,1mg	cp sublingual							
	nickel + cobalt		0,1 mg / 0,1 mg	cp sublingual							
	phosphore		0,03 mg	cp sublingual							
	potassium		0,0498 mg	cp sublingual							
	sélénium		16,66 mg	cp sublingual							
	soufre		0,06 mg	cp sublingual							
	zinc		0,1 mg	cp sublingual							
	zinc + cuivre		0,1 mg / 0,1 mg	cp sublingual							
zinc + nickel + cobalt		0,1mg/0,1mg/0,1mg	cp sublingual								
OLIGO ELEMENTS PH	chrome + cuivre + fer + fluor + iode + manganèse + molybdène + sélénium + zinc		0,51mg/13,8mg/0,18mg/5,5mg/0,59mg/6,15mg/6,3mg/0,65mg/0,11mg (10 ml)	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OLIGOSOL	aluminium		3,995 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							A administrer le matin à jeun ou ¼ h avant un repas Voie sublinguale recommandée Gardez la solution sous la langue 1 à 2 minutes avant de l'avaler
	bismuth		0,133 mg (ampoule 1 ml)	solution buvable							
	cobalt		0,45 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	cuiivre – or- argent		22,31 mg / 0,07mg / 3mg (100 ml)	solution buvable							
	cuiivre		5,179 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	fluor		0,442 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	lithium		8,14 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							femme enceinte
	magnésium		1,781 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							A administrer le matin à jeun ou ¼ h avant un repas Voie sublinguale recommandée Gardez la solution sous la langue 1 à 2 minutes avant de l'avaler
	manganèse		0,59 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	manganèse + cobalt		0,59mg / 0,553mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	manganèse + cuiivre + cobalt		0,59mg / 0,553 m (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	manganèse + cuiivre		0,518mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	nickel – cobalt		0,555mg / 0,553mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	phosphore		0,14 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	potassium		0,24 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	sélénium		0,333 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	soufre		0,3 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	zinc		0,47 mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
	zinc + cuiivre		0,47mg / 0,518mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	zinc + nickel + cobalt		0,47mg/0,553mg / 0,553mg (ampoule 2 ml)	solution buvable							
OLIGOSTIM	aluminium		0,139 mg	cp sublingual							A administrer le matin à jeun ou à distance des repas Laissez fondre sous la langue sans croquer
	cobalt		0,24 mg	cp sublingual							
	cuiivre + or + argent		0,22mg/0,07mg/0,098mg	comprimé							
	cuiivre		0,22 mg	cp sublingual							
	fluor		0,199 mg	cp sublingual							
	lithium		0,087 mg	cp sublingual							femme enceinte
	magnésium		0,22 mg	cp sublingual							A administrer le matin à jeun ou à distance des repas Laissez fondre sous la langue sans croquer
	manganèse		0,24 mg	cp sublingual							
	manganèse + cobalt		0,24 mg / 0,24 mg	cp sublingual							
	manganèse + cuiivre		0,24 mg / 0,22 mg	cp sublingual							
	manganèse + cuiivre + cobalt		0,24mg/0,22mg/0,24mg	cp sublingual							
	phosphore		0,068 mg	cp sublingual							
	potassium		0,114 mg	cp sublingual							
	sélénium		19,5 mg	cp sublingual							
	soufre		0,058 mg	cp sublingual							
	zinc		0,22 mg	cp sublingual							
	zinc + cuiivre		0,22 mg / 0,22 mg	cp sublingual							
zinc + nickel + cobalt		0,24mg/0,22mg/0,24mg	cp sublingual								
OLIVALAX	huile d'olive + séné		220mg / 27,778mg	capsule molle							A avaler avec un verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OMACOR	acides gras ω-3 + vitamine E		1 g / 4 mg	capsule molle							
OLMETEC	olmésartan		10 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer à heure fixe, pendant ou en dehors des repas, avec un peu d'eau femme enceinte
			20 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			40 mg	cp pelliculé		?	?		?		
OLMIFON	adrafinil		300 mg	cp pelliculé							A administrer le matin à jeun Photo-oxydation du principe actif : administration immédiate
OMACOR	acides gras ω-3 polyinsaturés + vitamine E		1 g / 4 mg	capsule molle							A administrer au cours d'un repas, avec un peu d'eau
OMEDIPROL	oméprazole		20 mg	gélule							A avaler entière, de préférence le matin à jeun, avec ½ verre d'eau Gélule ouvrable mais ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser les microgranules gastrorésistants
OMEMAZINE	omémazine		0,33 mg / ml	solution buvable							A administrer de préférence le soir du fait des effets sédatifs
OMEPRAZOLE	oméprazole		10 mg	gélule							A administrer avec un ½ verre d'eau, à jeun ou au cours d'un repas Gélules ouvrables mais ne pas écraser les microgranules gastrorésistants : à mélanger à un aliment légèrement acide (yaourt, compote de pomme, jus d'orange ...)
			20 mg	gélule							
OMEXEL LP	tamsulosine		0,4 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé à libération prolongée
OMIX LP	tamsulosine		0,4 mg	gélule							A administrer à la fin du petit déjeuner, ne pas prendre de substance chaude Gélule ouvrable mais ne pas mâcher ni croquer ni écraser les microgranules à libération prolongée : mélanger à du yaourt ou de la compote
ONDANSETRON	ondansétron		8 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer , ni écraser le comprimé pelliculé : microgranules à libération prolongée Préférez le comprimé orodispersible à laisser fondre

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			8 mg	cp orodispersible							sur la langue ou à diluer dans de l'eau
ONGLYZA	saxagliptine		2,5 mg	comprimé		?	?		?		
			5 mg	cp pelliculé		?	?		?		
ONSENAL	célécoxib		400 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas
OPOBYL	aloès + boldo		40 mg / 50 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
OPO VEINOGENE	vigne rouge + marron d'Inde + esculoside		400mg/300mg/1,2mg	solution buvable							A administrer avant un repas, diluée dans de l'eau
OPTIDRIL	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		30 µg / 150 µg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
OPTILOVA	lévonorgestrel + éthinyloestradiol		20 µg / 100 µg	cp pelliculé	 						
OPTINESSE	<i>cp jaune</i> : gestodène + éthinyloestradiol		60 µg / 15 µg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe
	<i>cp blanc</i> : placebo			cp pelliculé	 						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
OPTRUMA	raloxifène		60 mg	cp pelliculé	 						A administrer avant un repas, diluée dans de l'eau
ORACEFAL	céfadroxil		125 mg / 5 ml	poudre orale							A administrer avant ou pendant les repas Préférez la poudre orale ou le comprimé dispersible
			250 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg / 5 ml	poudre orale							
			500 mg	gélule							
			1 g	cp dispersible							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ORACILLINE	phénoxy méthylpénicilline		250 000 UI / 5 ml	susp. buvable							Préférez la suspension buvable
			500 000 UI / 5 ml	susp. buvable							
			1 MUI / 10 ml	susp. buvable							
			1 MUI	cp bisécable							
ORALAIR 100 IR et 300 IR	extrait allergénique de pollens de graminées : dactyle aggloméré, flouve odorante, ivraie vivace, pâturin des prés, fléole des prés			cp sublingual							A administrer le matin à jeun Laissez fondre le comprimé sous la langue jusqu'à dissolution complète (au moins 1 minute) avant d'avaler
ORAL IMPACT	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en arginine, nucléotides, AG ω-3		237 ml (303 kcal)	solution buvable 3 saveurs bouteille							A administrer de préférence avec une paille, à la sortie du réfrigérateur, 90 minutes avant ou après un repas
ORAMORPH	sulfate de morphine		10 mg / 5 ml	solution buvable							A utiliser pure ou mélangée avec un aliment (purée, confiture, yaourt) Les sondes entérales doivent être à extrémité distale ouverte ou à pores latéraux : rincer avec 30 à 50 ml d'eau
			20 mg / 5 ml	solution buvable							
			30 mg / 5 ml	solution buvable							
			100 mg / 5 ml	solution buvable							
ORAP	pimozide		1 mg	comprimé							A administrer le soir au coucher Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			4 mg	comprimé							
ORAVIR	famciclovir		125 mg	cp pelliculé							A administrer avec un peu d'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			500 mg	cp pelliculé							
ORBENINE	cloxacilline		500 mg	gélule							A administrer ½ h avant le repas en évitant les jus de fruit et autres solution buvables acides Odeur désagréable : ouverture possible de la gélule si administration par sonde entérale

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ORDIPHA	azithromycine		500 mg	cp dispersible bisécable							A administrer en une seule prise, au cours ou en dehors d'un repas Disperser le comprimé ou le demi-comprimé dans un verre d'eau avant la prise
ORELOX	cefepodoxime	®	100 mg	comprimé							A administrer au cours des repas Goût désagréable du comprimé : broyage possible si administration par sonde entérale Préférez la suspension buvable
			40 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable							
ORFADIN	nitisinone		2 mg	gélule							Gélule ouvrable : contenu à disperser dans un peu d'eau ou d'aliments Administration immédiate
			5 mg	gélule							A associer à un régime alimentaire pauvre en phénylalanine et en tyrosine : pomme de terre, chou, betteraves (à éviter : fromages, lait, riz, abats, jaune d'œuf)
			10 mg	gélule							
ORGAMETRIL	lynestrérol	®	5 mg	comprimé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ORLISTAT	orlistat		120 mg	gélule							A administrer avec de l'eau, immédiatement avant, pendant ou jusqu'à une heure après chacun des 3 repas
ORMANDYL	bicalutamide		50 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, avec un verre d'eau
ORNITAINE	ornithine + magnésium + bétaïne + sorbitol + acide citrique		0,05g/0,193g/1g/4,286g /0,5g (10 ml)	solution buvable							A administrer avant les repas ou au moment des troubles, éventuellement diluée dans un peu d'eau
ORNITHINE OXOGL	ornithine oxoglutarate		5 g	poudre orale							A administrer par voie orale : dissoute dans un verre d'eau ou diluée dans un yaourt ou une crème lactée
			10 g	poudre orale							Administration par sonde entérale en bolus après dissolution dans 200 ml d'eau, au cours de la nutrition
OROCAL	carbonate de calcium		500 mg	comprimé à sucer							
OROCAL D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 200 UI	comprimé à sucer							Par sonde : préférez Caci [®] comprimé effervescent ou Calcidose [®] ou Calciforte [®] poudre orale
			500 mg / 400 UI	comprimé à sucer							
OROKEN	céfixime	®	40 mg / 5 ml	poudre orale							
		®	100 mg / 5 ml	poudre orale							Comprimés à croquer et à avaler avec du lait ou de l'eau Préférez la poudre orale
			200 mg	cp pelliculé à							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			200 mg	croquer							
OROMAG	citrate de magnésium + lactate de magnésium		125 mg / 1078 mg	comprimé à sucer							A administrer avant ou au cours d'un repas
OROMONE	estradiol hémihydraté		1 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine, adhérence à la paroi des sondes
			2 mg	cp pelliculé	 						
OROMYLASE	alfa amylase		1 000 U CEIP	comprimé							A laisser fondre lentement dans la bouche Ne pas croquer , ni écraser
OROPERIDYS	dompéridone		10 mg	cp orodispersible							A administrer avant un repas A laisser fondre dans la bouche sans croquer ± boire un verre d'eau Dispersion dans ½ verre d'eau possible : administration immédiate
OROZAMUDOL	tramadol		50 mg	cp orodispersible							A administrer en dehors ou pendant les repas A laisser fondre dans la bouche ou diluer dans ½ verre d'eau : boire immédiatement après dispersion
ORPHACOL ATU	acide cholique		50 mg	gélule				?	?		
			250 mg	gélule				?	?		
OS 1	mélange d'AA sans méthionine ni thréonine ni valine ; enrichi en vitamines, sels minéraux et oligoéléments		500 g (276kcal/100g)	poudre orale et entérale							A mélanger à un liquide (maximum de 10 g pour 100 ml) ou des aliments Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, de la naissance à 1 an
OS 2 PRIMA MILUPA			500 g (288kcal/100g)	poudre orale et entérale							A mélanger à un liquide (maximum de 10 g pour 100 ml) ou des aliments Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, chez l'enfant de plus de 1 an
OS 2 SECUNDA MILUPA			500 g (290kcal/100g)	poudre orale et entérale							A mélanger à un liquide (maximum de 10 g pour 100 ml) ou des aliments Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, à partir de 9 ans
OSMOI AC	préparation lactée sans		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OSMOLENE	lactose		900 g	poudre orale et entérale							cas d'épisodes diarrhéiques
OSPOLOT ATU	sultiame		50 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			200 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
OSSEANS VIT D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg/400 UI	cp à croquer et à sucer							
OSSOPAN	complexe osséine-hydroxyapatite		600 mg	cp pelliculé							A administrer avec un grand verre d'eau
OSTEOCAL	carbonate de calcium		500 mg	comprimé à sucer							A laisser fondre dans la bouche
OSTEOCAL D ₃	carbonate de calcium + vitamine D ₃		500 mg / 400 UI	comprimé à sucer							
OSTRAM	phosphate tricalcique		0,6 g	poudre orale							A administrer dans 150 ml d'eau, bien agiter avant l'emploi
			1,2 g	poudre orale							
OSTRAM VIT D ₃	phosphate tricalcique + vitamine D ₃		1,2 g / 800 UI	poudre orale							
OTRASEL	deprényl		1,25 mg	comprimé lyoc							A administrer 5 minutes avant le petit déjeuner ou le lavage des dents Se dissout en 10 secondes sous la langue
OXANDROLONE ATU	oxandrolone		2,5 mg	comprimé							
OXCARBAZEPINE	oxcarbazépine		150 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			300 mg	cp pelliculé	 						
			600 mg	cp pelliculé	 						
			10 mg	comprimé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OXEOL	bambutérol	Ⓢ	10 mg	sécable	■	•	•		•		A administrer en une prise unique le soir
			20 mg	comprimé sécable	■ ■	?	?		?		
OXOMEMAZINE	oxomémazine		0,33 mg / ml	sirop	■		🍷		🍷		A administrer de préférence le soir du fait des effets sédatifs
OXOMEMAZINE sans sucre	oxomémazine +acésulfame potassique		0,33 mg / ml	sol.buvable	■		🍷		🍷		Utilisez le gobelet doseur
OXYBOLDINE	boldine + sulfate de sodium + phosphate disodique		0,5mg/54mg/132mg	cp effervescent		🍲	🍷		🍷		A administrer avant les repas ou au moment des troubles, dissout dans un verre d'eau : dégazer la solution
OXYBUTYNINE	oxybutynine	®	5 mg	cp bisécable	■	?	?		?		A administrer à jeun avec un verre d'eau ou pendant un repas, ou avec un verre de lait
OXYCONTIN LP	chlorhydrate d'oxycodone	■	5 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : comprimés à libération prolongée
			10 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			15 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			20 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			30 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			40 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			60 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			80 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
			120 mg	cp pelliculé	■ ■	🍲	🍷		🍷		
		■	5 mg	gélule	■	🍲		?	?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
OXYNORM	chlorhydrate d'oxycodone		10 mg	gélule				?	?		Préférez Oxynormoro®
			20 mg	gélule				?	?		
OXYNORMORO	chlorhydrate d'oxycodone		5 mg	cp orodispersible							Le comprimé se délite rapidement dans la bouche, puis est avalé
			10 mg	cp orodispersible							
			20 mg	cp orodispersible							
OZIDIA	glipizide		5 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés osmotiques à libération prolongée ⇒ risque d'hypoglycémie
			10 mg	comprimé							
OZOTHINE	essence de térébenthine dérivés oxydés		12 mg (cuillère à café)	sirop							Préférez le sirop Existe également sous la forme suppositoire
OZOTHINE DIPROPHYLLINE	diprophylline + essence de térébenthine dérivés oxydés		150 mg / 20 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
PABASUN	acide para aminobenzoïque		500 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer au cours d'un repas
PACILIA	lévonorgestrel + éthinyloestradiol		0,15 mg / 0,03 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,2 mg / 0,04 mg	comprimé enrobé							
PADERYL	codéine		1 mg / ml	sirop							Préférez le sirop
			19,5 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
PALIURYL	rhamnuspalirus		321 mg (XXX gouttes)	solution buvable							
PALUDRINE	proguanil		100 mg	comprimé sécable							Goût très amer : broyage possible si administration par sonde entérale, administration immédiate
P-AMINOSALICYLATE DE SODIUM PH	para-aminosalicylate de sodium		2 g	poudre orale							
PANADOI	paracétamol		500 mg	cp effervescent sécable							Préférez le comprimé effervescent : dégazez la solution

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PANADOL	paracétamol		500 mg	cp pelliculé sécable							Préférez le comprimé effervescent : degazez la solution
PANCRELEASE	cellulase fongique		100 mg	comprimé enrobé	 						A administrer au début du repas
PANFUREX	nifuroxazide		200 mg	gélule	 			?	?		Préférez la suspension buvable
			40 mg / ml	susp. buvable							
PANTESTONE	undécanoate de testostérone		40 mg	capsule molle	 						
PANTOLOC	pantoprazole		20 mg	cp enrobé							A administrer entier avnt un repas Ne pas croquer , ni écraser
PANTOPRAZOLE	pantoprazole		20 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés gastrorésistants
			40 mg	comprimé							
PANTOZOL CONTROL	pantoprazole		20 mg	cp enrobé	 						
PANXEOL	eschscholtzia + passiflore		150 mg / 150 mg	comprimé		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau
PAPAIN TROUETTE PERRET	papayer		0,344 g (100 ml)	sirop							
			0,344 g (100 ml)	solution buvable	 						
			75 mg	granulés pour susp. buvable							
			150 mg	granulés pour susp. buvable							
			300 mg	poudre orale							
			500 mg	poudre orale							
			500 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PARACETAMOL	paracétamol		500 mg	comprimé	 						Avaler les gélules intactes : ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir, ni écraser Goût très amer : broyage possible des comprimés si administration par sonde entérale Préférez les suspensions buvables diluées dans de l'eau, du lait ou du jus de fruit
			500 mg	cp effervescent sécable	 						
			500 mg	cp pelliculé sécable							
			500 mg	gélule							
			1 g	poudre orale							
			1 g	comprimé	 						
			1 g	cp effervescent sécable							
PARACETAMOL CODEINE	paracétamol + codéine		400 mg / 20 mg	cp effervescent sécable							Dégazez la solution
			500 mg / 30 mg	cp effervescent sécable							
PARALYOC	paracétamol		250 mg	poudre orale							Boire immédiatement après dissolution dans de l'eau, du lait ou un jus de fruit
			500 mg	poudre orale							
PARAMINAN	acide para amino benzoïque		500 mg	comprimé							A administrer au cours des repas
PARAPSYLLIUM	ispaghul + paraffine liquide		3,333 g / 3,333 g	poudre orale							A administrer le soir au coucher
PAREGORIQUE	acide benzoïque + essence d'anis + camphre + poudre d'opium		5mg/5mg/2mg/5mg	comprimé							
PARGINE	arginine		500 mg / ml	solution buvable							
PARIET	rabéprazole		10 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés gastrorésistants Préférez Artane® en solution buvable : X gouttes = 1 mg
			20 mg	comprimé enrobé							
PARKINANE I.P	trihexyhénidyle		2 mg	gélule							Gélules ouvrables mais sans écraser les microgranules Préférez Artane® solution buvable à 4 % : 1 mg =

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PARALAX	amlexyprénazole	®	5 mg	gélule							X gouttes → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)
PARLAX	paraffine liquide		100 ml	solution buvable (huileuse)							
PARLODEL	bromocriptine		2,5 mg	comprimé sécable							A administrer au milieu des repas Si broyage du comprimé, évitez les phénomènes d'échauffement : administration immédiate
			5 mg	gélule							
			10 mg	gélule							
PAROXETINE	paroxétine		20 mg	cp pelliculé sécable							femme enceinte
PASER ATU	acide para-aminosalicylique		4 g sachet	granulés							Les granulés peuvent être mélangés soit avec un aliment acide (compote de pomme, yaourt) soit mis en suspension dans une boisson acide (jus de tomate ou d'orange) et avalés immédiatement Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : granulés gastrorésistants
PASSEDYL nourrisson enfant	benzoate de sodium + sulfogaiacol		113,4mg/58,7 mg	sirop							
PASSIFLORINE	passiflore + aubépine		100 mg / 30 mg	gélule				?	?		Préférez la solution buvable
			500 mg / 500 mg (cuillère à café)	solution buvable							
PASSINEVRYL	aubépine + passiflore + valériane		16mg/40mg/24mg	comprimé enrobé							A administrer avec de l'eau ou du yaourt Goût et odeur désagréables, broyage possible si administration par sonde
PAXELADINE	oxéladine citrate		2 mg / ml	sirop							Gélules à libération prolongée
PAXELADINE LP	oxéladine citrate		40 mg	gélule							Préférez le sirop → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)
PECTOSAN adulte toux sèche	carbocistéine		1,5 mg / ml	sirop							
PECTOSAN adulte expectorant	carbocistéine		50 mg / ml	sirop							
			50 mg / ml	solution buvable							
PECTOSAN enfant toux sèche	pentoxivérine citrate		7,5 mg / 5 ml	sirop							
PECTOSAN expectorant enfant	carbocistéine		20 mg / ml	sirop							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PECTOSAN expectorant enfant	carbocisteine		20 mg / ml	sirop							
PECTOSAN toux sèche ETHYLMORPHINE	chlorhydrate d'éthylmorphine		3 mg (cuillère mesure)	sirop							
PECTOSAN PENTO enfant toux sèche	pentoxivérine		7,5 mg (cuillère mesure)	sirop							
PEDIAZOLE	érythromycine + sulfafurazole		200 mg / 600 mg (5 ml)	granulés pour sirop							
PEFLACINE	péfloxacin		400 mg	cp pelliculé sécable							A administrer au milieu des repas pour éviter des troubles digestifs
PEFLACINE MONODOSE	péfloxacin		400 mg	comprimé enrobé							Photosensible : administration immédiate
PEGA	phosphocitroglutamate d'arginine et de potassium		500 mg	cp à croquer							
			1 g	cp à croquer							
PENTASA	mésalazine		250 mg	comprimé							A administrer au cours des repas Avaler les granulés sans croquer avec un peu d'eau , administrables sans être écrasés dans sonde entérale de calibre suffisant (gros granulés gonflant dans l'eau), par petites quantités
			500 mg	comprimé							
			1 g	granulés							
			1 g	comprimé							
			2 g	granulés							
PENTOFLUX LP	pentoxifylline		400 mg	comprimé enrobé						Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée	
PENTOXIFYLLINE LP	pentoxifylline		400 mg	cp pelliculé						Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez Torental® ampoules injectables	
PEPCIDAC	famotidine		10 mg	cp pelliculé						A administrer avant le repas ou au coucher	
PEPCIDDUO	carbonate de calcium + famotidine + hydroxyde de magnésium		800mg/10mg/165mg	cp à croquer	 					A administrer avec un verre d'eau	
PEPDINE	famotidine		20 mg	cp pelliculé							
			40 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PEPSANE	diméticone + gaïazulène		300 mg / 4 mg	capsule molle							Avaler la gelée telle quelle avant le repas
			3 g / 4 mg	gelée orale							
PEPTAMEN AF	mélange nutritif semi-élémentaire hypercalorique, hyperprotidique (peptides de lactosérum), enrichi en AG ω-3		500 ml (750 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
PEPTAMEN HN	mélange nutritif semi-élémentaire hypercalorique, hyperprotidique (peptides de lactosérum)		500 ml (665 kcal)	SmartFlex							
PEPTAMEN JUNIOR	mélange nutritif semi-élémentaire isocalorique, normoprotidique (peptides de lactosérum), riche en TCM		500 ml (500 kcal)	SmartFlex							
PEPTAMEN JUNIOR ADVANCE	mélange nutritif semi-élémentaire isocalorique, normoprotidique ; enrichi en TCM, ω-3 et fibres		500 ml (750 kcal)	SmartFlex							
PEPTAMEN NEUTRAL	mélange nutritif semi-élémentaire isocalorique, normoprotidique (peptides de lactosérum), riche en TCM		500 ml (500 kcal)	SmartFlex							
PEPTI JUNIOR	mélange semi-élémentaire contenant un hydrolysate de protéine de lactosérum		450 g	poudre orale et entérale							
PERACEL	lopéramide		2 mg	gélule							Préférez la solution buvable d'Imodium® diluée dans de l'eau ou du lait : 1 ml = XXVII gouttes = 0,2 mg
PERGOTIME	clomifène		50 mg	comprimé sécable		?	?		?		
PERIACTINE	cyproheptadine		4 mg	comprimé							
PERICAL	carbonate de calcium		1 g	comprimé à sucer							
PERIDYS	dompéridone		1 mg / ml	susp. buvable							A administrer avant le repas Préférez la suspension buvable
			10 mg	en pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			10 mg	cp pelliculé							
PERINDOPRIL	périndopril		2 mg	comprimé		?	?		?		<p>A administrer en une seule fois avant le petit déjeuner, avec suffisamment de liquide</p> <p> femme enceinte</p>
			2,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			4 mg	cp bisécable		?	?		?		
			5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			8 mg	comprimé		?	?		?		
PERINDOPRIL AMLODIPINE	périndopril + amlodipine		5 mg / 5 mg			?	?		?		
PERINDOPRIL INDAPAMIDE	périndopril + indapamide		10 mg / 2,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
PERISTALTINE	cascara		25 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer après le repas du soir
			75 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
			100 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
PERLEANE	éthinyloestradiol + gestodène		0,03 mg / 0,1 mg	comprimé enrobé	 						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,04 mg / 0,07 mg	comprimé enrobé	 						
			0,03 mg / 0,05 mg	comprimé enrobé	 						
PERMIXON	serenoa repens		160 mg	gélule							A administrer au cours du repas Goût désagréable : ouverture possible si administration par sonde entérale
PERSANTINE	dinopridamol		25 mg	comprimé enrobé							Goût très amer et fort pouvoir colorant du principe

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PERSANTINE	apiprémone		75 mg	comprimé enrobé							actif
PETER'S	chlorhydrate d'éthylmorphine		0,49 mg / ml	sirop							
PETITES PILULES CARTERS	aloès du Cap + boldine		3,9 mg / 0,5 mg	comprimé enrobé							Broyage déconseillé mais possible pour administration dans des sondes jéjunales : délitement entérique
PETINIMIDE ATU	éthosuximide		250 mg	gélule				?	?		
PETINUTIN ATU	mésuximide		150 mg	comprimé		?	?		?		
PEXSIG	pholcodine		100 mg	comprimé							
PFD 1	mélange nutritionnel sans phénylalanine		450 g	poudre orale et entérale							Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez l'enfant et l'adulte
PHAEVA	éthinyloestradiol + gestodène		0,03 mg / 0,05 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,04 mg / 0,07 mg	comprimé enrobé							
			0,03 mg / 0,1 mg	comprimé enrobé							
PHARMAKOD adulte toux sèche	pholcodine		1,2 mg / ml	sirop							
PHARMAKOD adulte expectorant	carbocistéine		50 mg / ml	sirop							
PHEBURANE ATU	phénylbutyrate de sodium		483 mg / g	granules							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau ou de jus de fruit ou de préparation infantile sans protéines ou saupoudrés sur une cuillère de purée ou de compote de pomme...
PHENERGAN	prométhazine		5 mg / 5 ml	sirop							A administrer le soir Préférez le sirop
			25 mg	comprimé enrobé							
PHLEXY-10	mélange de glucides et d'AA sans phényl alanine		20 g (69 kcal/sachet)	poudre orale 4 saveurs							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml = 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez l'enfant et l'adulte
	mélange d'AA sans phényl		0,5 g d'AA	gélule							A administrer avec de l'eau ou un autre liquide si phénylcétonurie chez l'enfant et l'adulte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	alanine		1 g d'AA	comprimé							phénylalanine chez l'enfant et l'adulte Préférez la poudre orale
PHLEXY -VITS	mélange de sels minéraux, vitamines et d'oligo-éléments		7 g	poudre orale							A administrer avec de l'eau ou un autre liquide, associé à la gamme Phlexy-10 ou PK Aid-4 Préférez la poudre orale, mélangée au sachet d'AA
				comprimé							
PHLOROGLUCINOL	phloroglucinol		80 mg	cp orodispersible							Préférez le comprimé dispersible
			80 mg	cp à libération modifiée							
PHOLCODINE	pholcodine		1,2 mg / ml	sirop							
PHOLCODYL	erysimum + pholcodine		0,15 g / 0,1 g	sirop							
PHOSPHALUGEL	phosphate d'aluminium		12,38 g / 20 g	susp. buvable							A administrer après un repas ou au moment des troubles
			61,9 g / 100 g	susp. buvable							
			540 mg	cp à croquer							
PHOSPHONEUROS	acide phosphorique + phosphate de calcium + phosphate de sodium + phosphate de magnésium		157,7 mg / 43,97 mg / 110,85 mg / 24,86 mg (X gouttes)	solution buvable							X gouttes = 78,8 mg de phosphore et 35,7 mg de sodium
PHOSPHORE	dihydrogénophosphate d'ammonium + glycérophosphate de manganèse + phosphate monopotassique		750 mg	cp effervescent							Dégazez la solution
PHOSPHOSORB	acétate de calcium		660 mg	comprimé							A administrer au moment des repas pour assurer une chélation optimale du phosphate Ne pas croquer, ni écraser
PHYSIOGINE	estriol		1 mg	comprimé sécable							A toujours administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine Ne pas administrer au cours d'un repas riche en graisse
PHYSIOLAC 1	préparations lactées,		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Aliment du bébé en bonne santé, dès la naissance
			900 g	poudre orale et entérale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PHYSIOLAC 2	enrichies en prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Aliment du bébé en bonne santé, dès 6 mois
			900 g	poudre orale et entérale							
PHYSIOLAC AR 1	préparations lactées épaissies, enrichies en prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de régurgitations, de la naissance à 6 mois
			900 g	poudre orale et entérale							
PHYSIOLAC AR 2	préparations lactées épaissies, enrichies en prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de régurgitations, dès 6 mois
			900 g	poudre orale et entérale							
PHYSIOLAC CROISSANCE	préparation lactée, enrichie en prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour les enfants de 1 à 3 ans
			900 g	poudre orale et entérale							
PHYSIOLAC HA	préparation lactée, enrichie en AG ω-3		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de risque allergique, de la naissance à 1 an
			900 g	poudre orale et entérale							
PHYSIOLAC NUTRI-RÉGULATION	préparation lactée normocalorique, enrichie en prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Pour le bébé gros mangeur, de la naissance à 1 an
			900 g	poudre orale et entérale							
PHYSIOMYCINE	méthylènecline		300 mg	gélule							A administrer en dehors des repas Évitez la prise simultanée de lait : l'association à des cations bi ou trivalents (Al, Ca, Mg) forme des complexes non absorbables
PHYSIOTENS	moxonidine		0,2 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde
			0,4 mg	cp pelliculé							
PHYTAT	acide fytique		1 g (cuillère à soupe)	sirop							
PHYTEMAG	ache + buchu + gingembre + glycérophosphate de magnésium + prêle		40 mg / 40 mg / 40 mg / 90 mg / 40 mg	gélule							
PHYTOMELIS	hamamélis + marron d'Inde		75 mg / 112,5 mg (XXX gouttes)	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PHYTOTUX	baume de Tolu + desessartz		286 mg / 262,5 mg (5 ml)	sirop							
PIASCLEDINE	insaponifiables d'avocat et de soja		100 mg / 200 mg	gélule							A administrer au milieu du repas
PICOLITE	Solution de réhydratation orale : glucides + sodium + potassium + citrates		89g/60mmol/ 24,5mmol/ 13,4mmol (par litre)	poudre orale et entérale							A diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
PICOT 1 ^{er} Age	préparation lactée pour nourrisson		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Nutrition quotidienne, de la naissance à 5 mois révolus
			400 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
			900 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PICOT 2 ^e Age	préparation lactée de suite		900 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Nutrition quotidienne, de 6 mois à 1 an
PICOT action coliques	préparation lactée : 100% de protéines hydrolysées, lipides structurés, teneur modérée en lactose		900 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de coliques et ballonnements, de la naissance à 1 an
PICOT action diarrhées	formule dé lactosée, 100 % d'origine végétale		900 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de diarrhées aiguës, de la naissance à 1 an
PICOT action transit	préparation lactée, enrichie en probiotiques		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de constipation, de la naissance à 1 an
PICOT AR 1 ^{er} Age	préparation lactée épaissie à l'amidon de riz, enrichie en probiotiques		900 g* (68 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de simples régurgitations, de la naissance à 1 an
PICOT AR 2 ^e Age			900 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PICOT bébé gourmand 1 ^{er} Age	préparation lactée épaissie à l'amidon de riz, sans augmentation de l'apport calorique		900 g* (69 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Favorise la satiété
PICOT bébé gourmand 2 ^e Age			900 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PICOT boissons instantanées aux plantes	boissons sucrées, élaborées à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique		5 g* (394kcal/100ml)	granulés 4 saveurs							Mélangez 1 sachet de granulés à 100ml d'eau chaude ou froide, remuez
PICOT céréales croissance cacoté	farine de riz, amidon de maïs, saccharose, maltodextrines, poudre de cacao ; enrichie en fer et vitamines, sans gluten ni lactose		200 g (383kcal/100g)	flocons							Mélangez 1 cuillère à soupe rase (5 g) de flocons avec 45 à 60 ml de lait tiède, bien agiter Dès 10 mois

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PICOT croissance	préparation lactée de suite, enrichie en probiotiques		900 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau Nutrition quotidienne
			1,5 kg* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PICOT farine instantanée	farine instantanée (riz, maïs, tapioca, orge) diastasée, enrichie en fer et vitamines, sans sucres ajoutés ni gluten ni lactose		200 g (376kcal/100g)	flocons 8 saveurs							Mélangez 7 cuillères à soupe rases (35 g) de flocons avec 240 ml de lait tiède, bien agiter De 4 à 10 mois
PICOT HA 1 ^{er} Age	préparation hypo allergénique, épaissie à l'amidon de riz, enrichie en probiotiques		900 g* (68kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de risque d'APLV, de la naissance à 1 an
PICOT HA 2 ^e Age			900 g* (65 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PICOT jus de fruits	jus de fruits élaborés à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique		10 ml	ampoule 3 saveurs							Agitez l'ampoule avant usage, mélangez avec un peu d'eau
PICOT NUTRILON AR 1 ^{er} Age	préparation lactée épaissie à la farine de caroube		900 g* (68kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau En cas de régurgitations et reflux gastro-œsophagien, de la naissance à 1 an
PICOT NUTRILON AR 2 ^e Age			900 g* (65kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PILOSURYL	pilosèle + phyllantus		1 g (cuillère mesure)	solution buvable							
PINAVERIUM	pinavérium		100 mg	cp pelliculé	 						
PIPORTIL	pipotiazine		10 mg	cp pelliculé sécable							Préférez la solution buvable : 1 goutte = 1 mg
			40 mg / ml	solution buvable							
PIPRAM FORT	acide pipémidique		400 mg	comprimé enrobé	 						Photosensible : administration immédiate
PIRACETAM	piracétam		200 mg / ml	solution buvable	 						Préférez la solution buvable
			400 mg	cp pelliculé							
			800 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			800 mg	cp pelliculé sécable							
PIRILENE	pyrazinamide		500 mg	comprimé sécable							Préférez la suspension buvable de PZA-CIBA® (en ATU)
PIROXICAM	piroxicam		10 mg	gélule							A administrer pendant les repas Préférez le comprimé dispersible
			10 mg	comprimé							
			20 mg	gélule							
			20 mg	cp dispersible							
			20 mg	comprimé sécable							
PK AID-4	mélange d'AA sans phényl alanine, supplémenté en glucides		500 g (334kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte
PKC 412 ATU	midostaurin		25 mg	capsule molle							A administrer intacte, avec de l'eau, à la fin du petit déjeuner ou du dîner Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
PK AID-4	mélange d'AA sans phényl alanine, supplémenté en glucides		500 g (334kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 100 ml 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte
PKU ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans phényl alanine, supplémenté en glucides, AG, pré-biotiques ;		400 g	poudre orale et entérale							Diluer 15 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie jusqu'à 1 an et en supplémentation de 1 à 3 ans
PKU ANAMIX JUNIOR	enrichi en vit., sels minéraux et oligoéléments		29 g	solution buvable							Prête à l'emploi A utiliser dans le traitement nutritionnel de la phénylcétonurie de 3 à 10 ans

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PKU 1 MIX MILUPA	mélange d'AA sans phényl alanine, supplémenté en glucides, AG, pré-biotiques ; enrichi en vit., sels minéraux et oligoéléments		1 000 g* (66 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Diluez 1 mesurette de 4,6 g de poudre dans 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie, de la naissance à 1 an
PKU 2 ACTIVA	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines, sels minéraux et oligoéléments		50 g (185 kcal)	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet de 50 g de poudre dans 125 ml d'eau chaude Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie et de l'hyperalaninémie chez l'enfant de 9 à 14 ans
PKU 2 FRUTA	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, vitamines, sels minéraux et oligoéléments		100 ml	jus de fruit							Prête à l'emploi Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie et de l'hyperalaninémie chez l'enfant à partir de 8 ans
PKU 2 MIX MILUPA	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, vitamines, sels minéraux et oligoéléments		400 g* (67 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Diluez 15 g de poudre dans 90 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie et de l'hyperalaninémie chez l'enfant de 1 à 8 ans
PKU 2 PRIMA MILUPA	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en vitamines, sels minéraux et oligoéléments		500 g (280kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie et de l'hyperalaninémie chez l'enfant de 1 à 8 ans
PKU 2 SECUNDA MILUPA	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en vitamines, sels minéraux et oligoéléments		500 g (307kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie et de l'hyperalaninémie chez l'enfant de 9 à 14 ans
PKU 3 TEMPORA	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines, sels minéraux et oligoéléments		45 g (194 kcal)	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie avant et pendant la grossesse et la lactation
PKU COOLER	mélange d'AA sans phényl alanine ; enrichi en AG ω-3, vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		130 ml	solution buvable 2 saveurs + 1 goût neutre							Prête à l'emploi - A administrer bien frais Conservation 24 heures - Peut être congelée Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie dès 3 ans et chez l'adulte
PKU EXPRESS	mélange d'AA sans phényl alanine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		25 g	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet dans 100 ml d'eau bien fraîche, bien agiter - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie dès 8 ans et chez l'adulte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PKU GEL	mélange d'AA sans phényl alanine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		20 g	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet dans 30 ml d'eau bien fraîche, bien agiter = consistance d'entremet + ajoutez 100 ml d'eau pour une solution buvable - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de la la phénylcétonurie entre 1 et 8 ans
PLAQUENIL	hydroxychloroquine		200 mg	cp pelliculé	 						A administrer à la fin des repas Mauvaise tolérance gastrique lorsque le comprimé est écrasé
PLAVIX	clopidogrel		75 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Goût amer : broyage possible si administration par sonde entérale
			300 mg	cp pelliculé	 						
PLENESIA	eschscholtzia + passiflore		150 mg / 150 mg	comprimé enrobé	 						Evitez la prise d'alcool
PLETAL	cilostazol		100 mg	comprimé		?	?		?		
PLITICAN	alzapride		50 mg	comprimé sécable	 						
PMS-ISONIAZIDE ATU	isoniazide		10 mg / ml	solution buvable							
PN 401ATU	triacétate d'uridine			granules		?	?		?		
PNEUMASEPTIC adulte	benzoate de sodium + sulfogaiacol		223,17mg / 278,53mg (cuillère à soupe)	sirop							
PNEUMOGEINE	théophylline		10 mg / ml	sirop							
PNEUMOREL	fenspiride		2 mg / ml	sirop							A administrer au début du repas Ne pas croquer, ni écraser le comprimé : matrice hydrophobe Préférez le sirop : 1 cuillère à café = 10 mg 1 cuillère à soupe = 30 mg
			80 mg	comprimé enrobé	 						
POLARAMINE	dexchlorphéniramine		0,1 mg / ml	sirop							A administrer le soir : effet sédatif Préférez le forme sirop : 1 cuillère mesure = 0,5 mg
			2 mg	comprimé sécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
POLERY adulte	codéine + erysimum		11,8 mg / 443 mg (cuillère à soupe)	sirop							
POLERY enfant	erysimum + pholcodine		29,6 mg / 1 mg (ml)	sirop							
POLYDOL	mélange normocalorique, normoprotidique à faible teneur en polyamines, enrichi en ω-3, sans gluten ni lactose		250 ml (265 kcal)	solution buvable 7 saveurs dont soupe							Boisson prête à l'emploi : substitut de repas ou complément alimentaire en cas de douleurs chroniques
				crème 1 saveur							
POLYKARAYA	polyvinyl + polypyrolidone		4 g / 2 g	granulés							A avaler sans croquer au début des repas
POLYPIRINE	acide acétylsalicylique + caféine + reine des prés		1 g	gélule				?	?		
POLYSILANE	diméticone		2,25 g	gel oral							Préférez le comprimé à croquer, écrasé et dissout dans de l'eau
	hydroxyde d'aluminium + siméticone		500 mg / 250 mg	cp à croquer et à sucer							
POMALIDOMIDE ATU	pomalidomide		1 mg	gélule							A administrer intacte, à heure fixe, avec un grand verre d'eau : 2 heures avant ou après un repas Ne pas mâcher, ni ouvrir : cytotoxique femme enceinte
			2 mg	gélule							
			3 mg	gélule							
			4 mg	gélule							
PONATINIB ATU	ponatinib		15 mg	comprimé	 						A administrer en une seule prise, avec un verre d'eau 2 h après un repas léger. Dans les 2 h suivantes ne boire que de l'eau, ne pas manger Ne pas écraser : cytotoxique femme enceinte
PONSTYL	acide méfénamique		250 mg	gélule	 						A administrer au moment des repas
PORTAGEN	mélange lacté complet dont 87 % des lipides sous forme de TCM, enrichi en vitamines		450 g (490kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 9,4 g de poudre à 60 ml d'eau, agitez vigoureusement Traitement nutritionnel des déficits intraluminaux de l'hydrolyse des AG, de l'absorption ou du transport lymphatique des AG, chez l'enfant et l'adulte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
POTABA ATU	para-aminobenzoate de potassium		500 mg	gélule				?	?		Préférer la poudre orale
			3 g	poudre orale							
POTASSIUM BICARB	bicarbonate de potassium		500 mg	gélule							
			1 g	gélule							
POTASSIUM CH	chlorure de potassium		30 mg / ml	sirop							A diluer dans un verre d'eau
			440 mg / 15 ml (sachet dose)	sirop							
			1 g	poudre orale							
POTASSIUM CITRATE	citrate de potassium		1 g	gélule				?	?		
POTASSIUM GLUCON	gluconate de potassium		150 mg / ml	sirop							
POTASSIUM IODURE	iodure de potassium		130 mg	comprimé							
POTASSIUM PERCHLOR PH	perchlorate de potassium		100 mg	gélule							Impossible d'ouvrir ou d'écraser : insoluble dans l'eau et irritant au niveau gastrique
			200 mg	gélule							
POVANYL	pyrvinium embonate		10 mg / ml	susp. buvable							Préférez la suspension buvable ou le Fluvermal® en suspension buvable à 20 mg par ml
			50 mg	comprimé enrobé							
PRACTON	spironolactone		50 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		
			75 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		
PRADAXA	dabigatran		75 mg	gélule							A administrer en une prise, avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir, ni écraser : modification de la pharmacocinétique (risque de saignement)
			110 mg	gélule							
			150 mg	gélule							
PRAMIPEXOL E	pramipexole		0,18 mg	cp bi sécable		?	?		?		A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	pramipexole		0,7 mg	cp bisécable		?	?		?		repas
PRAVADUAL	acide acétylsalicylique + pravastatine		81 mg / 40 mg	comprimé		?	?		?		A administrer de préférence le soir, pendant ou en dehors des repas
PRAVASTATINE	pravastatine		10 mg	comprimé		?	?		?		A administrer de préférence le soir, pendant ou en dehors des repas
			20 mg	comprimé sécable		?	?		?		
			40 mg	comprimé		?	?		?		
PRAXILENE	naftidrofuryl		100 mg	gélule							A administrer au cours du repas, avec un grand verre d'eau Eviter la position allongée après administration
			200 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir, ni écraser : préférez Diactane®, Gevatran® ou Naftilux® Préférez les solutions buvables :
PRAXINOR	cafédrine + théodrine		5 mg / 100 mg	cp pelliculé							d'Effortil® 1 ml = XV gouttes = 7,5 mg ou d'Hept-a-myl® : 1 cp ↔ XV gouttes, XX gouttes = 254 mg → adaptation de la posologie
PRAZEPAM	prazepam		10 mg	comprimé bisécable		?	?		?		
PRAZINIL	carpipramine		50 mg	cp pelliculé sécable							Eviter l'administration vespérale
PRAZOPANT	pantoprazole		20 mg	comprimé enrobé							A avaler intact avec un peu d'eau, avant un repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimé gastro-résistant femme enceinte
PRE BLEDILAIT	mélange lacté complet : protéines solubles, lipides : TCM et AG essentiels		400 g* (80 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesure de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour les prématurés et les nouveaux-nés hypotrophes
PRECYCLAN	méprobamate + bendrofluméthiazide + médroxyprogestérone		200mg/2mg/2,5 mg	comprimé		?	?		?		
			5 mg	cp effervescent							Ne pas croquer le comprimé effervescent : laisser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PREDNISOLONE	prednisolone		20 mg	cp orodispersible							Ne pas croquer le comprimé orodispersible : laissez fondre dans la bouche, puis boire un verre d'eau Dégazez la solution effervescente
			20 mg	cp effervescent sécable							
PREDNISONNE	prednisonne		1 mg	comprimé	 	?	?		?		Comprimés faiblement solubles dans l'eau
			5 mg	comprimé	 	?	?		?		
			20 mg	comprimé	 	?	?		?		
PREFOLIC ATU	méthyltétrahydrofolate		15 mg	comprimé							Ne pas écraser : comprimé gastrorésistant
PRE GALLIA	nutriments à haut rendement énergétique, enrichis en AG essentiels		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Pour les prématurés et nouveaux-nés hypotrophes
			400 g* (70 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PREGESTIMIL	caséine hydrolysée, dextrine-maltose, amidon de maïs ; enrichi en TCM, taurine, L-carnitine, vitamines, minéraux et oligoéléments		425 g* (74 kcal /100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 4,5 g de poudre à 30 ml d'eau Aliment complet équilibré de substitution au lait, dans les syndromes de malabsorption des protéines, des glucides et des lipides
PREGOMINE	mélange complet, sans protéines du lait de vache ni lactose : hydrolysate de collagène de bœuf et isolats de soja		400 g* (75 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 5 g de poudre à 30 ml d'eau faiblement minéralisée Aliment de substitution au lait si APLV, diarrhée à répétition, intolérances (gluten, lactose, fructose, saccharose), colites, grêle court, renutrition postopératoire
PREGUIGOZ	mélange complet : 30 % de TCM, enrichissement et AG ω-3 et 6, apport protidique approprié, densité énergétique élevée, apports élevés en calcium et en phosphore		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de 5,4 g de poudre à 30 ml d'eau Pour les prématurés ou les bébés hypotrophes
			400 g* (81 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PREMILAIT 1 ^{er} Age	préparation lactée issue de l'agriculture biologique, enrichi en bifidus actif		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie à 40°C maximum Pour le nourrisson de la naissance à 1 an
PREMILAIT 2 ^e Age			900 g	poudre orale et entérale							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PREMILAIT CEREALES BEBE RIZ	creme de riz, extrait pur de vanille, teneur garantie en vit B ₁ naturelle, sans sucre ajouté ni gluten		300 g	poudre orale et entérale							Dès 4 mois
PREMILAIT CEREALES BEBE RIZ cacao	farine de riz, cacao, arôme naturel vanille*, vit B ₁ , sans gluten		300 g	poudre orale et entérale							Dès 8 mois
PREMILAIT CONFORT 1 ^{er} Age	lait de croissance issu de l'agriculture biologique, formule épaissie		900 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie à 40°C maximum Formule anti régurgitation de la naissance à 1 an
PREMILAIT CONFORT 2 ^e Age			900 g	poudre orale et entérale							
PREMILAIT CROISSANCE	lait de croissance issu de l'agriculture biologique, enrichi en bifidus actif		400 g	poudre orale et entérale							Mélangez 1 dose de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée tiédie à 40°C maximum Pour l'enfant de 1 à 3 ans
PRE MODILAC EXPERT	lait infantile enrichi en AG polyInsaturés à longue chaîne		90 ml	solution buvable							Mélangez 1 mesurette de poudre à 30 ml d'eau peu minéralisée Bébé prématuré et/ou hypotrophe. Formule avec AGPI-LC oméga 3 et 6
			400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							
PRENIDAL + AGPI-CL	aliment lacté, enrichissement en AG essentiels et en AGPI-CL		400 g* (339 kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Aliment de régime pour nouveau-nés de faible poids de naissance, de "rattrapage" pour le prématuré et l'hypotrophe
PREPACOL	bisacodyl + phosphate disodique + phosphate monosodique		5 mg	solution buvable							Préférez la solution buvable
			5 mg	comprimé enrobé							
PREPARATION H VEINOTONIC	diosmine		300 mg	comprimé		?	?		?		Crise hémorroïdaire : à administrer au cours des repas Insuffisance veineuse : à administrer le matin à jeun, 5 minutes avant le petit déjeuner Préférez la poudre orale de Diosmine® ou la suspension buvable de Diovenor®
PRESTOLE	hydrochlorothiazide + triamtèrene		50 mg / 25 mg	gélule							
PRETERAX	indapamide + périndopril tert-butylamine		0,625 mg / 2,5 mg	comprimé sécable							A administrer le matin avant le repas femme enceinte
PREVISCAN	fluindione		20 mg	cp quadriséable							A administrer toujours au même moment de la journée, de préférence le soir Eviter les aliments riches en potassium : choux, choux-fleurs, brocolis, carottes, crudités, céréales, abats, chocolat, banane, pruneaux, raisins secs, abricots secs femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PREZISTA	darunavir		75 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau ou du lait femme enceinte
			150 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			300 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			400 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			600 mg	cp pelliculé		?	?		?		
PRILIGY	dapoxétine		30 mg	cp pelliculé	 						A administrer entiers, avec un grand verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : goût amer - broyables si administration par sonde entérale
			60 mg	cp pelliculé	 						
PRIMALAN	méquitazine		0,5 mg / ml	sirop							Privilégier la prise vespérale Préférez le sirop
			5 mg	comprimé sécable		?	?		?		
			10 mg	comprimé sécable		?	?		?		
PRIMAQUINE ATU	primaquine		7,5 mg	comprimé							
			15 mg	comprimé							
PRIMOLUT-NOR	noréthistérone		10 mg	comprimé sécable		?	?		?		
PRIMPERAN	métoclopramide		1 mg / ml	solution buvable	 						A administrer avant les repas Préférez les solutions buvables ou la forme suppositoire à 10 et 20 mg
			10 mg	comprimé sécable							
PRIMPERAN ENFANTS	métoclopramide		2,6 mg / ml	solution buvable							
PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS	métoclopramide		2,6 mg / ml	solution buvable							
PRINCI B	vitamines B ₁ + B ₆		250 mg / 50 mg	cp pelliculé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PRINIVIL	lisinopril		5 mg	comprimé sécable		?	?		?		La prise d'aliments ne modifie pas l'absorption
			20 mg	comprimé sécable		?	?		?		 femme enceinte
PRINZIDE	lisinopril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	comprimé sécable		?	?		?		 femme enceinte
PRISTAM	pristinamycine		500 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer au cours d'un repas, avec une boisson Comprimés peuvent être écrasés dans un peu de lait ou un excipient sucré (confiture)
PRITOR	telmisartan		20 mg	comprimé		?	?		?		 femme enceinte
			40 mg	comprimé		?	?		?		
			80 mg	comprimé		?	?		?		
PRITORPLUS	telmisartan + hydrochlorothiazide		40 mg / 12,5 mg	comprimé		?	?		?		 femme enceinte
			80 mg / 12,5 mg	comprimé		?	?		?		
			80 mg / 25 mg	comprimé		?	?		?		
PROCALMIL	millepertuis		250 mg	comprimé		?	?		?		A administrer matin et soir avec un grand verre d'eau A éviter ou arrêter
PROCORALAN	ivabradine		5 mg	cp bisécable							A administrer au cours d'un repas
			7,5 mg	comprimé							
PROCUTA	isotrétinoïne		5 mg	capsule molle							 femme enceinte
			10 mg	capsule molle							
			20 mg	capsule molle							
			40 mg	capsule molle							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PROFENID	kétoprofène		50 mg	gélule							A administrer au cours des repas Principe actif photosensible : administration immédiate Préférez la forme suppositoire à 100 mg ou le Nuroflor® femme enceinte
			100 mg	cp pelliculé							
PROFENID LP	kétoprofène		200 mg	comprimé enrobé							Impossible - comprimé et gélule à libération prolongée Préférez la gélule à 50 mg ou le comprimé à 100 mg → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard) femme enceinte
			200 mg	gélule							
PROGESTERONE	progestérone		100 mg	capsule orale et vaginale							Impossible : à sucer
			200 mg	capsule orale et vaginale							
PROGLICEM	diazoxide		25 mg	gélule							Contenu de la gélule à mélanger avec un aliment : insoluble dans l'eau, soluble à pH alcalin (dosette de bicarbonate, Badoit, Vichy)
			100 mg	gélule							
PROGLYCEM ATU	diazoxide		50 mg / ml	susp. buvable							
PROGRAF	tacrolimus		0,5 mg	gélule							A administrer 1 h avant ou 2 à 3 h après le repas ou toujours aux mêmes heures par rapport aux repas Mélangez le contenu de la gélule à de l'eau avant de l'instiller dans une sonde entérale, ne pas mélanger à de la confiture Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			1 mg	gélule							
			5 mg	gélule							
PROGYNOVA	estradiol		1 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			2 mg	comprimé enrobé							
PROKINYL LP	métoclopramide		15 mg	gélule							Gélule ouvrable mais sans écraser les microgranules
PRONTALGINE	caféine + codéine + paracétamol		50mg/20mg/400 mg	comprimé							Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde entérale Préférez Efférgan® codéiné comprimé effervescent : dégazez la solution

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PROPECIA	finastéride		1 mg	cp pelliculé	 						 femme enceinte
PROPRANOLOL	propranolol		3,75 mg / ml	solution buvable							A administrer avec une boisson, avant un repas Ne pas croquer , ni écraser Préférez la solution buvable : utilisez la pipette doseuse directement dans la bouche, sans être mélangée avec de l'eau ou un aliment
			40 mg	comprimé							
			40 mg	cp quadrisécable							
PROPRANOLOL LP	propranolol		80 mg	gélule						Ne pas croquer , ni écraser : gélules à libération prolongée	
			160 mg	gélule						Préférez la solution buvable de Syprol® (en ATU) → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>	
PROPYLEX	propylthiouracile		50 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer avec un verre d'eau, par voie orale
PROPYLTHIOURACILE ATU	propylthiouracile		50 mg	comprimé							
PRORACYL	propylthiouracile		50 mg	comprimé							A administrer avec un verre d'eau
PROSOFT	millepertuis		300 mg	comprimé enrobé	 	?	?		?		A administrer à heure fixe, avec un grand verre d'eau A éviter ou arrêter
PROSPAN	lierre		7 mg / ml	sirop							
PROSTADIREX	flutamide		250 mg	comprimé enrobé							
PROSTIGMIN ATU	néostigmine		15 mg	comprimé							A avaler tel quel, avec un grand verre d'eau
PROTELOS	strontium ranélate		2 g	granulés pour susp. buvable							
PROTENPLUS DRINK	complément alimentaire oral hypercalorique, hyperprotidique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 6 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
PROTHIADEN	dosulépine		25 mg	gélule	 			?	?		A administrer pendant ou à distance des repas Risque de modification légère du principe actif
			75 mg	comprimé enrobé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PROTICAL	préparation hypocalorique et hyperprotéinée		95 kcal / 25 g	poudre orale 5 saveurs							Ajoutez progressivement 125 ml d'eau fraîche à la poudre, en remuant vigoureusement à la fourchette. Laisser reposer 1 mn et remélanger pour plus d'onctuosité
PROTIDIET	préparation hypocalorique et hyperprotéinée		78 kcal / 25 g	poudre orale saveurs sucrées et salées							
PROTIFAR PLUS	complément alimentaire oral : poudre de protéines goût neutre		11,3 g (42 kcal)	poudre orale et entérale							Alimentation modulaire protidique A saupoudrer sur un aliment ou à diluer dans un liquide
			100 g (380 kcal)	poudre orale et entérale							
PROTIFORTIFIANT	complément alimentaire oral hypercalorique hyperprotidique, sans lactose		250 ml (312 kcal)	solution buvable 7 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
PROTOVIT enfant	vit A + B ₁ + B ₂ + B ₆ + B ₈ + B ₉ + B ₁₂ + C + D ₃ + E + PP + calcium + cuivre + fer + magnésium + manganèse +		1666UI/0,9mg/ 1,1mg/3,5mg/ 1,1mg/0,001mg/ 12mg/45mg/	comprimé à croquer	 						
PROVAMES	estradiol		1 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			2 mg	cp pelliculé	 						
PROVIDEXTRA DRINK	complément alimentaire oral hypercalorique		200 ml (300 kcal)	solution buvable 7 saveurs							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
PROXALYOC	piroxicam		20 mg	poudre orale							
PROZAC	fluoxétine		20 mg	cp dispersible sécable							Préférez la solution buvable : 1 comprimé ↔ 5 ml = 5 mg
			20 mg	gélule	 						
			4 mg / ml	solution buvable							
PROZERO	"lait" de remplacement : mélange de glucides et lipides, hypoprotidique		250 ml	solution buvable							Bien agiter avant d'administrer Chez l'enfant au-delà de 6 mois
			1 000 ml	solution buvable							
PRUNODIET	complément alimentaire oral enrichi en fibres		100 g (137 kcal)	compote							A administrer 90 minutes avant ou après un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PSEUDOPHAGE	alginate de sodium + agar agar		2,5 g / 0,3 g	granulés							Absorption immédiate avant la formation d'un gel
PSYLIA	psyllium		3,6 g	poudre orale effervescente							Dégazez la solution
PULMOBAILLY	codéine + gaïacol		0,08 g / 1,5 g	solution buvable							
PULMODEXANE	dextrométhorphan		3 mg / ml	solution buvable							Comprimé à administrer avec un verre d'eau Préférez la solution buvable Évitez la prise d'alcool
			30 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
PULMOFLUIDE SIMPLE	cinéole + guaifénésine + benzoate de sodium + terpine		1,5mg/30mg/ 300mg/37,5mg (cuillère à soupe)	solution buvable	 						
PULMOSERUM	codéine + gaïacol		0,08 g / 0,5 g	solution buvable							
PULMOSODYL	pholcodine + benzoate de sodium		0,0846 g / 2 g	sirop							
PURINETHOL	mercaptopurine		50 mg	comprimé sécable	 						A administrer en dehors des repas, de préférence après 17 h Ne pas casser, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
PURSENNIDE	sennosides		20 mg	comprimé enrobé							A administrer après le repas du soir
PYLERA	bismuth + métronidazole + tétracycline		140 mg/125 mg/125 mg	gélule							A administrer après le repas avec un grand verre d'eau (250 ml) ou de jus de fruit, en particulier au moment du coucher pour éviter les ulcérations œsophagiennes liées à la tétracycline femme enceinte
PYOSTACINE	pristinamycine		250 mg	cp pelliculé							A administrer au moment des repas Goût très amer : broyage possible si administration par sonde entérale
			500 mg	cp pelliculé sécable							
PYRIDOSTIGMINE	pyridostigmine		30 mg	comprimé							
PYRIMETHAMINE PH	pyriméthamine		5 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
PZA-CIBA ATU	pyrazinamide		250 mg / 5 ml	susp. buvable							
QUESTRAN	colestyramine		4 g	poudre orale							A administrer avant un repas diluée dans un ½ verre d'eau, de jus de fruit ou de lait
QUIETILINE	bromazépam		6 mg	cp quadriséable							
QUINAPRIL	quinapril		5 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer tels quels avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas
			10 mg	cp pelliculé bisécable							
			20 mg	cp pelliculé bisécable							femme enceinte
QUINAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE	quinapril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer en une seule prise femme enceinte
QUINIMAX	cinchonidine + cinchonine + quinidine + quinine		0,85mg/0,85mg/3,3mg/120mg	cp pelliculé bisécable	 						
			3,4mg/3,4mg/13,2mg/480 mg	cp pelliculé bisécable							
QUININE CHL	chlorhydrate de quinine		224,75 mg	comprimé							
			449,5 mg	comprimé							
QUININE SULFATE	sulfate de quinine		217,2 mg	comprimé							
			434,4 mg	comprimé							
QUININE VIT C	quinine + vitamine C		40 mg / 50 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer en une prise le soir
QUINTONINE	cannelle + kola + orange amère + quinquina + quassia + gentiane		0,985g/1,492g/2,549g/0,967g/0,846g/1,11g (100g)	sirop							A administrer avant un repas, pure ou diluée dans un jus de fruit ou une autre solution buvable
QUITADRILL	méquitazine		5 mg	cp bisécable	 						Privilégier les prises vespérales car effet sédatif
			10 mg / ml	solution buvable							
			10 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, de

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
QUITAXON	doxépine		10 mg	sécable							préférence le soir Préférez la solution buvable : 1 goutte = 0,5 mg
			50 mg	cp pelliculé bisécable	 						
RABEPRAZOLE	rabéprazole		10 mg	comprimé enrobé	 						A administrer de préférence avant le petit déjeuner, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés gastrorésistants femme enceinte
			20 mg	comprimé enrobé	 						
RADIOGARDASE ATU	ferricyanure ferrique		0,5 g	gélule				?	?		
RAFTON	budésonide		30 mg	gélule							A administrer 30 minutes avant les repas avec un verre de liquide Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir : gélule contenant des granules gastrorésistants
RALOPHARM	raloxifène		60 mg	cp pelliculé	 						A administrer entier, avec un verre d'eau, avant pendant ou après un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
RALOXIFENE	raloxifène		60 mg	cp pelliculé	 						femme enceinte
RAMIPRIL	ramipril		1,25 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer avant, pendant ou après un repas avec un demi à un verre d'eau femme enceinte
			2,5 mg	cp bisécable	 	?	?		?		
			5 mg	cp bisécable	 	?	?		?		
			10 mg	cp bisécable	 	?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
					■						
RANEXA	ranolazine		375 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			500 mg	comprimé							
			750 mg	comprimé							
RANIPLEX	ranitidine		75 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser les comprimés Préférez les comprimés effervescents dissous dans un verre d'eau : dégazer la solution, principe actif photosensible : administration immédiate
			75 mg	cp effervescent							
			150 mg	cp pelliculé							
			150 mg	comprimé enrobé							
			150 mg	cp effervescent							
			300 mg	cp pelliculé							
			300 mg	comprimé enrobé							
RANITIDINE	ranitidine		75 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser les comprimés Préférez les comprimés effervescents dissous dans un verre d'eau : dégazer la solution, principe actif photosensible : administration immédiate
		®	75 mg	cp effervescent	■						
			150 mg	cp pelliculé	■						
			150 mg	cp effervescent	■						
			300 mg	cp pelliculé	■						
			300 mg	cp effervescent	■						
		■	1 mg / ml	solution buvable	■					A administrer à heure fixe, à distance d'un autre traitement, au cours ou en dehors d'un repas	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RAPAMUNE	sirolimus		1 mg	comprimé enrobé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau ou du jus d'orange Ne pas administrer simultanément du jus de pamplemousse
			2 mg	comprimé enrobé							
RAPHANUS S	radis noir		9,2 ml (10 ml)	solution buvable							
RASILEZ	aliskiren		150 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer à heure fixe, en une seule prise, avec de l'eau, au cours d'un repas léger Les repas riches en graisses diminuent l'absorption de l'aliskiren Ne pas associer à du jus de pamplemousse
			300 mg	cp pelliculé		?	?		?		
RASILEZ HCTZ	aliskiren + hydrochlorothiazide		150 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, en une seule prise, avec de l'eau, au cours d'un repas léger Ne pas croquer , ni écraser Les repas riches en graisses diminuent l'absorption de l'aliskiren Ne pas associer à du jus de pamplemousse
			300 mg / 12,5 mg	cp pelliculé							
			300 mg / 25 mg	cp pelliculé							
REACTINE	cétirizine		10 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		A avaler avec un peu d'eau Préférez Cétirizine® ou Zyrtec® solution buvable ou Virlix® suspension buvable
REALDIET FIBRES	mélange ternaire polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (100kcal/100ml)	flexibag							Mélanges de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (100kcal/100ml)	flexibag							
REALDIET HC	mélange ternaire polymérique hypercalorique, normoprotidique		500 ml (150kcal/100ml)	flexibag							Mélanges de nutrition entérale en cas de besoins énergétiques accrus ou d'hypercatabolisme A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (150kcal/100ml)	flexibag							
REALDIET HP FIBRES	mélange ternaire polymérique hypercalorique,		500 ml (130kcal/100ml)	flexibag							A administrer de préférence avec un régulateur de débit

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
REALDIET HP FIBRES	hyperprotidique, enrichi en fibres		1 000 ml (130kcal/100ml)	flexibag							A administrer de préférence avec un régulateur de débit
REALDIET HP HC	mélange ternaire polymérique hypercalorique, hyperprotidique		500 ml (140kcal/100ml)	flexibag							Mélange de nutrition entérale en cas de besoins protéino-énergétiques accrus ou d'hypercatabolisme A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (140kcal/100ml)	flexibag							
REALDIET LOW ENERGY	mélange ternaire polymérique équilibré hypocalorique		1 000 ml (76 kcal/100 ml)	flexibag							Mélange de nutrition entérale en début de réalimentation, de métabolisme modéré A administrer de préférence avec un régulateur de débit
REALDIET PEDIATRIQUE FIBRES	mélange spécifique pédiatrique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (100kcal/100ml)	flexibag							Mélanges de nutrition entérale pédiatrique à administrer de préférence avec un régulateur de débit
REALDIET PEDIATRIQUE HC	mélange spécifique pédiatrique hypercalorique		500 ml (150kcal/100ml)	flexibag							
REALDIET PEDIATRIQUE STANDARD	mélange spécifique pédiatrique isocalorique, normoprotidique		500 ml (100kcal/100ml)	flexibag							
REALDIET PEPTIDE	mélange ternaire semi-élémentaire isocalorique, enrichi en TCM		500 ml (100kcal/100ml)	flexibag							Mélange de nutrition entérale en cas de malabsorption sévère, pancréatite, maladies inflammatoires du tube digestif A administrer de préférence avec un régulateur de débit
REALDIET RENAL	mélange polymérique hypercalorique, normoprotidique, sans résidus, ni vit A ni lactose ni gluten		500 ml (180kcal/100 ml)	flexibag							A administrer de préférence avec un régulateur de débit Nutrition entérale adaptée aux insuffisants rénaux chroniques et aux dialysés
REALDIET STANDARD	mélange ternaire polymérique isocalorique normoprotidique		500 ml (100kcal/100ml)	flexibag							A administrer de préférence avec un régulateur de débit Nutrition entérale pour les besoins normocataboliques
			1 000 ml (100kcal/100ml)	flexibag							
REBETOL	ribavirine		40 mg / ml	solution buvable							A administrer au moment des repas Préférez la solution buvable Risque toxique pour la lignée rouge : travail sous hotte, port de masque et gants  femme enceinte
			200 mg	gélule	 						
REGIDRAT	soluté de réhydratation		3 g	poudre orale							A administrer en dehors des repas, chez le sujet âgé Sachet de 3 g de poudre effervescente à diluer dans 200 ml d'eau : dégazer la solution

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
REGORAFENIB ATU	régorafénib		40 mg	cp pelliculé							A administrer entier avec de l'eau, à heure fixe, après un repas léger pauvre en graisses femme enceinte
RELPAK	élétriptan		20 mg	cp pelliculé							A avaler entiers avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			40 mg	cp pelliculé							
REMINYL	galantamine		4 mg / ml	solution buvable							A administrer de préférence avec le petit déjeuner et le dîner Préférez la solution buvable ou l'Aricept® en comprimés dispersibles
			4 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			8 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			12 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
REMINYL LP	galantamine		8 mg	gélule	 						A administrer de préférence avec le petit déjeuner et le dîner Gélules à libération prolongée : ouverture possible mais sans croquer, ni mâcher, ni écraser les microgranules
			16 mg	gélule	 						
			24 mg	gélule	 						
RENAGEL	sévélamer		800 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
RENITEC	énalapril		5 mg	cp bisécable	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser : principe actif hygroscopique et protection de l'énalapril par le bicarbonate de sodium de l'enrobage

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			20 mg	cp bisécable							femme enceinte
RENNIE	carbonate de calcium + carbonate de magnésium		272 mg / 80 mg	cp à croquer et à sucer							A administrer au moments des troubles
RENNIE sans sucre	carbonate de calcium + carbonate de magnésium		272 mg / 80 mg	comprimé à croquer							A administrer au moments des troubles
RENNIE DEFLATINE	carbonate de calcium + carbonate de magnésium + diméticone		272mg/80mg/25 mg	comprimé							A administrer au moments des troubles, à distance d'un autre traitement
RENNIELIQUO sans sucre	hydrotalcite		1 g (10 ml)	susp. buvable							Peut se prendre directement en pressant le sachet
RENNIE MENTHE GLACIALE sans sucre	carbonate de calcium + carbonate de magnésium		680 mg / 80 mg	comprimé à croquer							
RENNIE ORANGE	carbonate de calcium + carbonate de magnésium		680 mg / 80 mg	comprimé à croquer							A administrer au moments des troubles
RENUTRYL 500	mélange ternaire polymérique hypercalorique hyperprotidique		375 ml (500 Kcal)	émulsion buvable							Mélange de nutrition entérale ou à boire Par sonde : à administrer de préférence avec un régulateur de débit
RENUTRYL BOOSTER	complément alimentaire oral hypercalorique		300ml (600 kcal)	solution buvable 4 saveurs							Solution conseillée en collation ou à l'heure des repas en supplémentation Agiter avant d'ouvrir, boire frais et déguster lentement
RENUTRYL SANS LACTOSE	boisson nutritive hypercalorique, hyperprotidique		375 ml (600 Kcal)	solution buvable 4 saveurs							Solution prête à boire, de préférence à la sortie du réfrigérateur (la formule chocolatée peut être chauffée)
RENVELA	carbonate de sevelamer		800 mg	cp pelliculé							A administrer entier sans être coupé, ni mâché, ni écrasé Préférez la poudre orale versée dans 60 ml d'eau, à administrer dans les 30 minutes après préparation
			1,6 g	poudre orale							
			2,4 g	poudre orale							
REPAGLINIDE	répaglinide		0,5 mg	comprimé							A administrer avec de l'eau, 15 à 30 minutes avant les repas
			1 mg	comprimé							
			2 mg	comprimé							
			0,25 mg	cp pelliculé							
			0,5 mg	cp pelliculé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
REQUIP	ropinirole		0,5 mg	cp pelliculé							A administrer au cours des repas pour améliorer la tolérance gastro-intestinale Mélanger à du jus de fruit (principe actif instable à pH > 8), puis administration immédiate
			1 mg	cp pelliculé							
			2 mg	cp pelliculé							
			5 mg	cp pelliculé							
REQUIP LP	ropinirole		2 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			4 mg	cp pelliculé							
			8 mg	cp pelliculé							
RESCRIPTOR ATU	délavirdine		200 mg	cp pelliculé							
RESIKALI	polystyrène sulfonate de calcium		500 g	poudre orale et rectale							A administrer au cours des repas, au moins 3 heures après l'absorption d'anti-acides ou de laxatifs, dilué dans de l'eau, du thé ou des boissons non alcoolisées 1 cuillère-mesure = 20 g Par voie rectale, à diluer dans du glucose à 5 % Ne pas associer aux jus de fruits riches en potassium
RESOLOR	prucalopride		1 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser
			2 mg	cp pelliculé							
RESPALIS	mélange ternaire polymérique hypercalorique hyperprotidique		375 ml	poudre goût neutre							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml	poudre goût neutre							
RESPILENE	pholcodine		3 mg / 5 ml	sirop							A administrer au moment des troubles
			1,2 mg / ml	sirop							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RESTRICAL estragon ou noisette	paraffine liquide		85,5 g (100 ml)	solution huileuse							
RETROVIR	zidovudine		100 mg (10 ml)	solution buvable							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser le comprimé, ni ouvrir les gélules Préférez la solution buvable : après ouverture la conserver à +4°C femme enceinte
			100 mg	gélule							
			250 mg	gélule							
			300 mg	cp pelliculé							
RETROVIR NEONAT	zidovudine		100 mg (10 ml)	solution buvable							
REVATIO	sildénafil		10 mg / ml	poudre orale							A administrer au cours ou en dehors d'un repas A diluer dans de l'eau sucrée ou non Préférer la poudre orale : bien agiter la suspension obtenue avant de prélever la dose Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			20 mg	cp pelliculé			?	?	?		
REVIA	naltrexone		50 mg	cp pelliculé bisécable			?	?	?		A administrer avec un grand verre d'eau
REVITALOSE	vitamine C + acide aspartique + leucine + lysine + phénylalanine + valine		1,125 mg / 200 mg / 25 mg / 200 mg / 10 mg / 10 mg	ampoule buvable							A administrer le matin dissous dans un verre d'eau
			1,125 mg / 200 mg / 25 mg / 200 mg / 10 mg / 10 mg	granulés pour solution buvable							
REVLIMID	lénalidomide		5 mg	gélule							A avaler entières avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas, à heure fixe Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser, ni ouvrir
			10 mg	gélule							
			15 mg	gélule							
			25 mg	gélule							
REVOI.ADF	eltrombopag olamine		25 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Ne pas associer la prise de lait, d'aliments riches en

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
REYCELE	calcitonine		50 mg	comprimé							calcium ou en cations polyvalents (fer, calcium, magnésium, aluminium, sélénium et zinc)
REYATAZ	atazanavir		150 mg	gélule	 						A administrer au cours d'un repas entières Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir femme enceinte
			200 mg	gélule	 						
			300 mg	gélule	 						
RHEOBRAL	troxérutine + vincamine		200 mg / 20 mg	gélule							Ne pas croquer, ni ouvrir la gélule
RHEOFLUX	troxérutine		3,5 g	poudre orale							A administrer au cours d'un repas diluées dans un verre d'eau
			3,5 g / 7 ml	solution buvable							
RHINADVIL	ibuprofène + pseudoéphédrine		200 mg / 30 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser femme enceinte
RHINATHIOLtoux sèche	pholcodine		0,6 mg / ml	sirop							A administrer au moment des troubles
			1,2 mg / ml	sirop							
RHINATHIOL enfant nourrisson	carbocistéine		20 mg / ml	sirop							
RHINATHIOL enfant nourrisson sans sucre	carbocistéine		20 mg / ml	sirop							
RHINATHIOL adulte expectorant	carbocistéine		50 mg / ml	sirop							
RHINATHIOL adulte expectorant sans sucre	carbocistéine		50 mg / ml	sirop	 						
RHINATHIOL PROMETHAZINE	carbocistéine + prométhazine		100 mg / 2,5 mg (cuillère mesure)	sirop	 						
RHINATUX	codéine + dexchlorphéniramine		10,58 mg / 1 mg	gélule				?	?		A administrer le soir (effet sédatif)

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RHINOFEBRAL	vitamine C + chlorphénamine + paracétamol		100mg / 3,2mg / 240mg	gélule							A administrer le soir (effet sédatif) avec de l'eau, du lait ou du jus de fruit Goût désagréable : ouverture possible si administration par sonde entérale
RHINOFEBRAL VERVEINE MIEL CITRON	vitamine C + paracétamol + chlorphénamine + codéine		100mg / 500mg / 4mg / 10,58mg	poudre orale							
RHINUREFLEX	ibuprofène + pseudoéphédrine		200mg / 30mg	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser femme enceinte
RHUBADIET	complément alimentaire oral enrichi en fib res		135 kcal / 105 g	compote							A administrer 90 minutes avant ou après un repas
RHUBARBE	rhubarbe		250 mg	comprimé							A administrer au coucher
RHUMAGRIP	paracétamol + pseudoéphédrine		500mg / 30 mg	comprimé							Comprimé à avaler tel quel avec un verre d'eau Goût très amer : broyage possible du comprimé si administration par sonde entérale
RIAMET	artéméther + luméfántrine		20 mg / 120 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours d'un repas ou avec une solution buvable lactée
RIBAMYLASE	α-amylase		200 U CEIP / ml	sirop							Ne pas croquer , ni écraser le comprimé Préférez le sirop
			3 000 U	comprimé							
RIBATRAN	trypsine + ribonucléase pancréatique + chymotrypsinogène		200UAE / 20UAE / 200UAE	comprimé enrobé							A avaler avec un peu d'eau Ne pas croquer , ni écraser
RIBAVIRINE	ribavirine		200 mg	gélule							A administrer en 2 prises quotidiennes au cours du repas Ne pas croquer , ni écraser, ni ouvrir Préférez la solution buvable de Rebetol®
			200 mg	cp pelliculé							
			400 mg	cp pelliculé							
RIFADINE	rifampicine		2 g / 100 ml	susp. buvable							Les gélules doivent être administrées à jeun, au moins ½ h avant un repas Préférez la suspension buvable
			300 mg	gélule				?	?		
RIFATER	isoniazide + pyrazinamide + rifampicine		50mg / 300mg / 120mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer le matin à jeûn, 30 minutes avant la prise d'aliments
RIFINAH	isoniazide + rifampicine		50 mg / 300 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer le matin à jeûn, 30 minutes avant la prise d'aliments

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RILMENIDINE	rilménidine		1 mg	comprimé		?	?		?		
RILUZOLE	riluzole		50 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer à heure fixe matin et soir
RILUTEK	riluzole		50 mg	cp pelliculé		?	?		?		femme enceinte
RIMACTAN	rifampicine		300 mg	gélule							A administrer le matin à jeûn, 30 minutes avant la prise d'aliments Préférez Rifadine® suspension buvable : 1 cuillère mesure = 50 mg
RIMENDIA	éthinyloestradiol + drospérinone		0,02 mg / 3 mg	comprimé	 						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
RIMIFON	isoniazide		50 mg	comprimé							A administrer le matin à jeûn, 30 minutes avant la prise d'aliments, en évitant les produits laitiers ou contenant de la tyramine : fromages affinés, extraits de levure, extraits de soja La solution injectable (amp à 500 mg) est administrable par voie entérale. immédiatement
			150 mg	comprimé							
RIOPAN	magaldrate		800 mg	cp à croquer							A administrer à distance d'un autre traitement
			800 mg / 10 ml	susp. buvable	 						
RISEDRONATE	risédronate		35 mg	cp pelliculé	 						petit déjeuner, avec un grand verre d'eau, en position assise ou debout Ne pas croquer, ni sucer, ni laisser fondre dans la bouche, ni écraser
			75 mg	cp pelliculé							femme enceinte
RISORDAN	dinitrate d'isosorbide		20 mg	cp bisécable							Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser Préférez le patch de Trinitrine® à 5 - 10 ou 15 mg
RISORDAN LP	dinitrate d'isosorbide		20 mg	comprimé							Respecter un intervalle libre de 12 h minimum sur la nuit, sinon échappement thérapeutique
			40 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée et principe actif très explosif
			60 mg	comprimé							Préférez les gélules de Langoran®LP ouvrables mais sans en écraser le contenu

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RISPERDAL	rispéridone		1 mg / ml	solution buvable							A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Préférez la solution buvable diluée dans une solution buvable non alcoolisée : ne pas la mélanger avec du thé
			1 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		
			2 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		
			4 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		
RISPERDALORO	rispéridone		0,5 mg	cp orodispersible							Laissez fondre sur la langue puis avaler avec ou sans eau, au cours ou en dehors d'un repas
			1 mg	cp orodispersible							
			2 mg	cp orodispersible							
			3 mg	cp orodispersible							
			4 mg	cp orodispersible							
			1 mg / ml	solution buvable							
			0,5 mg	cp orodispersible							
			1 mg	cp orodispersible							
			1 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RISPERIDONE	rispéridone		2 mg	cp orodispersible							A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Préférez la solution buvable diluée dans une solution buvable non alcoolisée : ne pas la mélanger avec du thé
			2 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
			3 mg	cp orodispersible							
			4 mg	cp orodispersible							
			4 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
RITALINE	méthylphénidate		10 mg	cp bisécable	 						A administrer au cours des repas Evitez l'après-midi et le soir (nervosité, insomnie)
RITALINE LP	méthylphénidate		10 mg	gélule							A administrer en une prise par jour le matin, au cours ou en dehors d'un repas Gélules à libération prolongée mais ouverture possible sans écraser, diviser ou broyer le contenu et dispersion sur un aliment solide et froid (compote) puis absorption immédiate du mélange
			20 mg	gélule							
			30 mg	gélule							
			40 mg	gélule							
RIVASTIGMINE	rivastigmine		1,5 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau ou un autre liquide Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir
			3 mg	gélule							
			4,5 mg	gélule							
			6 mg	gélule							
RIVOTRIL	clonazépan		2 mg	cp quadrisécable							A administrer au cours des repas Préférez la solution buvable : 1 mg = X gouttes
			2,5 mg / ml	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RO5185426 ATU	vémurafénib		240 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, entier, avec de l'eau Ne pas croquer , ni écraser : cytotoxique femme enceinte
ROCALTROL	calcitriol		0,25 µg	capsule molle							Avalez la capsule avec un peu d'eau, sans la croquer ni sucer Préférez la solution buvable de Dédrogyl® ou d'Un-Alpha® → <i>adaptation de la nosologie</i>
ROCGEL	oxyde d'aluminium		1,212 g / 10 ml	susp. buvable							Absorbz le contenu du sachet pur
ROCMALINE	L arginine + acide malique		413 mg / 1,5 g (10 ml)	solution buvable							A administrer au cours d'un repas diluée dans de l'eau
RODOGYL	spiramycine + métronidazole		0,75 MUI/125mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau
ROMARENE GRANULES	citrate de sodium + combretrum + tartrate de sodium et potassium + pissenlit + romarin		239mg/4,4mg/ 73mg/13mg/ 73mg (cuillère à café)	granulés							A administrer avant les repas ou au moment des troubles Granulés à croquer ou à diluer dans de l'eau
ROMARINEX	romarin + kinkeliba		500 mg / 500 mg (cuillère à café)	solution buvable							A administrer avant un repas, diluée dans de l'eau
ROPINIROLE	ropinirole		0,25 mg	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas pour améliorer la tolérance gastro-intestinale Ne pas croquer , ni écraser
			0,25 mg	cp pelliculé	 						
			0,25 mg	cp pelliculé	 						
			0,5 mg	cp pelliculé							
			0,5 mg	cp pelliculé	 						
			0,5 mg	cp pelliculé	 						
			1 mg	cp pelliculé							
			1 mg	cp pelliculé	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			1 mg	cp pelliculé	  						
			2 mg	cp pelliculé	 						
			2 mg	cp pelliculé	 						
			5 mg	cp pelliculé							
			5 mg	cp pelliculé	 						
ROPINIROLE LP	ropinirole		2 mg	cp pelliculé	 						A administrer intacts, à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			4 mg	cp pelliculé							
			4 mg	cp pelliculé	 						
			8 mg	cp pelliculé							
			8 mg	cp pelliculé	 						
ROTARIX	rotavirus humain vivant atténué souche RIX4414		≥ 50.10 ⁶ DICC/ml	poudre orale							A administrer au cours ou en dehors d'un repas sans diluer
ROTATEQ	rotavirus sérotype G1, rotavirus sérotype G2, rotavirus sérotype G3, rotavirus sérotype G4, rotavirus sérotype P1[8]		≥ 2,2.10 ⁶ UI/2ml ≥ 2,8.10 ⁶ UI/2ml ≥ 2,2.10 ⁶ UI/2ml ≥ 2.10 ⁶ UI/2ml	solution buvable							Aucune précaution particulière vis à vis de la nourriture, des liquides ou du lait maternel
ROVALCYTE	valganciclovir		50 mg / ml	poudre orale							Ne pas croquer, ni mâcher, ni casser , ni broyer le comprimé, préférez la poudre pour solution buvable
			450 mg	cp pelliculé							 femme enceinte : tératogène et carcinogène
			0,375 MUI / 5 ml	sirop							
			1,5 MUI	cp pelliculé							Comprimés à avaler tels quels avec un verre d'eau

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ROVAMYCINE	spiramycine		1,5 MUI	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez le sirop
			3 MUI	cp pelliculé	 						
ROWASA	mésalazine		250 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimés gastro-résistants Préférez la forme suppositoire à 500 mg
			500 mg	comprimé enrobé							
ROXITHROMYCINE	roxithromycine		100 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer 15 minutes avant les repas, avec un verre d'eau
			150 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
RUBOZINC	gluconate de zinc		15 mg	gélule	 						A administrer, avec un verre d'eau, en une prise le matin à jeun ou à distance des repas Contenu de la gélule à mélanger avec de l'eau, compote ou confiture : administration immédiate Ne pas associer aux aliments contenant de l'acide phytique : pain complet, blé, seigle, avoine, orge, germes de soja, grains de maïs, arachide, sésame
RUFOL	sulfaméthizol		100 mg	comprimé		?	?		?		
RULID	roxithromycine		50 mg	cp sécable pour susp. buvable							A administrer avant un repas Attendre désagrégation complète dans de l'eau (30 à 40 secondes) dans une cuillère : les granulés collent aux parois du verre ou du biberon, puis boire de l'eau
			100 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			150 mg	comprimé enrobé	 	?	?		?		
RYTHMODAN	disopyramide		100 mg	gélule	 						Ne pas croquer , ni écraser Préférez les gélules d'Isorhythm®LP mais sans en écraser le contenu
RYTHMODAN I P	disopyramide		250 mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
RYTHMOLAN LI	carbopyrantac		250 mg	bisécable							
RYTHMOL	propafénone		300 mg	comprimé enrobé bisécable							
SABRIL	vigabatrine		500 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avant ou après les repas Administration immédiate après reconstitution de la préparation Préférez la solution buvable, mélangée à de l'eau, du jus de fruit ou du lait
			500 mg	granulés pour solution buvable							
SACOLENE	lacto protéines méthyléniques		500 mg	granulés							A administrer avant les repas, mélangés dans un peu d'eau Peuvent être mélangés à un biberon
			2 g	granulés							
SALAGEN	pilocarpine		5 mg	comprimé enrobé	 						A administrer, avec un peu d'eau, au cours ou immédiatement après un repas et au coucher
SALAZOPYRINE	sulfasalazine		500 mg	comprimé enrobé							A administrer avant les repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimé gastro-résistant
SALBUMOL	salbutamol		2 mg	comprimé sécable	 						
SALICAIRINE	salicaire		1 g (XXX gouttes)	solution buvable							
SANAVI	sans gluten		500 g	farine							
SANDIMMUN	cyclosporine		25 mg	capsule molle							Les capsules peuvent être mâchées Ne pas mélanger à de l'eau ou du jus de pamplemousse Préférez la solution buvable à diluer juste avant administration dans un récipient en verre (et non en plastique) avec du lait, du chocolat, du jus de fruit, du Coca-Cola ou une solution buvable froide
			50 mg	capsule molle							
			100 mg	capsule molle							
			100 mg / ml	solution buvable							
SANDOSOURCE GI CONTROL	mélange ternaire polymérique isocalorique normoprotidique avec fibres		500 ml (100kcal/100ml)								Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
SANMIGRAN	pizotifène		0,5 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
SARGEMAG	carbonate de magnésium + oxyde de magnésium		335 mg / 171 mg	granulés effervescents							A administrer avant ou au cours d'un repas, dissous dans un grand verre d'eau : dégazer la solution

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SARGENOR	arginine		500 mg (5 ml)	solution buvable							A administrer de préférence avant un repas, diluée dans un peu d'eau
			1 g (5 ml)	solution buvable							
SARGENOR sans sucre	arginine		1 g	cp effervescent							A administrer le matin et à midi Dégazez la solution effervescente
			1 g	cp à croquer							
SARGENOR VITAMINE C	arginine + vitamine C		1,5 g / 500 mg	cp à croquer							Dissoudre le comprimé effervescent et diluer la solution buvable dans un grand verre d'eau : dégazez la solution effervescente
			1,5 g / 500 mg	cp effervescent							
			1,5 g / 500 mg (ampoule 5 ml)	solution buvable							
SARVIT A LA GLUCURONAMIDE	vitamine C + caféine + glucuronamide		500mg/50mg/400mg	cp effervescent							Évitez la prise après 16 h Laissez dissoudre complètement dans un verre d'eau : dégazez la solution
SARVIT A LA LYSINE	vitamine C + caféine + lysine		500mg/50mg/400mg	solution buvable							Diluer la solution dans un verre d'eau
SAVARINE	chloroquine + proguanil		100 mg / 200 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer, avec de l'eau, à heures fixes, à la fin du repas du matin ou de midi (toubles du sommeil)
SCANDISHAKE MIX	complément alimentaire oral hypercalorique		85 g (514kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez un sachet de poudre dans 240 ml de lait froid entier, peut s'ajouter à d'autres préparations
SCHOUM	fumeterre + bugrane + piscidia erythrina + sorbitol + alvéine		2,595mg/2,955mg/0,405mg/0,893g/0,255mg (cuillère à soupe)	solution buvable							
SEBIVO	telbivudine		600 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni casser, ni écraser femme enceinte
SECALIP	fénofibrate		100 mg	gélule				?	?		A administrer au cours de l'un des principaux repas
			300 mg	gélule	 			?	?		
SECNOL	secnidazole		2 g	granulés							A administrer, en une prise unique, au début d'un repas Les microgranules peuvent être avalées telles quelles avec une gorgée de liquide ou mélangées à des aliments semi-solides (purée, confiture, yaourt ...)

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SECTRAL	acébutolol		40 mg / ml	solution buvable							A administrer avec une boisson Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser Préférez la solution buvable
			200 mg	cp pelliculé							
			400 mg	cp pelliculé							
SECTRAL LP	acébutolol		500 mg	comprimé							A administrer de préférence le matin Ne pas croquer , ni écraser Préférez la solution buvable → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
SEDALOZIA	aubépine + eschscholtzia + valériane		87mg/51mg/92mg	cp pelliculé		?	?		?		
SEDARENE	paracétamol + codéine		300 mg / 10 mg	gélule							Goût très amer - Préférez Efférgan® codéiné comprimé effervescent : dégazez la solution
SEDASPIR	acide acétylsalicylique + caféine + codéine		500mg/50mg/20mg	comprimé		?	?		?		
SEDATIF TIBER	aubépine + passiflore + bromure de potassium + bromure de sodium		165mg/330mg/132mg/132mg (cuillère à café)	sirop							Contre-indication : sujet âgé dénutri et/ou déshydraté
SEDOPAL	aubépine + eschscholtzia + mélilot		120mg/120mg/120mg	gélule				?	?		
SEGLOR	dihydroergotamine		2 mg / ml	solution buvable							A administrer au milieu des repas, avec un verre d'eau Préférez la solution buvable
			5 mg	gélule							
SEGLOR LYOC	dihydroergotamine		5 mg	poudre orale							A administrer au cours des repas Laissez fondre sous la langue ou dans un 1/2 verre d'eau A administrer au moment du petit déjeuner et du déjeuner
SELEGILINE	deprényl		5 mg	comprimé sécable		?	?		?		Préférez Otrasel® comprimé lyoc à 1,25 mg → <i>adaptation de la posologie</i>
SELENIUM + ZINC	sélénium + zinc		50 µg / 15 mg	comprimé		?	?		?		Ne pas associer aux aliments contenant de l'acide phytique : pain complet, blé, seigle, avoine, orge, germes de soja, grains de maïs, arachide, sésame
SELEXID	pivmecillinam		200 mg	cp pelliculé							Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SELOKEN	métoprolol		100 mg	comprimé sécable							A administrer pendant ou juste après les repas : la prise alimentaire augmente la biodisponibilité du produit Goût désagréable : écrasement du comprimé possible, mais difficile, non recommandé
SELOKEN LP	métoprolol		200 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée Préférez le comprimé à 100 mg → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
SELOZOK LP	métoprolol		23,75 mg	cp pelliculé sécable							Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée
			95 mg	cp pelliculé							
			190 mg	cp pelliculé							
SENOKOT	séné		543 mg (cuillère mesure)	granulés							A administrer à la fin du repas du soir
			7,3 mg	cp pelliculé							
SEPTIDIARYL	nifuroxazide		200 mg	gélule				?	?		A administrer avec un verre d'eau
SERAVIT PEDIATRIQUE	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + E + B ₈ + B ₉ + K + choline + inositol + sodium + potassium + calcium + magnésium + phosphore + zinc + fer + cuivre + manganèse + chrome + molybdène + sélénium + iode		714µg/0,54mg/ 0,75mg/2,9mg/ 0,58mg/1,46mg/ 5,95mg/68mg/ 9,44mg/4,9mg/ 0,036mg/0,051mg/ 0,028mg/59,5mg/ 119mg/<2mg/ g/ traces/437mg/ 60,7mg/291mg/ 7,8mg/11,7mg/ 0,78mg/0,78mg/ 0,023mg/0,059mg/ /0,023mg/ 0,056mg/ (17 g de poudre)	poudre orale							Mélangez 14 g de poudre à 70 ou 140 ml d'eau Supplémentation en vitamines, minéraux et oligo-éléments, chez les nourrissons et enfants, lors de régimes restrictifs
SERC	bétahistine		8 mg	comprimé							A administrer tel quel au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SERECOR LP	hydroquinidine		300 mg	gélule							Gélule ouvrable mais sans en écraser le contenu
SERESTA	oxazéпам		10 mg	comprimé							Comprimés broyés mélangeables à de l'eau ou de la compote
			50 mg	comprimé sécable							
SERMION	nicergoline		5 mg	gélule							A administrer au cours des repas, en position assise Préférez les présentations lyoc à dissoudre dans de l'eau ou une autre solution buvable
			5 mg	lyophilisat oral							
			10 mg	gélule							
			10 mg	lyophilisat oral							
SEROPLEX	escitalopram oxalate		5 mg	cp pelliculé							A administrer en une prise, indépendamment de la prise alimentaire Goût amer : broyage possible si administration par sonde, mélangé à de l'eau ou du jus de pomme Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau 1 comprimé à 10 mg ↔ 0,2 ml de solution (8 mg) Evitez d'associer à du pamplemousse : augmentation de la biodisponibilité
			10 mg	cp pelliculé sécable							
			15 mg	cp pelliculé sécable							
			20 mg / ml	solution buvable							
			20 mg	cp pelliculé sécable							
SEROPRAM	citalopram		20 mg	cp pelliculé sécable							
			40 mg / ml	solution buvable							
SEROXYDAR	hydroxyde d'aluminium + phosphate d'aluminium + gomme guar + hydroxyde de magnésium		500mg/300mg/200mg/500mg	comprimé pour susp. buvable							
SERTRAI INF	sertraline		25 mg	gélule	 			?	?		A administrer, en une fois, avec de l'eau au cours ou en

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			50 mg	gélule	 			?	?		dehors d'un repas
			50 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
SEVIKAR	olmesartan + amlodipine		20 mg / 5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			40 mg / 5 mg	cp pelliculé							
			40 mg / 10 mg	cp pelliculé							
SEVREDOL	sulfate de morphine		10 mg	cp pelliculé sécable	 						A administrer tels quels, avec une petite quantité de solution buvable
			20 mg	cp pelliculé sécable	 						
SHAKE 2	mélange d'AA, contenant de faibles quantités de phénylalanine, enrichi en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligo-éléments		50 g	poudre orale et entérale							Diluer 1 sachet dans 100 ml d'eau Supplémentation protéique dans la phénylcétonurie et l'hyperphénylalaninémie, à partir de 8 ans
SHAKE 3			50 g	poudre orale et entérale							
SIBELIUM	flunarizine		10 mg	comprimé sécable		?	?		?		A administrer le soir au coucher (sommolence)
SIFROL	pramipexole		0,18 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer, avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas
			0,7 mg	cp bisécable		?	?		?		
SIFROL LP	pramipexole		0,26 mg	cp bisécable							A administrer à heure fixe, en une seule prise, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			0,52 mg	cp bisécable							
			1,05 mg	cp bisécable							
			2,1 mg	cp bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SIKLOS	hydroxycarbamide	®	100 mg	cp pelliculé							A administrer entier ou ½ ou ¼ de cp, en une prise le matin avant le petit déjeuner, avec un verre d'eau ou une très petite quantité d'aliments
		®	1 g	cp pelliculé quadrisécable							femme enceinte
SILIGAZ	siméticone		250 mg	capsule molle							A administrer, avec un verre d'eau, avant ou après les principaux repas
SILIPRELE	prêle		250 mg	capsule molle							A administrer, avec un grand verre d'eau, avant les repas
SILODYX	silodosine		4 mg	gélule							A administrer à heure fixe, telle quelle, pendant un repas, avec un verre d'eau
			8 mg	gélule							Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir
SIMVASTATINE	simvastatine		10 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer en une prise unique le soir
			20 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
			40 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
SINEMET	lévodopa + carbidopa		100mg/10mg	comprimé sécable							A administrer à la fin des repas ou avec un peu de nourriture
			250mg/25mg	comprimé sécable							Eviter les aliments riches en pyridoxine : abats, viande, poisson, légumes verts, fruits, céréales Administration immédiate
SINEMET LP	lévodopa + carbidopa	®	100mg/25mg	comprimé							A administrer à la fin des repas ou avec un peu de nourriture Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser : comprimés à libération prolongée
		®	200 mg / 50 mg	comprimé							Eviter les aliments riches en pyridoxine : abats, viande, poisson, légumes verts, fruits, céréales Préférez le broyage des comprimés sécables, administration immédiate → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SINGULAIR	montélukast		4 mg	granulés							A administrer le soir : - comprimé à croquer : 1 h avant ou 2 heures après le repas - comprimé pelliculé : avec ou sans aliment - granulés : dans les 15 minutes après ouverture du sachet, directement dans la bouche (sans dissoudre dans du liquide) puis absorption de boissons, ou mélangés avec une cuillère de nourriture semi-liquide froide ou à température ambiante (compote de pommes, glace, carottes et riz)
			5 mg	cp à croquer							
			10 mg	cp pelliculé							
SINTROM	acénocoumarol		4 mg	cp quadriséculaire						A administrer, avec un verre d'eau, de préférence le soir si prise unique Eviter les aliments riches en vitamine K : foie, abats, œuf, persil, épinards, choux, choux-fleurs, navet, choucroute, brocolis, épinards, salade verte, avocat, carotte, fenouil, tomate femme enceinte	
SIRDALUD ATU	tizanidine		4 mg	comprimé sécable	?	?		?		femme enceinte	
SKELID	acide tiludronique		200 mg	comprimé		?			?	A administrer en une prise, avec un verre d'eau, 2 heures avant ou après les repas Evitez les aliments riches en calcium ou la prise de protecteurs anti acides	
SKENAN LP	sulfate de morphine		10 mg	gélule						A mélanger avec de la purée, de la confiture, du yaourt ou de la compote Gélules ouvrables mais sans écraser les microgranules à libération prolongée Possible avec des sondes ≥ 16 Fr, puis bien rincer avec 30 à 50 ml d'eau Préférez une autre spécialité	
			30 mg	gélule							
			60 mg	gélule							
			100 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
SMECTA	diosmectite		3 g (sachet)	poudre orale						Poudre à délayer dans un ½ verre d'eau et à administrer après les repas (œsophagites) ou 2 heures après les repas (autres indications)	
SOD ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans méthionine ni cystine, enrichi en glucides, lipides, vitamines, minéraux, oligo-éléments et prébiotiques		400 g	poudre orale et entérale						Diluer 15 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement diététique des déficits en sulfite oxydase jusqu'à 1 an et en supplémentation de 1 à 3 ans	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SODIUM CHL	chlorure de sodium		500 mg	gélule							
			1 g	poudre orale							
			1 g	gélule							
SODIUM CITRATE	citrate de sodium		1 g	gélule							
SODIUM AMINO-4 PH	sodium amino-4 salicylé		2 g	poudre orale							
SODIUM CHLOROPROPIONATE PH	chloropropionate de sodium		3 g	poudre orale							
SOLACY	L-cystine + vit A + saccharomyces cerevisiae + soufre		36,3mg/1 000UI/ 38,7mg/11mg	comprimé pour susp. buvable							A administrer au cours des repas Préférez la suspension buvable : comprimé à dissoudre dans un peu d'eau ou tout autre liquide froid 2 gélules ↔ 1 comprimé pour suspension buvable
			72,6mg/1 650UI/ 77,4mg/22mg	gélule				?	?		
SOLIAN	amisulpride		100 mg / ml (60 ml)	solution buvable	 						Si dose < 400 mg : à administrer en une prise Si dose > 400 mg : à administrer en 2 prises Préférez la solution buvable
			100 mg	comprimé sécable	 						
			200 mg	comprimé sécable	 						
			400 mg	comprimé sécable	 						
SOLMUCOL	acétylcystéine		100 mg	comprimé à sucer							Ne pas croquer le comprimé : le laisser fondre sous la langue Préférez les formes buvables dissoutes dans un ½ verre d'eau
			100 mg	granulés pour solution buvable							
		 	25 mg / ml	poudre pour solution buvable							
			200 mg	granulés pour solution buvable							
			400 mg	granulés pour solution buvable							
SOLUCETYL	acide acétylsalicylique + vitamine C		500 mg / 200 mg	cp effervescent						Dégagez la solution	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SOLUFEN	ibuprofène		200 mg	gélule							A administrer, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser Préférer Nureflex® suspension buvable  femme enceinte
SOLUPRED	prednisolone		1 mg / ml	solution buvable							Comprimés à administrer au cours des repas Dissoudre les comprimés effervescents et le comprimé orodispersible à 5 mg (ne pas croquer pour éviter l'amertume) dans un verre d'eau : dégazer la solution Laissez fondre le comprimé à 20 mg dans la bouche, puis l'avaler et boire de l'eau
			5 mg	cp effervescent							
			5 mg	cp orodispersible							
			20 mg	cp effervescent							
	20 mg		cp orodispersible								
SOM PROTEINE	aliment hyperprotidique		420 g (328kcal/100g)	poudre orale et entérale							
SONDALIS ENERGY	mélange nutritif hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω-3		500 ml (785 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients hypercataboliques ou nécessitant une restriction hydrique A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 570 kcal)	SmartFlex							
SONDALIS ENERGY FIBRE	mélange nutritif polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω-3 et en fibres		500 ml (800 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients hypercataboliques ayant des besoins accrus en protéines A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 600 kcal)	SmartFlex							
SONDALIS HP ENERGY	mélange nutritif polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω-3		500 ml (750 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients hypercataboliques ayant des besoins accrus en protéines A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 500 kcal)	SmartFlex							
SONDALIS HP ENERGY FIBRE	mélange nutritif polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en ω-3 et en fibres		500 ml (665 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients hypercataboliques ayant des besoins accrus en protéines A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 330 kcal)	SmartFlex							
SONDALIS G	mélange nutritif polymérique isocalorique, normoprotidique, riche en AG mono-insaturés et réduit en AG saturés		500 ml (500 kcal)	dripac flex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients présentant des troubles du métabolisme glucidique A administrer de préférence avec un régulateur de débit
			1 000 ml (1 000 kcal)	dripac flex							
SONDALIS STANDARD	mélange nutritif polymérique		500 ml (500 kcal)	SmartFlex							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SONDALIS STANDARD	isocalorique, normoprotidique		1 000 ml (1 000 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour des patients normocataboliques dénutris ou à risque de dénutrition A administrer de préférence avec un régulateur de débit
SONDALIS STANDARD FIBRE	mélange nutritif polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres		500 ml (515 kcal) 1 000 ml (1 030 kcal)	SmartFlex							
SONDALIS T	mélange nutritif polymérique isocalorique, normoprotidique, enrichi en fibres (gomme de guar)		500 ml (560 kcal) 1 000 ml (1 120 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients hypercataboliques ayant des besoins accrus en protéines et présentant des diarrhées A administrer de préférence avec un régulateur de débit
SONDALIS T ENERGY	mélange nutritif polymérique hypercalorique, hyperprotidique, enrichi en fibres (gomme de guar)		500 ml (774 kcal) 1 000 ml (1 548 kcal)	SmartFlex							Mélanges de nutrition entérale pour les patients hypercataboliques ayant des besoins accrus en protéines et présentant des diarrhées A administrer de préférence avec un régulateur de débit
SOPHIDONE LP	hydromorphe		4 mg	gélule							A administrer entières, sans être mâchées (gélules à libération prolongée) ou directement avec de la compote, de la confiture, du yaourt ou de la purée
			8 mg	gélule							
			16 mg	gélule							
			24 mg	gélule							
SORBITOL	sorbitol		5 g	poudre orale							A administrer, dissoute dans un ½ verre d'eau : - si constipation : le matin à jeun - troubles dyspeptiques : avant les repas ou au moment des troubles
SORIATANE	acitrétine		10 mg	gélule							A administrer en une prise journalière, au cours d'un repas Ne pas ouvrir la gélule : photo-oxydation du principe actif tératogène femme enceinte
			25 mg	gélule							
SOTALEX	sotalol		80 mg	comprimé sécable							A administrer de préférence le matin, avec une boisson Ne pas croquer, ni écraser
			160 mg	comprimé sécable							
SOTALOL	sotalol		80 mg	comprimé sécable							Evitez la prise concomitante de laitages
			160 mg	comprimé sécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SP 95	poudre de protéines de haute valeur nutritionnelle		750 g	poudre orale et entérale							Alimentation modulaire protidique A saupoudrer sur un aliment ou à diluer dans un liquide
SPAGULAX	ispaghul		2,143 g	poudre orale effervescente							A administrer avant ou après chacun des principaux repas Evitez la position allongée Dissoudre dans un grand verre d'eau, agiter et boire immédiatement : dégazez la solution effervescente
SPAGULAX sans sucre	ispaghul		2,143 g	poudre orale effervescente							
SPAGULAX CITR POTASS	ispaghul + citrate de potassium		2,6 g / 0,44 g (cuillère à café)	granulés							
SPAGULAX MUCILAGE	ispaghul		7 g	granulés							
SPAGULAX SORBITOL	ispaghul + sorbitol		5,6 g / 3,8 g	granulés							
SPANOR	doxycycline		100 mg	cp pelliculé sécable	 						A administrer en une prise, avec un ½ verre d'eau, au milieu du repas, au moins une heure avant le coucher
SPASFON	phloroglucinol + triméthylphloroglucinol		80 mg / 80 mg	comprimé enrobé							A administrer en une prise, avec un ½ verre d'eau, au milieu du repas, au moins une heure avant le coucher Laissez fondre le comprimé lyoc sous la langue ou le dissoudre dans un verre d'eau, au moment de la crise Forme suppositoire (150 mg)
SPASFON LYOC	phloroglucinol		80 mg	lyophilysat oral							
			160 mg	lyophilysat oral							
SPASMAG	sulfate de magnésium + saccharomyces cerevisiae		1,2 mg / 100 mg (ampoule 5 ml)	solution buvable							A administrer, avec un peu d'eau, avant ou au cours des repas Gélule ouvrable : mélangez le contenu avec du liquide
			419,5 mg / 50 mg	gélule							Préférez la suspension buvable : 1 ampoule ↔ 2 gélules
SPASMINE	valériane + aubépine		120 mg / 100 mg	comprimé enrobé	 						
SPASMOCALM	phloroglucinol		80 mg	cp orodispersible							A administrer au moment de la crise, en laissant fondre sous la langue ou après dissolution dans de l'eau
SPASMODEX	dihexyvérine		100 mg	comprimé							Préférez la forme suppositoire à 50 mg
SPASMOPRIV	mébévérine		100 mg	comprimé sécable							A administrer, avec un grand verre d'eau, avant les repas
			200 mg	gélule							Préférez Duspatalin® en suspension buvable : 1 gélule à 100 mg ↔ 10 ml
SPASSIREX	phloroglucinol		80 mg	comprimé							Comprimé à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue ou à avaler tel quel

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SPECIAFOLDINE	vitamine B ₉		0,4 mg	comprimé							Goût amer : broyable si administration par sonde entérale
			5 mg	comprimé							
SPEDIFEN	ibuprofène		200 mg	comprimé							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser femme enceinte
			400 mg	comprimé enrobé							
SPEVIN	cascara + cassier amer		260 mg / 10 mg	gélule				?	?		
SPIFEN	ibuprofène		200 mg	comprimé							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser Préférez la solution buvable : boire immédiatement après dissolution complète femme enceinte
			400 mg	cp pelliculé							
			400 mg	granulés pour solution buvable							
SPIRAMYCINE	spiramycine		3 MUI	cp pelliculé							Préférez la Rovamycine® en sirop ou en granulés
SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE	spiramycine + métronidazole		750000UI / 125mg	cp pelliculé							A administrer au cours des repas
			1,5 MUI / 250 mg	cp pelliculé							
SPIROCTAN	spironolactone		50 mg	gélule				?	?		
			75 mg	gélule				?	?		
SPIROCTAZINE	spironolactone + altizide		25 mg / 15 mg	comprimé enrobé		?	?		?		
SPIRONOLACTONE PH pour les gélules	spironolactone		2,5 mg	gélule				?	?		A administrer au cours du repas Mettre en suspension le comprimé écrasé dans du sirop pour favoriser la mise en suspension
			10 mg	gélule				?	?		
			50 mg	cp pelliculé							
			50 mg	comprimé sécable							
			75 mg	cp pelliculé sécable							
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE	spironolactone + altizide		25 mg / 15 mg	cp pelliculé sécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SPIRONONE	spironolactone		75 mg	cp pelliculé		?	?		?		
SPLENOCARBINE	charbon activé		170 mg / ml	granulés à croquer							Préférez Carbomix® → <i>adaptation de la posologie</i>
SPORANOX	itraconazole		10 mg / ml	solution buvable							A administrer en dehors des repas, immédiatement après les repas pour la gélule Préférez la solution buvable : attendre 1 h avant la prise d'aliments Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			100 mg	gélule							
SPOTOF	acide tranexamique		1 g / 10ml	solution buvable							Préférez la solution buvable
			500 mg	cp pelliculé		?	?		?		
SPRYCEL	dasatinib		20 mg	cp pelliculé							A administrer pendant ou en dehors des repas A manipuler avec des gants Si un comprimé est cassé : se laver les mains abondamment à l'eau et au savon femme enceinte
			50 mg	cp pelliculé							
			70 mg	cp pelliculé							
			100 mg	cp pelliculé							
			140 mg	cp pelliculé							
SRO OMS/UNICEF	glucides + sodium + potassium + citrates		20g/75mmol/20 mmol/10mmol (par litre)	poudre orale et entérale							Solution de réhydratation orale à diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
SS DUOCAL	complément nutritionnel énergétique : mélange de glucides et lipides		400 g	poudre orale et entérale							Peut être ajouté à l'alimentation pour nourrissons, ainsi qu'aux plats chauds et froids
STABLON	tianeptine		12,5 mg	comprimé enrobé							A administrer, mélangé à de l'eau ou un aliment, au début des principaux repas Administration immédiate

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
STAGID	embonate de metformine		700 mg	comprimé sécable							A administrer au cours ou à la fin d'un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Goût amer : broyage possible si administration par sonde entérale. Sinon poudre orale de Glucophage® diluée dans 150 ml d'eau : administration immédiate
STALEVO	carbidopa + entacapone + lévodopa		50mg / 12,5mg / 200mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			75mg / 18,75mg / 200mg	cp pelliculé							
			100mg / 25 mg / 200mg	cp pelliculé							
			125mg / 31,25mg / 200mg	cp pelliculé							
			150mg / 37,5mg / 200mg	cp pelliculé							
			175mg / 43,75mg / 200mg	cp pelliculé							
	200mg / 50mg / 200mg	cp pelliculé									
STEDIRIL	éthinyloestradiol + norgestrel		0,5 mg / 0,05 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
STEROXYL 15A	vitamine D ₂		600 000 UI (1,5ml)	solution buvable							Ne pas boire pur : à diluer dans de l'eau, du lait ou du jus de fruit Rincez la forme H avec du lait (solution huileuse) 1 goutte = 400 U
STEROXYL	vitamine D ₂		20 000 UI / ml	solution buvable							
STEROXYL H	vitamine D ₂		600 000 UI (1,5ml)	solution buvable et injectable IM							
STILNOX	zolpidem		10 mg	cp pelliculé sécable							A administrer immédiatement avant le coucher Photo-oxydation du principe actif Administrable par voie sub-linguale
STIMOL	malate de citrulline		1 g / 10 ml	solution buvable							A diluer dans un verre d'eau car pH acide
STIMULANCE	poudre de fibres alimentaires		12,6 g	poudre orale goût neutre							
			400 g	poudre orale goût neutre							
STOMEDINE	cimétidine		200 mg	cp effervescent							A administrer avant les repas ou au coucher A dissoudre dans un ½ verre d'eau : dégazer la solution
			10 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
STRATTERA	atomoxétine		18 mg	gélule							A administrer à heure fixe, au cours ou après un repas
			25 mg	gélule							
			40 mg	gélule							
			60 mg	gélule							
STRENGOR 2	complément alimentaire oral hyperprotidique		200 g (300 kcal)	crème 1 saveur						A administrer 90 minutes avant ou après un repas	
STRESAM	étifoxine		50 mg	gélule							Goût amer de la poudre peu soluble, contenue dans la gélule, bien agiter la suspension Risque allergique au contact de la peau ou des yeux
STROMEKTOL	ivermectine		3 mg	comprimé							A administrer en une prise unique 2 h à distance des repas A dissoudre dans de l'eau
STRUCTUM	chondroïtine		500 mg	gélule							A administrer telle quelle, avec un grand verre d'eau, au cours des repas
SUBOLIGO	cuivre – or – argent		0,429mg / 0,015mg	cp sublingual							Laissez fondre sous la langue sans croquer
	cuivre		0,426 mg	cp sublingual							
	magnésium		8,52 mg	cp sublingual							
	manganèse – cuivre – cobalt		0,405mg / 0,357mg	cp sublingual							
	manganèse - cuivre		0,405mg / 0,357mg	cp sublingual							
	phosphore		1,157 mg	cp sublingual							
	sélénium		0,109 mg	cp sublingual							
	soufre		0,387 mg	cp sublingual							
	zinc		0,697 mg	cp sublingual							
	zinc – nickel - cobalt		0,348mg / 0,385mg	cp sublingual							
SUBROXINE	roxithromycine		150 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SUBUTEX	buprénorphine		0,4 mg	cp sublingual							Comprimés à faire fondre sous la langue sans croquer
			2 mg	cp sublingual							
			8 mg	cp sublingual							
SUCCICAPTAL	succimer		200 mg	gélule							
SUCCINIMIDE	succinimide		3 g	poudre orale							A administrer avant les repas, dissoute dans un grand verre d'eau sucrée ou non
SUCRAID ATU	sacrosidase		8 500 U / ml	solution buvable							
SUDAFED	pseudoéphédrine		60 mg	comprimé enrobé	 						
SULFARLEM	anétholtrithione		12,5 mg	comprimé							A administrer 30 minutes avant le repas
			25 mg	comprimé enrobé							
SULPIRIDE	sulpiride		25 mg (5 ml)	solution buvable							Préférez la solution buvable
			50 mg	gélule							
			200 mg	comprimé sécable	 						
SUMATRIPTAN	sumatriptan		50 mg	cp pelliculé bisécable	 						A administrer tel quel Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SUPRADYNE DOUBLE ACTION	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + D ₃ + E + B ₈ + B ₉ + K + calcium + magnésium + zinc + fer + cuivre + manganèse + chrome + molybdène + sélénium + potassium + iode		800µg / 4,2mg / 4,8mg / 18mg / 2mg / 0,003mg / 54mg / 180mg / 0,005mg / 10mg / 0,03mg / 0,2mg / 0,025mg / 120mg / 80mg / 8mg / 14mg / 0,9mg / 1,8mg / 0,025mg / 0,045mg / 0,05mg / 20,4mg / 0,07mg	cp effervescent							Dégagez la solution
SUPRADYNE VITAL 50	vitamines A + B ₁ + B ₂ + B ₅ + B ₆ + B ₁₂ + PP + C + E + B ₈ + B ₉ + calcium + magnésium + zinc + fer + cuivre + manganèse + chrome + molybdène + iode		400µg / 1,4mg / 1,6mg / 6mg / 2mg / 0,01mg / 18mg / 60mg / 10mg / 0,075mg / 0,2mg / 160mg / 120mg / 6mg / 5,6mg / 1mg / 1,4mg / 0,025mg / 0,060mg / 0,060mg	cp effervescent							
SURBRONC	ambroxol		30 mg (cuillère à café)	solution buvable							Préférez la solution buvable : 1 comprimé ↔ 1 cuillère à café = 30 mg
			30 mg	granulés							
			30 mg	comprimé sécable		?	?		?		
			60 mg	granulés							
SURELEN	vitamine B ₆		50 mg	solution buvable							Prendre les 2 ampoules mélangées et diluées dans un peu d'eau, au début du repas du matin ou de midi
	adénosine phosphate + acide aspartique + vitamines PP + C		5mg / 500mg / 102,35mg / 147,65mg	solution buvable							
SURFORTAN	L-lysine dihydrogénophosphate + L-lysine L-aspartate + L-lysine L		250mg / 250mg / 10mg / 60mg	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
SURGAM	acide tiaprofénique		100 mg	comprimé sécable							A administrer au cours des repas Comprimés délitables dans l'eau, à avaler tels quels ou dissous dans un grand verre d'eau
			200 mg	comprimé sécable							
SURGESTONE	promégestone		0,125 mg	comprimé		?	?		?		
			0,25 mg	comprimé		?	?		?		
			0,5 mg	comprimé		?	?		?		
SURMONTIL	trimipramine		40 mg / ml	solution buvable							A administrer en une prise unique, pendant ou à distance des repas Administration le soir facilite le sommeil Préférez la solution buvable
			25 mg	comprimé							
			100 mg	cp pelliculé sécable							
SURQUINA	quinine		250 mg	cp pelliculé sécable							
SURVIMED OPD	mélange ternaire semi-élémentaire isocalorique normoprotidique, hypolipidique		500 ml (500 kcal)	easybag							Mélange de nutrition entérale A administrer de préférence avec un régulateur de débit
SURVITINE	vitamines A + B ₁ + B ₆ + B ₈ + B ₁₂ + C + D ₃ + E + PP + cobalt + cuivre + manganèse + zinc + molybdate		1250UI/5mg/ 2,5mg/0,25mg/ 125µg/62,5mg/ 75UI/0,25mg/ 12,5mg/0,125mg/ /0,5mg/0,25mg/ 0,25mg/0,0625mg	capsule molle							
SUSTIVA	efavirenz		30 mg / ml	solution buvable							A administrer à jeun, puis prendre un repas pauvre en lipides : l'administration avec des aliments augmente les effets indésirables L'administration le soir diminue les effets indésirables neurologiques Préférez la solution buvable , mais ouverture soigneuse des gélules possible : mélangez le contenu avec 1 à 2 cuillères à café de compote de pomme, gelée de raisin, yaourt ou de lait maternisé : administration au maximum dans les 30 minutes qui suivent
			50 mg	gélule							
			100 mg	gélule							
			200 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			600 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		femme enceinte
SUTENT	sunitinib		12,5 mg	gélule							A administrer au cours ou en dehors d'un repas
			25 mg	gélule							femme enceinte
			50 mg	gélule							
SYLVIANE	gestodène + éthinyloestradiol		60 µg / 15 µg	comprimé	 						Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
SYMMETREL ATU	amantadine		50 mg / 5 ml	sirop							
SYMPATHYL	eschscholtzia + aubépine + oxyde de magnésium		20mg/75mg/ 124,35mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avant les repas
SYMPAVAGOL	passiflore + aubépine		40 mg / 20 mg	comprimé		?	?		?		Préférez la solution buvable
			1,23 g / 0,3 g (5 ml)	solution buvable							
SYNEDIL	sulpiride		5 mg / ml	solution buvable							Préférez la solution buvable : IV gouttes = 4 mg
			50 mg	gélule				?	?		
SYNEDIL FORT	sulpiride		200 mg	comprimé		?	?		?		
SYPROL ATU	propranolol		5 mg / 5 ml	solution buvable							
			10 mg / 5 ml	solution buvable							
TABLETTES DOPS	bicarbonate de sodium + carbonate de calcium + carbonate de magnésium + hydroxyde de magnésium + phosphate tricalcique + dioxyde de titane		100mg/330mg/ 330mg/15mg/ 10mg/5mg	comprimé		?	?		?		
TADENAN	prunier d'Afrique		50 mg	capsule molle							A administrer avant les repas
			200 mg	cp pelliculé		?	?		?		La prise vespérale unique améliore l'efficacité

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TAGAMET	cimétidine		200 mg	cp effervescent							Les comprimés pelliculés sont à avaler avec un peu d'eau La solution injectable peut être diluée dans de l'eau et administrée par voie orale (goût amer) ou entérale Eviter la prise concomitante de laitages Dégagez les solutions effervescentes
			400 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		
			800 mg	cp effervescent							
TAHOR	atorvastatine		10 mg	cp à croquer							A administrer en une prise unique, au cours ou en dehors d'un repas
			10 mg	cp pelliculé	 						
			20 mg	cp à croquer							
			20 mg	cp pelliculé	 						
			40 mg	cp pelliculé	 						
			80 mg	cp pelliculé	 						
TAKADOL	tramadol		100 mg	cp effervescent bisécable							A dissoudre dans un verre d'eau Dégagez la solution
TAKETIAM	céfotiam hexétil		200 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avant un repas, avec un grand verre d'eau pour éviter d'éventuelles manifestations digestives
TALOXIA	felbamate		400 mg	comprimé		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'un repas Préférez la suspension buvable : 1 graduation de la cuillère-mesure ↔ 150 mg
			600 mg	comprimé		?	?		?		
			600 mg / 5 ml	susp. buvable							
TAMARINE	séné + tamarin		240 mg / 11,7 mg	gélule				?	?		A administrer de préférence le soir, après le dîner
TAMIFLU	oseltamivir		6 mg / ml	poudre orale							
			30 mg	gélule							
			45 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			75 mg	gélule							
TAMIK	dihydroergotamine		3 mg	capsule molle							A administrer au cours des repas Préférez Ikaran® ou Seglor® en gouttes : 1 mg = X gouttes ou Seglor® Ivoc à 5 mg
TAMOXIFENE	tamoxifène		10 mg	comprimé	 	?	?		?		femme enceinte
			20 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
			30 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
TAMSULOSINE LP	tamsulosine		0,4 mg	comprimé							A administrer à la fin du petit déjeuner ou du 1^{er} repas de la journée
			0,4 mg	gélule							Ne pas croquer ni ouvrir , ni écraser : microgranules à libération prolongée
TANAKAN	ginkgo biloba		40 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, avec un 1/2 verre d'eau
			40 mg	comprimé enrobé	 						Préférez la solution buvable diluée dans de l'eau : 1 dose = 1 ml = 40 mg d'extrait pur ↔ 1 comprimé
TANATRIL	imidapril		5 mg	cp bisécable							A administrer à heure fixe, environ 15 minutes avant un repas
			10 mg	cp bisécable							femme enceinte
TANGANIL	acétylleucine		500 mg	comprimé							
TARANIS LEUCINADE	mélange nutritif complet sans leucine, ni isoleucine, ni valine		454 g (410kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 40 g de poudre avec 180 ml d'eau Indiqué si leucinose, à partir de 1 an
TARANIS LEUCINADE INTEGRAL	mélange à 100 % d'AA sans leucine ni isoleucine, ni valine		12,5 g (1416kcal/100g)	poudre orale et entérale							Indiqué sileucinose, à partir de de 3 ans
TARANIS PHENYLADE	mélange nutritif complet sans phénylalanine, enrichi en AG (EPA et DHA)		400 g* (71,7kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 1 mesurette de 5 g de poudre avec 30 ml d'eaus Indiqué si phénylcétonurie, de la naissance à 1 an

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TARANIS PHENYLADE MIX vanille ou fraise	mélange nutritif complet sans phénylalanine, enrichi en AG (EPA et DHA)		454 g (410kcal/100g)	poudre orale et entérale 2 saveurs							Mélangez 1 mesurette de 40 g de poudre avec 180 ml d'eaus Indiqué si phénylcétonurie, à partir de 1 an
TARANIS PHENYLADE 40	mélange nutritif complet hypoprotidique, sans phénylalanine, enrichi en vitamines et oligo-éléments		25 g (338 kcal/100 g)	poudre orale et entérale goût neutre							Mélangez en remuant 1 sachet de poudre avec 120ml de liquide (eau, soda, sirop...). Agitez avant de boire A consommer frais ou à température ambiante Indiqué si phénylcétonurie, à partir de 8 ans
TARANIS PHENYLADE INTEGRAL	mélange à 100 % d'AA sans phénylalanine		12,5 g (333 kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Indiqué si phénylcétonurie, à partir de 3 ans
TARCEVA	erlotinib		25 mg	cp pelliculé	 						A administrer au moins une heure avant ou deux heures après un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
			100 mg	cp pelliculé	 						
			150 mg	cp pelliculé	 						
TARDYFERON	sulfate ferreux		80 mg	comprimé enrobé							A administrer avec un verre d'eau avant ou pendant les repas selon la tolérance digestive Ne pas croquer, ni écraser : goût d'oxyde de fer très prononcé, comprimés gastro résistants
TARDYFERON B ₆	sulfate ferreux + vitamine B ₆		50 mg / 0,35 mg	comprimé enrobé							Préférez Maltofer® en solution injectable par voie sub-cutanée
TAREG	valsartan		40 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer en une prise, le matin à jeun ou au cours d'un repas Chez un patient donné : à administrer toujours dans les mêmes conditions (soit à jeun, soit au cours du repas) Le repas peut diminuer l'absorption chez certains femme enceinte
			80 mg	cp pelliculé							
			160 mg	cp pelliculé							
TARGRETIN	bexarotène		75 mg	capsule molle							
TARKA LP	trandolapril + vérapamil		2 mg / 180 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée femme enceinte
TASIGNA	nilotinib		150 mg	gélule							A administrer au moins deux heures avant ou une heure après un repas, avec de l'eau Gélule ouvrable : contenu dispersé sur une cuillère (et

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TASORNA	tinidazole		200 mg	gélule							pas plus) de compote de pomme (pas un autre aliment) et avalé immédiatement Ne pas associer à du jus de pamplemousse
TASMAR	tolcapone		100 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
TAURINE PH	taurine		50 mg	gélule				?	?		
			250 mg	gélule				?	?		
TAVANIC	lévofloxacine		500 mg	cp pelliculé bisécable							A administrer au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser
TEASLIM	thé vert + orthosiphon		125 mg / 50 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau
TEATROIS	tiratricol		0,35 mg	comprimé		?	?		?		
TEDRALAN LP	théophylline		200 mg	gélule							Ne pas croquer, ni ouvrir , ni écraser : microgranules à libération prolongée
TEGRETOL	carbamazépine		200 mg	cp bisécable							A administrer au cours ou après un repas, toujours aux mêmes heures de la journée, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : préférez la suspension buvable : utilisez la seringue graduée
			20 mg / ml	susp. buvable							femme enceinte
TEGRETOL LP	carbamazépine		200 mg	cp pelliculé bisécable							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la solution buvable → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
			400 mg	cp pelliculé bisécable							femme enceinte
TELEBRIX GASTRO	ioxitalamate méglumine		66,03mg /ml (50 ml)	solution buvable et rectale							Diluer 200 ml de produit dans 250 ml d'eau
			66,03mg /ml (100 ml)	solution buvable et rectale							
TELFAST	fexofénadine		120 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avec de l'eau
			180 mg	cp pelliculé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TELZIR	fosamprénavir		50 mg / ml	susp. buvable							Adulte : administrez à jeun, avec de l'eau ou une solution buvable Enfant : administrez avec un aliment au cours d'un repas pour l'acceptabilité du goût Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : préférez la suspension buvable femme enceinte
			700 mg	cp pelliculé							
TEMERIT	nébivolol		5 mg	cp quadrisécable	 						A administrer à heure fixe, au cours d'un repas, avec de l'eau
TEMERIT DUO	nébivolol + hydrochlorothiazide		5 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 						
			5 mg / 25 mg	cp pelliculé	 						
TEMESTA	lorazépam		1 mg	cp bisécable							Comprimés broyés mélangeables à de l'eau ou de la compote
			2,5 mg	cp bisécable							
TEMGESIC	buprénorphine		0,2 mg	cp sublingual							Laissez fondre sous la langue sans croquer, ni mâcher : dissolution en 5 à 10 minutes
TEMODAL	témozolomide		5 mg	gélule							A administrer à jeun, avec un verre d'eau Ne pas mâcher , ni ouvrir : cytotoxique femme enceinte
			20 mg	gélule							
			100 mg	gélule							
			140 mg	gélule							
			180 mg	gélule							
			250 mg	gélule							
			5 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TEMOZOLOMIDE	témozolomide		20 mg	gélule							A administrer à jeun, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir :gélules à libération prolongée, molécule cytotoxique femme enceinte
			100 mg	gélule							
			140 mg	gélule							
			180 mg	gélule							
			250 mg	gélule							
TENORDATE	aténolol + nifédipine LP		50 mg / 20 mg	gélule	 						A administrer à distance des repas, de préférence le matin Goût désagréable : broyage des comprimés possible, mais difficile, non recommandé Eviter la prise concomitante de laitages ou de pamplemousse pour l'association à la nifédipine
TENORETIC	aténolol + chlortalidone		50 mg / 12,5 mg	cp pelliculé sécable							
TENORMINE	aténolol		50 mg	cp pelliculé sécable							
			100 mg	cp pelliculé sécable							
TENSIONORME	bendrofluméthiazide + réserpine		2,5 mg / 0,1 mg	comprimé sécable		?	?		?		
TENSTATEN	ciclétanine		50 mg	gélule				?	?		A administrer le matin
TENTRINI ENERGY	mélange polymérique hypercalorique		500 ml (750 kcal)	flexibag							Mélanges de nutrition entérale pour les enfants de 7 à 12 ans ou de 21 à 45 kg A administrer de préférence avec un régulateur de débit
TENTRINI ENERGY MULTI FIBRE	mélange polymérique hypercalorique, enrichi en fibres		500 ml (750 kcal)	flexibag							
TENTRINI MULTI FIBRE	mélange polymérique isocalorique, enrichi en fibre		500 ml (500 kcal)	flexibag							
TENTRINI STANDARD	isocalorique, pauvre en résidus		500 ml (500 kcal)	flexibag							
TERALITHE	lithium		250 mg	comprimé sécable							A administrer au cours des repas Mélanger le comprimé écrasé à 250 mg avec de la confiture ou de la compote femme enceinte
TERALITHE LP	lithium		400 mg	comprimé sécable							
TERAZOSINE	térazosine		5 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer le soir

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TERBINAFINE	terbinafine		250 mg	comprimé sécable		?	?		?		
TERCIAN	cyamémazine		25 mg	cp pelliculé sécable	 						Comprimés non écrasables : photo-oxydation du principe actif Préférez la solution buvable : 1 ml = XL gouttes = 40 mg 1 comprimé à 25 mg ↔ XXV gouttes = 0,625 ml
			100 mg	cp pelliculé sécable	 						
			40 mg / ml	solution buvable							
TERONAC ATU	mazindol		1 mg	comprimé	 						Poudre obtenue par broyage est insoluble dans l'eau : mélangez à de la compote ou du yaourt
TERPINE GONNON			5 mg / ml	solution buvable							
TERPONE	eucalyptus + niaouli + pin de Sibérie + terpine			sirop							
TESLAC	testolactone		50 mg	comprimé		?	?		?		
TETRAHYDROBIOPTERINE ATU	tétrahydrobioptérine		10 mg	comprimé		?	?		?		
			50 mg	comprimé		?	?		?		
TETRALYSAL	lymécycline		150 mg	gélule	 						A administrer en dehors des repas, avec au moins 100 ml d'eau (cytotoxicité œsophagienne)
			300 mg	gélule							
TEVETEN	éprosartan		300 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde femme enceinte
TEXODIL	céfotiam		200 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer avant un repas, avec un grand verre d'eau pour éviter des manifestations digestives
THALIDOMIDE	thalidomide		50 mg	gélule							A administrer avec un grand verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas, en une seule prise, de préférence le soir une heure avant le coucher (sommolence) femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
THEINOL	paracétamol + caféine		405 mg / 39,9 mg (15 ml)	solution buvable							Evitez la prise en fin de journée
THELIN	sitaxentan		100 mg	comprimé enrobé							A administrer avec ou sans aliment
THEOPHYLLINE LP	théophylline		50 mg	gélule							Ne pas croquer, ni mâcher, ni ouvrir : gélules à libération prolongée Préférez Dilatrane® sirop 10 mg / ml
			100 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
			300 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
THEOSTAT LP	théophylline		100 mg	comprimé sécable							Ne pas écraser : comprimés à libération prolongée Préférez Dilatrane® sirop 10 mg / ml
			200 mg	comprimé sécable							
			300 mg	comprimé sécable							
THERALENE	alimémazine		0,5 mg / ml	sirop							A administrer de préférence le soir Préférez la solution buvable : I goutte = 1 mg, 1 ml = XL gouttes - ou le sirop
			40 mg / ml	solution buvable							
			5 mg	cp pelliculé sécable							
THICK & EASY	amidon de maïs + maltodextrines		225 g (373 kcal)	poudre orale goût neutre							Poudre épaississante, à dissoudre dans les liquides ou les préparations mixées
THIOCOLCHICOSIDE	thiocolchicoside		4 mg	comprimé sécable		?	?		?		
THIOPECTOL adulte	codéine + terpine		14,85mg/29,42mg (15 ml)	sirop							
THIOPHENICOL	thiamphénicol		250 mg	comprimé		?	?		?		
THREONINE L	thréonine		500 mg	gélule				?	?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
THYROZOL	thiamazole	®	5 mg	cp pelliculé							Les comprimés doivent être avalés entiers avec une quantité suffisante de liquide
		®	10 mg	cp pelliculé							
		®	20 mg	cp pelliculé							
TIADILON	tidiacil arginine		100 mg	gélule				?			
TIAPRIDAL	tiapride		5 mg / goutte	solution buvable							Préférez la solution buvable : 1 comprimé ↔ XX gouttes
			100 mg	comprimé sécable							
TIAPRIDE	tiapride		100 mg	comprimé sécable							
TIBERAL	ornidazole		500 mg	comprimé		?	?		?		
TICLID	ticlopidine	®	250 mg	cp pelliculé							
TICLOPIDINE	ticlopidine		250 mg	cp pelliculé							A administrer au cours des repas
TIGREAT	frovatriptan		2,5 mg	cp pelliculé							A avaler entier avec de l'eau Préférez Imigrane® en pulvérisation nasale (10 et 20 mg)
TILCOTIL	ténoxicam		20 mg	cp pelliculé sécable							A administrer au cours du repas, en une prise, avec un grand verre d'eau
TILDIEM	diltiazem		60 mg	comprimé							A administrer entier, sans être croqué, au début des repas, avec un peu d'eau
TIMACOR	timolol		10 mg	comprimé sécable							A administrer avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer Évitez la prise d'alcool

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TIMOFEROL	vitamine C + sulfate ferreux		50 mg / 30 mg	gélule				?	?		A administrer le matin à jeun ou avant le déjeuner
TIORFAN	racécadotril		10 mg	poudre orale							A administrer au début des repas Goût désagréable : pas de problème par sonde entérale
			30 mg	poudre orale							
			100 mg	gélule							
TITANORAL	diosmine		600 mg	cp pelliculé	 						A administrer, avec de l'eau, au cours d'un repas Administration immédiate, mélangé à de l'eau ou un aliment Préférez Ginkor® poudre orale ou Flebosmil® en sachet
TIXAIR	acétyl cystéine		100 mg	poudre orale							
			200 mg	poudre orale							
			200 mg	comprimé							
TMC 125	étravirine		100 mg	comprimé			?	?	?		
TMC 207 ATU	bédaquiline		100 mg	comprimé	 		?	?	?		A administrer avec de l'eau, au cours d'un repas femme enceinte
TOCLASE toux sèche	pentoxifyvérine		21,3 mg / 10 ml	solution buvable							
TOCO-500	vitamine E		10 g / 100 ml	solution buvable							
			500 mg	capsule molle							
TOCOLION	vitamine E		500 mg	capsule molle							A administrer le matin, avec un peu d'eau Préférez la solution buvable
TOCOPA	vitamine E		500 mg	gélule							
TOCOPHEROL	vitamine E		500 mg	capsule molle							
TOCTINO	alitrétinoïne		10 mg	capsule molle							A administrer en une prise, au moment du repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			30 mg	capsule molle							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TOFRANIL	imipramine		10 mg	comprimé enrobé							A administrer en une prise pendant ou à distance d'un repas
			25 mg	comprimé enrobé							Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde
TOLEXINE	doxycycline		50 mg	comprimé							A administrer au milieu d'un repas, avec un verre d'eau, au moins une heure avant le coucher
			100 mg	comprimé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : microgranules gastrorésistantes Dispersible dans un verre d'eau non gazeuse (bien rincer le verre) et administrable par sonde
TOMTOVOK AFATINIB ATU	afatinib		30 mg	comprimé		?	?		?		femme enceinte
			40 mg	comprimé		?	?		?		
			50 mg	comprimé		?	?		?		
TONACTIL	ginseng + kola		300 mg / 150 mg	gélule				?	?		
TONICALCIUM	ascorbate de lysine + ascorbate de calcium		250 mg / 250 mg	solution buvable							A administrer avant 16 h, diluée dans un peu d'eau
			500 mg / 500 mg	solution buvable							
TONIGIN	ginseng		50 mg	capsule molle							
TONILAX	aloès du Cap + bourdaine		50 mg / 20 mg	comprimé enrobé							A administrer 30 minutes avant le repas du soir, avec de l'eau Attention : contient du gluten
TOP MAG	pidolate de magnésium		2,25 g	poudre orale							A administrer avant ou au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau
			2,25 g	cp effervescent							Dégazez la solution effervescente
TOPAAL	acide alginique + silice + hydroxyde d'alumine + carbonate de magnésium		200mg/130mg/30mg/40mg	susp. buvable							A administrer après les repas
			200mg/130mg/30mg/40mg	cp à croquer							Préférez la suspension buvable : 1 cp ↔ 1 cuillère à café
TOPALGIC	tramadol		50 mg	gélule							
			100 mg / ml	solution buvable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvrerture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TOPALGIC LP	tramadol		100 mg	comprimé	  						Ne pas ouvrir la gélule Ne pas écraser les comprimés à libération prolongée Préférez la solution buvable ou le comprimé effervescent de Tramadol® → <i>adaptation de la posologie et perte de la forme retard</i>
			150 mg	comprimé	  						
			200 mg	comprimé	  						
TOPALKAN	acide alginique + silice + hydroxyde d'alumine + carbonate de magnésium		200mg / 130mg / 30mg / 40mg	cp à croquer	 						A administrer après les repas Préférez la suspension buvable : 1 cp ↔ 1 cuillère à café
			200mg / 130mg / 30mg / 40mg	susp. buvable							
TOPFENA LP	kétoprofène		100 mg	gélule							A administrer en une prise, au cours d'un repas Ouvrir la gélule, mais ne pas écraser les micro granules à libération prolongée Préférez Toprec® sirop 1 mg / ml  femme enceinte
			200 mg	gélule							
			25 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TOPIRAMATE	topiramate		25 mg	gélule							<p>Les gélules peuvent être ouvertes et mélangées dans la nourriture</p> <p>Ne pas croquer, ni écraser les comprimés</p>
			50 mg	comprimé							
			50 mg	gélule							
			100 mg	cp pelliculé							
			100 mg	cp pelliculé							
			100 mg	cp pelliculé bisécable	 						
			200 mg	cp pelliculé bisécable	 						
			200 mg	cp pelliculé							
			200 mg	cp pelliculé							
TOPLEXIL	oxomémazine		0,33 mg / ml	solution buvable	 						<p>A administrer de préférence le soir</p>
			0,33 mg / ml	sirop							
TOPREC	kétoprofène		1 mg / ml	sirop							<p>A administrer en une prise, au cours d'un repas</p> <p>Ouvrir la gélule, mais ne pas écraser les micro granules à libération prolongée</p> <p>Préférez Toprec® sirop 1 mg / ml</p> <p> femme enceinte</p>
			25 mg	comprimé							
TORONTAL LP	pentoxifylline		400 mg	comprimé enrobé							<p>A administrer à la fin du repas</p> <p>Ne pas croquer, ni écraser : comprimé à libération prolongée</p>
TOTAPEN	ampicilline		500 mg	gélule							<p>A administrer avec un peu d'eau, 30 minutes avant les repas</p>

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
TOT HEMA	gluconate de cuivre + gluconate ferreux + gluconate de manganèse		0,7mg/50mg/1,33mg (ampoule 10 ml)	solution buvable							A administrer diluée dans de l'eau sucrée ou non, ou dans une autre solution buvable non alcoolisée	
TOXICARB	charbon activé		20 g / 100 ml (60 ml)	susp. buvable							A administrer par voie orale ou par une sonde gastrique	
			250 ml	susp. buvable								
TRACLEER	bosentan		32 mg	cp quadriséable dispersible							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Inutile d'écraser : forment une suspension en remuant les comprimés dans un liquide tiède : administration immédiate femme enceinte : tératogène	
			62,5 mg	cp pelliculé								
			125 mg	cp pelliculé								
TRAMADOL	tramadol		50 mg	comprimé							Ne pas ouvrir les gélules : sont à libération prolongée Ne pas écraser les comprimés Préférez le comprimé effervescent dissout dans de l'eau : dégazez la solution effervescente	
			50 mg	cp effervescent								
			50 mg	gélule	 							
TRAMADOL LP	tramadol		100 mg	cp pelliculé								femme enceinte
			100 mg	gélule	 							
			150 mg	cp pelliculé								
			150 mg	gélule								
			200 mg	cp pelliculé								
			200 mg	gélule								
TRAMADOL PARACETAMOL	tramadol + paracétamol		37,5mg/325mg	cp pelliculé								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TRAMADOL PARACÉTAMOL	tramadol + paracétamol		37,5mg / 325mg	cp pelliculé							
TRAMISAL	ginkgo biloba		40 mg / ml	solution buvable							A administrer au moment des repas, diluée dans ½ verre d'eau
TRANDATE	labétalol		200 mg	cp pelliculé	 						A administrer à la fin du repas
TRANDOLAPRIL	trandolapril		0,5 mg	gélule							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec ½ à 1 verre d'eau femme enceinte
			2 mg	gélule							
			4 mg	gélule							
TRANQUILIMAG	sulfate de magnésium + saccharomyces cerevisiae		59 mg / 50 mg	gélule							
TRANQUITAL	valériane + aubépine		34,6 mg / 36,8 mg	comprimé							
TRANSACALM	trimébutine		100 mg	comprimé	 						A administrer avec un verre d'eau Préférez le Débridat® : les granulés dilués dans de l'eau ou du lait ou remplacez par la forme suppositoire à 100 mg
TRANSILANE	psyllium		2,816 g	poudre orale							A administrer avant les repas, dans un grand verre d'eau : bien agiter et boire immédiatement
TRANSILANE sans sucre	ispaghul		3 g	poudre orale							
TRANSIPEG	macrogol		2,95 g	poudre orale							A administrer en une prise le matin
			5,9 g	poudre orale							Mise en solution dans 50 à 100 ml d'eau et boire rapidement
TRANSITOL	paraffine liquide + vaseline		1,15 g / 2,3 g (5 ml)	gelée orale							
TRANSULOSE	lactulose + paraffine liquide + vaseline		1,75g/2,14g/1,07g (5 ml)	gelée orale							
TRANXENE	clonazépan		5 mg	gélule							Préférez Lysanxia® solution buvable
			10 mg	gélule							
			20 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TRANLYCYPROMINE ATU	tranlycypromine		10 mg	comprimé		?	?		?		A administrer le matin et l'après-midi
TRASICOR	oxyprénolol		80 mg	cp pelliculé sécable		?	?		?		
TRASICOR LP	oxyprénolol		160 mg	cp pelliculé	■						Ne pas écraser : comprimé à libération prolongée Préférez le comprimé à 80 mg → <i>adaptation de la posologie et perte de la forme retard</i>
TRASITENSINE	chlortalidone + oxprénolol		20 mg / 160 mg	comprimé enrobé	■						
TRAZOLAN ATU	trazodone	■	100 mg	comprimé sécable		?	?		?		
TRECTOR ATU	éthionamide	■	250 mg	comprimé enrobé	■	?	?		?		
TREDEMINE	niclosamide	®	500 mg	cp à croquer							A administrer le matin à jeun A mastiquer longuement, complètement puis avaler avec très peu d'eau
TRENTADIL	bamifylline		300 mg	comprimé enrobé	■						A administrer en dehors des repas, sans être croqué, avec un verre d'eau Goût désagréable : broyage possible si administration par sonde Forme suppositoire à 250 et 750 mg
TRIAFEMI	norgestinate + éthinyloestradiol		0,18 mg / 0,035 mg	comprimé	■						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,215mg / 0,035mg	comprimé	■						
			0,25 mg / 0,035 mg	comprimé	■						
TRIA TEC	ramipril	■	1,25 mg	comprimé	■	?	?		?		A administrer pendant ou après un repas Biodisponibilité non modifiée par la prise d'aliments
		■	2,5 mg	comprimé sécable	■	?	?		?		
		■	5 mg	comprimé sécable	■	?	?		?		
		■	10 mg	comprimé sécable	■	?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TRIAECKIT	ramipril		2,5 mg	comprimé sécable		?	?		?		femme enceinte
			5 mg	comprimé sécable		?	?		?		
			10 mg	comprimé sécable		?	?		?		
TRICILEST	norgestimate + éthinyloestradiol		0,18 mg / 0,035 mg	comprimé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,215mg / 0,035mg	comprimé	 						
			0,25 mg / 0,035 mg	comprimé	 						
TRIELLA	éthinyloestradiol + noréthistérone		0,5 mg / 35 µg	comprimé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertain
			0,75 mg / 35 µg	comprimé	 						
			1 mg / 35 µg	comprimé	 						
TRIENTINE DICHLORHYDRATE ATU	trientine		300 mg	gélule				?	?		
TRIFLUCAN	fluconazole		50 mg / 5 ml	poudre orale							Préférez la poudre orale mélangée à solvant compatible : sérum glucosé ou salé
			200 mg / 5 ml	poudre orale							
			50 mg	gélule							
			100 mg	gélule	 						
			200 mg	gélule	 						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TRIGLISTAB	triglycérides d'acides ω-3		1010 mg	capsule molle							A administrer au cours des repas
TRIGLYDAL	complément alimentaire oral			huile							Alimentation modulaire lipidique
TRIGLYSAL	glycinate d'aluminium + ammonium glycyrrhizate + silicate de magnésium		250mg / 20mg / 250mg	cp à croquer et à sucer							
TRILEPTAL	oxcarbazépine		60 mg / ml	susp. buvable	 						A administrer au cours ou en dehors des repas Les comprimés peuvent être cassés en deux Préférez la suspension buvable mélangée dans un petit verre d'eau juste avant l'administration
			150 mg	cp pelliculé							
			300 mg	cp pelliculé							
			600 mg	cp pelliculé							
TRIMEBUTINE	trimébutine		4 g (sachet)	granulés pour susp.buvable							A administrer avec un verre d'eau Préférez les granulés dilués dans de l'eau ou du lait
			4,8 mg / ml	granulés pour susp.buvable							
			100 mg	comprimé	 						
			100 mg	cp pelliculé							
			200 mg	comprimé	 						
			200 mg	cp pelliculé							
TRIMETAZIDINE	trimétazidine		20 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération modifiée Préférez la solution buvable
			20 mg	cp pelliculé	 						
			35 mg	cp pelliculé							
TRI MINULET	éthinyloestradiol + gestodène		0,03 mg / 0,05 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,04 mg / 0,07 mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			0,03 mg / 0,1 mg	comprimé enrobé							
TRINITRINE	trinitrine		0,15 mg	pilule							Comprimés à croquer lentement et à garder dans la bouche pour administration sublinguale
TRINORDIOL	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		0,05 mg / 0,03 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			0,075mg/0,04mg	comprimé enrobé							
			0,125mg/0,03mg	comprimé enrobé							
TRISEQUENS	17-β-estradiol		1 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
			2 mg	cp pelliculé							
		17-β-estradiol + noréthistérone		2 mg / 1 mg	cp pelliculé						
TRITTICO RETARD ATU	trazodone		150 mg	comprimé							
TRIVASTAL	piribédil		20 mg	comprimé enrobé							A administrer à la fin du repas, avec un ½ verre d'eau Ne pas croquer , ni écraser
TRIVASTAL LP	piribédil		50 mg	comprimé enrobé							
TRIZIVIR	abacavir + lamivudine + zidovudine		300mg/150mg/300mg	cp pelliculé							A administrer tel quel avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas Préférez l'association : Epivir® solution buvable : 15 ml = 150 mg + Rétrovir® solution buvable : 30 ml = 300 mg + Zidocor® solution buvable 15 ml = 300 mg femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives	
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques								
TROBALT	rétigabine		50 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni couper, ni écraser	
			100 mg	cp pelliculé								
			200 mg	cp pelliculé								
			300 mg	cp pelliculé								
			400 mg	cp pelliculé								
TROBALT KIT	rétigabine		50 mg	cp pelliculé								
			100 mg	cp pelliculé								
TROLOVOL	pénicillamine		300 mg	cp pelliculé								A administrer à distance des repas
TROPHIRES	acide ténoïque + pholcodine		3 mg / 6,65 mg (5 ml)	sirop								
			50 mg / 6,65 mg (5 ml)	sirop								
TROXERUTINE	troxérutine		3,5 g	poudre orale							A administrer au cours du repas, bien mélangée dans un verre d'eau	
TRUVADA	emtricitabine + ténofovir		200 mg / 245 mg	cp pelliculé	 						Comprimé peut être délité dans 100 ml d'eau, de jus d'orange ou de raisin, puis administration immédiate femme enceinte	
TUSSIDANE	dextrométhorpane		1,5 mg / ml	sirop							Comprimé à avaler intact, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser : préférer la solution buvable ou le sirop	
			3 mg / ml	solution buvable								
			30 mg	cp pelliculé bi sécable								
TUSSIDORON	droséra + thym		70 mg / 220 mg	sirop								
TUSSILENE	carbocistéine		20 mg / ml	sirop								
			50 mg / ml	sirop								

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TUSSIPAX	codéine + chlorhydrate d'éthylmorphine		10 mg / 10 mg	cp pelliculé		?	?		?		Préférez le sirop ou la solution buvable diluée dans de l'eau, du lait ou du jus de fruit Utilisez la mesurette graduée
			0,1 mg / 0,1 mg	solution buvable							
	codéine + chlorhydrate d'éthylmorphine + espèces pectorales	3mg/3mg/180mg (cuillère mesure)	sirop								
TUSSI SEDAL	noscapine + prométhazine		5 mg / 2,5 mg (cuillère mesure)	sirop							A administrer de préférence le soir (effet sédatif) Agiter le flacon avant emploi
TUXIUM	dextrométhorphane		30 mg	capsule molle							La capsule peut être sucée, mâchée ou avalée telle quelle avec un verre d'eau
TWINSTA	telmisartan + amlodipine		40 mg / 5 mg	comprimé		?	?		?		A administrer à heure fixe, avec un peu de liquide, au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte : fœtotoxique
			40 mg / 10 mg	comprimé		?	?		?		
			80 mg / 5 mg	comprimé		?	?		?		
			80 mg / 10 mg	comprimé		?	?		?		
TYR 1	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine ; enrichi en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		500 g (290kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie de la naissance à 1 an
TYR 2		500 g (303kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie à partir de 1 an	
TYR ANAMIX INFANT	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine ; enrichi en glucides, prébiotiques, vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		400 g	poudre orale et entérale							Diluer 15 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie avec méthioninémie normale jusqu'à 1 an et en supplémentation de 1 à 3 ans
TYR ANAMIX JUNIOR			29 g	solution buvable							Prête à l'emploi Traitement nutritionnel de la tyrosinémie de 1 à 10 ans
TYR 1 MIX MILUPA	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine ; enrichi en glucides, prébiotiques, vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		1 000 g* (275kcal/100ml)	poudre orale et entérale							Diluez 1 mesure de 4,6 g de poudre dans 30 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie de la naissance à 1 an
TYR 2 PRIMA MILUPA	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine ; enrichi en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments		500 g (289kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie à partir de 1 an
TYR 2 SECUNDA MILUPA			500 g (291kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie à partir de 9 ans

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
TYR COOLER	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine ; enrichi en AG ω-3, vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		130 ml	solution buvable 1 saveur							Solution prête à l'emploi - A administrer bien frais Conservation 24 heures - Peut être congelée Traitement nutritionnel de la tyrosinémie dès 3 ans et chez l'adulte
TYR EPRESS	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 15 g		25 g	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet dans 100 ml d'eau bien fraîche, bien agiter - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie dès 8 ans et chez l'adulte
TYR GEL	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine, enrichi en vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		20 g	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet dans 30 ml d'eau bien fraîche, bien agiter = consistance d'entremet + ajoutez 100 ml d'eau pour une solution buvable - Administration immédiate et boire de l'eau Traitement nutritionnel de la tyrosinémie entre 1 et 8 ans
TYROFLEX	mélange d'AA sans tyrosine ni phénylalanine ; supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux équivalent protidique = 8,4 g		29 g (113kcal/sachet)	poudre orale et entérale							Diluez 1 sachet dans 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de la tyrosinémie entre 1 et 10 ans
TYVERB	lapatinib		250 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, une heure avant le repas ou une heure après le repas Biodisponibilité augmentée jusqu'à 4 fois par la nourriture (fonction de la teneur en graisses) : à administrer au moins une heure avant ou une heure après un repas (toujours avant ou toujours après) Evitez le jus de pamplemousse qui peut augmenter la biodisponibilité
UBICOR ATU	ubidécarenone + solvant		50 mg / 10 ml	poudre orale			?				
UBIT	urée ¹³ C		100 mg	cp pelliculé	 						A administrer à jeun depuis au moins 8 heures, entier avec 100 ml d'eau non minéralisée, sans mâcher, ni écraser
UBITEN ATU	ubidécarenone		5 mg / ml	solution buvable							A administrer après un repas Préférez la solution buvable
			10 mg	comprimé		?	?		?		
			50 mg	gélule					?	?	

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
UCD 1 MILUPA	mélange de L-AA ; enrichi en L-cystine et L-tyrosine, vitamines, sels minéraux et oligoéléments		450 g (252kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel des désordres du cycle de l'urée, de la citrulinémie, de l'hyperornithinémie et de l'hyperammoniémie, de la naissance à 1 an
UCD 2 MILUPA			450 g (271kcal/100g)	poudre orale et entérale							Diluez au maximum 10 g de poudre dans 100 ml d'eau Traitement nutritionnel des désordres du cycle de l'urée, de la citrulinémie, de l'hyperornithinémie et de l'hyperammoniémie, à partir de 1 an
UFT	tégafur + uracile		100mg / 224mg	gélule							A administrer avec au moins 100 ml d'eau, en dehors d'un repas : au moins 1 h avant ou après Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir : cytotoxique femme enceinte
ULCAR	sucralfate		1 g	cp bisécable							A administrer avec un verre d'eau, en dehors d'un repas : ½ h à 1 h avant ou 2 h après le repas du soir
			1 g (sachet)	susp. buvable							
ULTRA LEVURE	saccharomyces boulardii		50 mg	gélule							Évitez l'ouverture des gélules : risque de dissémination du contenu dans environnement (fongémie possible si cathéter veineux central) Préférez la poudre orale Ne pas le mélanger avec un liquide ou un aliment trop chaud (plus de 50 °C), glacé ou alcoolisé : pas de choc thermique avec cellules vivantes
			100 mg	poudre orale							
			200 mg	gélule							
UN ALFA	alfacalcidol		2 µg / ml	solution buvable 0,1 µg							Avaler les capsules avec un peu d'eau, sans les sucer, ni les mâcher, ni les croquer Préférez la solution buvable diluée dans un peu d'eau ou de lait : 1 goutte = 0,1 µg
			0,25 µg	capsule molle							
			0,5 µg	capsule molle							
			1 µg	capsule molle							
UNICORDIUM	bépridil		100 mg	cp pelliculé							A administrer au cours des repas, avec un peu de liquide Ne pas croquer, ni écraser : comprimés gastrorésistants
			200 mg	cp pelliculé							
			300 mg	cp pelliculé							
UNIFLOX	ciprofloxacine		500 mg	cp pelliculé							A administrer de préférence à jeun ou 2 h après le repas Si irritation gastrique : administrer durant le repas Comprimé à avaler tel quel avec un verre d'eau ou

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
URIDINE PH	uridine		500 mg	gélule				?	?		
URIDOZ	fosfomycine trométamol	®	3 g	granulés pour solution buvable							A administrer en dehors d'un repas : 2 à 3 h avant, dissous dans un verre d'eau
URION	alfuzosine		2,5 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer , ni mâcher, ni écraser : à avaler entier avec un verre d'eau
URISPAS	flavoxate		200 mg	cp pelliculé			?	?	?		
UROKIT-K 5 meq ATU	citrate de potassium		540 mg	comprimé			?	?	?		
UROKIT-K 10 meq ATU	citrate de potassium		1 080 mg	comprimé			?	?	?		
UROMIL	busserole + thé vert		100 mg / 100 mg	comprimé enrobé			?	?	?		A administrer avec un grand verre d'eau
UROMITEXAN	mesna		400 mg	cp pelliculé bisécable			?	?	?		Cytostatique : à discuter chez femme enceinte Mélanger immédiatement à des aliments ou du jus d'orange ou une solution buvable gazeuse Solutions injectables (1g/10 ml, 400 mg/4 ml)

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			600 mg	cp pellicule bisécable	 	?	?		?		administrables par voie orale ou entérale
UROPHYTUM	buchu + busserole		185 mg / 185 mg	gélule				?	?		A administrer avant le repas, avec un grand verre d'eau minérale, de préférence riche en bicarbonate
UROREC	silodosine		4 mg	gélule							A administrer à heure fixe, telle quelle, pendant un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir
			8 mg	gélule							
UROSIPHON	orthosiphon		2 g / 10 ml	solution buvable							A diluer dans un verre d'eau
URSODESOLYCHOLIQUE ACIDE	acide ursodésoxycholique		250 mg	comprimé	 						A administrer intact, avec de l'eau, au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser Préférez la solution buvable d'Ursofalk® (en ATU)
URSOFALK ATU	acide ursodésoxycholique		50 mg / ml	susp. buvable							
URSOLVAN	acide urso-désoxy-cholique		200 mg	gélule				?	?		A administrer au cours d'un repas
UTEPLEX	acide uridine-5'triphosphorique		2 mg / 2 ml	solution buvable							A administrer diluée dans un ½ verre d'eau Si eau riche en sels minéraux → coloration blanche de la solution
UTROGESTAN	progestérone		100 mg	capsule orale et vaginale							A administrer le soir au coucher, à distance des repas
			200 mg	capsule orale et vaginale							
VEDOSE	vitamine D ₃		2,5 mg / 2 ml	solution buvable							Peut être diluée dans un peu d'eau (léger trouble possible)
VESTEROL D	vitamine D ₂		1 500 UI / ml	solution buvable							A utiliser pure ou diluée dans dans de l'eau ou du lait
VESTEROL VIT A D E C	vitamines A + D ₂ + E + C		100 000UI/0,5g/ 50	solution buvable							A utiliser pure ou diluée dans dans de l'eau ou du lait Ne pas diluer dans du jus de fruit
UVIMAG B ₆	glycérophosphate de magnésium + vitamine B ₆		125 mg / 40 mg (10 ml)	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, diluée dans de l'eau
VADILEX	ifenprodil		20 mg	cp pelliculé	 						A administrer avec un grand verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser
VAGOSTABYL	aubépine + mélisse + lactate de calcium + thiosulfate de magnésium		50mg/45mg/50mg/10mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer au repas du soir ou au coucher
VALACICLOVIR	valaciclovir		500 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors d'une repas, avec un verre de liquide

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VALDA rhume	vitamine C + paracétamol + pseudoéphédrine		50mg/250mg/30mg	cp pelliculé		?	?		?		
VALDA toux sèche sans sucre	pholcodine			solution buvable							
VALINE L PH	L valine		50 mg	gélule				?	?		
VALDOXAN	agomélatine		25 mg	cp pelliculé	 						A administrer pendant ou en dehors des repas, avec un verre d'eau
VALIUM	diazépam		2 mg	comprimé sécable	 						A administrer avec un verre d'eau Préférez la solution buvable : XXX gouttes = 1 mg
			5 mg	comprimé sécable	 						
			10 mg	cp bisécable	 						
			10 mg / ml	solution buvable	 						
VALPROATE NA	valproate de sodium		200 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimés à libération prolongée ou gastro-résistants Préférez la solution buvable → <i>adaptation de la posologie et perte de la forme retard</i>
			200 mg	comprimé enrobé							
			500 mg	cp pelliculé sécable							
VALPROATE NA LP	valproate de sodium		500 mg	cp pelliculé bi sécable							
VALSARTAN	valsartan		40 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		A administrer à heure fixe, en général le matin, au cours ou en dehors des repas, avec un verre d'eau : foëto-toxique femme enceinte
			80 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
			160 mg	cp pelliculé sécable	 	?	?		?		
VALSARTAN HCTZ	valsartan +		80 mg / 12,5mg	cp pelliculé	 	?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VASARTANICIZ	hydrochlorothiazide		160 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
VANILONE infantile	cyclovalone		33 mg (cuillère à café)	granulés							A administrer au cours d'un repas Les granulés doivent être croqués ou mélangés au lait des biberons
VARNOLINE	désogestrel + éthinyloestradiol		0,15 mg / 0,03 mg	comprimé	 						A administrer à heure fixe
VARNOLINE CONTINU	désogestrel + éthinyloestradiol		0,15 mg / 0,03 mg	cp pelliculé	 						Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
VASCOCITROL	citroflavonoïdes + vitamine C + carbonate de magnésium		100mg/230mg/ 123mg (5 ml)	solution buvable							A avaler avec de l'eau
VASOBRAL	caféine + dihydroergocryptine		40 mg / 4 mg	comprimé sécable							A administrer au moment des principaux repas, avec un peu d'eau
			20 mg / 2 mg (mesurette)	solution buvable							Ne pas croquer , ni écraser le comprimé Préférez la solution buvable diluée dans un ½ verre d'eau
VASTAREL	trimétazidine		20 mg	cp pelliculé							A administrer au cours des repas
			20 mg / ml	solution buvable							Ne pas croquer , ni écraser les comprimés : préférez la solution buvable : 1 ml = XX gouttes → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
VASTAREL LP	trimétazidine		35 mg	cp pelliculé							
VASTEN	pravastatine		10 mg	comprimé sécable		?	?		?		A administrer en une prise unique vespérale, pendant ou en dehors des repas
			20 mg	comprimé sécable		?	?		?		A administrer à distance d'un autre traitement
			40 mg	comprimé		?	?		?		
VECTARION	almitrine		50 mg	comprimé enrobé bisécable	 						A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Administration immédiate
VECTRINE	erdostéine		300 mg	gélule				?	?		Préférez la poudre orale dissoute dans de l'eau
			300 mg	poudre orale							
VEDROP	tocofersolan		50 mg / ml (20 ml)	solution buvable							A administrer avec ou sans eau Utilisez la seringue doseuse : administration directement

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VEBRO	tocotriénols		50 mg / ml (60 ml)	solution buvable							Conseil : la seringue doseuse : administration directement dans la bouche, ou dans un verre d'eau
VEGETOSERUM enfant	codéthyline		2 mg (5 ml)	sirop							
VEGETOSERUM adulte	codéthyline + grindelia		10 mg/ 8 mg (15 ml)	sirop							
VEINAMITOL	troxérutine		3 500 mg	poudre orale							A administrer au cours du repas, dans un verre d'eau
			3 500 mg (7 ml)	solution buvable							
VEINOBIASE	petit houx + cassis + vitamine C		60mg/550mg/ 200mg	cp effervescent							A administrer au cours d'un repas, dissous dans un grand verre d'eau : dégazez la solution
VEINOPHYTUM	marron d'Inde + vigne rouge		210 mg / 210 mg	gélule				?	?		A avaler avec un grand verre d'eau
VEINOSIUM	æsculus hippocastanum + arnica + hamamélis + nux vomica		0,53mg/0,53mg/ 0,53mg/0,53mg	cp sublingual							A laisser fondre sous la langue à distance d'un repas
VEINOSTASE	marron d'Inde + hamamélis + vitamine C + cyprès		0,1g/0,1g/0,1g /1,15g (5 ml)	solution buvable							A administrer avant un repas, diluée dans un peu d'eau sucrée
VEINOTONYL	metesculetol + marron d'Inde		75 mg / 15 mg	gélule				?	?		A avaler avec de l'eau
VELITEN	vitamines C + E + rutoside		200mg/50mg/ 200mg	cp pelliculé							A avaler avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser
VELMETIA	sitagliptine + metformine		50 mg/1000mg	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas pour diminuer les effets gastro-intestinaux de la metformine Ne pas croquer, ni écraser femme enceinte
VENACLAR	diosmine		600 mg	cp pelliculé			?	?	?		A administrer avec un ½ verre d'eau, au cours d'un repas ou au moins 5 minutes avant le petit déjeuner Préférez Ginkor® poudre orale ou Flebosmil® en sachet
VENIRENE	diosmine		300 mg	comprimé			?	?	?		
			600 mg	cp pelliculé			?	?	?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VENLAFAXINE	venlafaxine	®	50 mg	cp pelliculé							A administrer au cours d'un repas
			50 mg	cp bisécable							
VENLAFAXINE LP	venlafaxine		37,5 mg	gélule	 						A administrer à heure fixe , en une seule prise, au cours d'un repas, avec un grand verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser, ni ouvrir Préférez les comprimés à 50 mg → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
			75 mg	gélule	 						
VEPESIDE	étoposide		50 mg	capsule molle							Ne pas casser, ni écraser : cytotoxique Ne pas y associer la prise de pamplemousse femme enceinte
VERAPAMIL	vérapamil		40 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		A administrer au cours d'un repas
			120 mg	cp pelliculé		?	?		?		
VERAPAMIL LP	vérapamil		120 mg	gélule							A administrer au cours d'un repas Ne pas croquer, ni écraser, ni ouvrir : comprimés et gélules à libération prolongée
			120 mg	cp pelliculé	 						
			240 mg	cp pelliculé bisécable							
			240 mg	gélule							
VERATRAN	clotiazéпам		5 mg	comprimé	 	?	?		?		A administrer avec un verre d'eau
			10 mg	cp bisécable	 	?	?		?		
VEROXYTE	oxycodone	®	25 mg	cp pelliculé							Ne pas casser, ni écraser : cytotoxique

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VERCYTE	pipobroman		25 mg	cp bisecable	  					 femme enceinte	
VERMIFUGE SORIN	pipérazine		100 mg / ml	sirop						A administrer en dehors des repas	
VERMOX ATU	mébendazole		500 mg	comprimé						 femme enceinte	
VERRULIA	antimoine + acide nitrique + thuya		1mg/1mg/1mg	comprimé à sucer	  					A sucer en dehors d'un repas	
VERRULYSE METHIONINE	glycérophosphate de fer + glycérophosphate de calcium + glycérophosphate de manganèse + L méthionine + oxyde magnésium		9mg/18mg/9mg /250mg/225mg	comprimé enrobé						A administrer au début d'un repas	
VESANOID	trétinoïne		10 mg	capsule molle	 					Ne pas croquer, ni écraser : excipients huileux  femme enceinte	
VESICARE	solifénacine		5 mg	cp pelliculé	    					A administrer avec de l'eau, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser	
			10 mg	cp pelliculé	    						
VFEND	voriconazole		40 mg / ml	poudre orale						A administrer à heure fixe, en dehors d'un repas : 1 h avant ou 2 h après Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : préférez la poudre orale	
			50 mg	cp pelliculé	    						
			200 mg	cp pelliculé	    						
VIAGRA	sildénafil		25 mg	cp pelliculé	   					A administrer en dehors d'un repas, avec un peu d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser Ne pas y associer la prise de pamplemousse	
			50 mg	cp pelliculé	   						

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			100 mg	cp pelliculé	 						
VIATOL	glucides + sodium + potassium + citrates		20g/50mmol/ 25mmol/ 12,5mmol (par litre)	poudre orale et entérale							Solution de réhydratation orale à diluer dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 24 h
VIBRAMYCINE	doxycycline		100 mg	cp bisécable							A administrer au cours des repas : tel quel avec un verre d'eau ou délayé dans un ½ verre d'eau Ne pas s'allonger pendant 1 h
VIBTIL	tilleul aubier		250 mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer avec un peu d'eau, avant un repas ou au moment des troubles
VICKS adulte toux sèche	dextrométhorphan		1,33 mg / ml	sirop	 						
VICKS sirop pectoral	pentoxivérine		1,5 mg / ml	sirop	 						
VICKS expectorant	guaïfénésine		200 mg / 15 ml	sirop	 						
VICTAN	loflazépate d'éthyle		2 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A avaler avec un verre d'eau
VICTRELIS	bocéprévir		200 mg	gélule	 						Ne pas endommager la gélule  femme enceinte
VIDEX	didanosine		25 mg	cp à croquer ou dispersible							A administrer à jeun : soit au moins 30 minutes avant, soit 2 h après le repas Les comprimés doivent être mâchés minutieusement ou dispersés dans au moins 30 ml d'eau ou de jus de pomme : solution stable 1 h à température ambiante Ne pas ouvrir les gélules : microgranules gastrorésistantes
			50 mg	cp à croquer ou dispersible							
			100 mg	cp à croquer ou dispersible							
			125 mg	gélule							
			150 mg	cp à croquer ou dispersible							
			200 mg	cp à croquer ou dispersible							
			200 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			250 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
			2 g	poudre orale							
VIDORA	indoramine		25 mg	comprimé		?	?		?		
VIMPAT	lacosamide		10 mg / ml	sirop							<p>A administrer avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas Préférez la forme sirop, utilisez le gobelet doseur, administrez un verre d'eau après la prise</p>
			15 mg / ml	sirop							
			50 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			100 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			150 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			200 mg	cp pelliculé		?	?		?		
VINCARUTINE	rutoside + vincamine		40 mg / 20 mg	gélule							Ne pas croquer , ni ouvrir la gélule
VIRACEPT	nelfinavir		50 mg / g	poudre orale							<p>A administrer au cours des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : préférez la poudre orale mélangée à de l'eau, du lait, du lait de soja, des aliments diététiques ou du flan Ne pas mélanger avec du jus de fruit ou un aliment acide</p> femme enceinte
			250 mg	cp pelliculé							
VIRAMUNE	névirapine		10 mg / ml	susp. buvable							<p>A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la suspension buvable : risque d'obstruction de la sonde (solution épaisse)</p> femme enceinte
			100 mg	comprimé							
			200 mg	comprimé							
			400 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VIREAD	ténofovir		245 mg	cp pelliculé	 						A administrer au cours d'un repas Le comprimé peut être écrasé et mélangé dans au moins 100 ml d'eau, de jus d'orange ou de raisin : administration immédiate femme enceinte
VIRLIX	cétirizine		10 mg / ml	susp. buvable							Avaler le comprimé avec un ½ verre d'eau Préférez la suspension buvable diluée dans de l'eau
			10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
VISANNE	diénogest		2 mg	comprimé	 						A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec une boisson Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
VISCERALGINE	tiémonium		50 mg	cp pelliculé	 						Solution injectable administrable par voie orale ou entérale
VISKALDIX	clopamide + pindolol		5 mg / 10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer de préférence le matin ou à midi (effet diurétique)
VISKEN	pindolol		5 mg	comprimé	 						A administrer le matin, avec une solution buvable Ne pas croquer , ni écraser
			15 mg	comprimé	 						
VITALOGINK	ginkgo biloba		40 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours d'un repas, avec un ½ verre d'eau Préférez la solution buvable diluée dans un ½ verre d'eau : 1 dose = 1 ml = 40 mg d'extrait pur
			40 mg	cp pelliculé		?	?		?		
VITAMINE B ₁	vitamine B ₁		250 mg	cp pelliculé	 						A avaler avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
VITAMINE B ₆	vitamine B ₆		250 mg	cp quadriséable	 						Goût amer et pharmacocinétique inconnue si broyage du comprimé Facilement soluble dans l'eau
VITAMINE B ₁ , B ₆	vitamines B ₁ + B ₆		250 mg / 35 mg	cp pelliculé							A administrer avec de l'eau Ne pas croquer, ni sucer , ni écraser
VITASCORBOL	vitamine C		500 mg	cp à croquer							Comprimé à croquer est écrasable Comprimé effervescent : dissoudre dans un ½ verre d'eau : dégazez la solution
			1 g	cp effervescent							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VIT B ₁₂	vitamine B ₁₂		250 µg	cp bisécable	 	?	?		?		Préférez les solutions buvables
			100 µg / ml	solution buvable et injectable							
			1 000 µg / 4 ml	solution buvable et injectable							
			1 000 µg / 2 ml	solution buvable et injectable							
			1 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
VITAMINE C	vitamine C		500 mg	cp à croquer ou à sucer							Dissoudre le comprimé effervescent dans au moins un ½ verre d'eau : dégazez la solution effervescente
			1 g	cp effervescent							
VITAMINE C sans sucre	vitamine C		500 mg	cp à croquer							
VITAMINE D ₃	vitamine D ₃		200 000 UI (1 ml)	solution buvable et injectable							Solution injectable huileuse administrable par voie IM ou orale
VITAMINE E ATU pour la susp. buvable	vitamine E		100 mg / ml	susp. buvable							A administrer le matin au petit déjeuner, avec un verre d'eau
			500 mg	capsule molle							Préférez la suspension buvable
VITAMINE K ₁	vitamine K ₁		2 mg / 0,2 ml	solution buvable et injectable							Éviter les aliments riches en vitamine K : foie, abats, œuf, persil, épinards, choux, choux-fleurs, navet, choucroute, brocolis, épinards, salade verte, avocat, carotte, fenouil, tomate
			10 mg / ml	solution buvable et injectable							
VITASCORBOL	vitamine C		1 g	cp effervescent							Dissoudre le comprimé dans au moins un ½ verre d'eau : dégazez la solution
VITASCORBOL sans sucre	vitamine C + ascorbate de sodium		500 mg	cp à croquer							
VITATHION	vitamine B ₁ + C + inositolcalcium		2mg/500mg/100mg	granulés effervescents							A administrer avant le petit déjeuner, dissous dans un ½ verre d'eau : dégazez la solution
VOGALENE	métopimazine		1 mg / ml	solution buvable							Préférez les solutions buvables : utilisez la seringue-doseuse pour l'administration directe dans la bouche ou la forme suppositoire à 5 mg
			4 mg / ml	solution buvable							
			15 mg	gélule	 				?		
VOGALENE LYOC	métopimazine		7,5 mg	lyophilisat oral							Ne pas croquer, ni diluer dans l'eau le lyophilisat : le

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VOGALIB	métopimazine		7,5 mg	lyophilisat oral							laissez fondre sur la langue
VOLIBRIS	ambrisentan		5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni écraser, ni casser
			10 mg	cp pelliculé							
VOLTAFLEX	glucosamine		625 mg	cp pelliculé		?	?		?		A administrer au cours ou en dehors des repas Ne doit pas être administré aux patients présentant une allergie aux crustacés, à l'arachide ou au soja
VOLTARENDOLO	diclofénac		12,5 mg	comprimé enrobé	 						A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser : comprimés gastrorésistants Préférez la forme suppositoire à 25 et 100 mg
VOLTARENE	diclofénac		25 mg	comprimé enrobé	 						
			50 mg	comprimé enrobé	 						
VOLTARENE LP	diclofénac		75 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni écraser : comprimés à libération prolongée Préférez la forme suppositoire à 25 et 100 mg → adaptation de la posologie (perte de l'effet retard) femme enceinte
			100 mg	comprimé enrobé							
VOTRIENT	pazopanib		200 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe, 1 h avant ou 2 h après un repas, avec de l'eau Ne pas casser, ni croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
			400 mg	cp pelliculé	 						
VOTUBIA	évérolimus		2,5 mg	comprimé							A administrer toujours au cours ou toujours en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser Préférez les comprimés dispersibles de Certican® dissous dans de l'eau (1,25 mg pour 10 ml d'eau) ou du sirop dilué Évitez la prise simultanée de jus de pamplemousse femme enceinte : cytotoxique
			5 mg	comprimé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
VULCASE	belladone + bile + soufre + aloès + réglisse		10mg/38mg/ 37mg/45mg/9mg	comprimé enrobé		?	?		?		A administrer le matin à jeun ou le soir
XAGRID	anagrélide		0,5 mg	gélule							Avez la gélule intacte à heure fixe, avec un grand verre d'eau Ne pas y associer la prise de pamplemousse
XAL	chlorure de potassium + chlorure d'ammonium		32g/5,4g (pour 100 g)	poudre orale							Substitut de sel à saupoudrer soit à la cuisson, soit au moment de consommer (goût plus agréable) A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec de l'eau
XALKORI	crizotinib		200 mg	gélule							Ne pas ouvrir, ni croquer, ni écraser : cytotoxique Préférer la solution buvable (en ATU) de Crizotinib® Eviter le pamplemousse : risque d'augmentation des concentrations plasmatiques et le millepertuis, risque inverse
			250 mg	gélule							femme enceinte
XANAX	alprazolam		0,25 mg	cp bisécable							Avez la gélule intacte à heure fixe, avec un grand verre d'eau Ne pas y associer la prise de pamplemousse
			0,5 mg	cp bisécable							
			1 mg	cp bisécable							
XANTHIUM LP	théophylline		200 mg	gélule							Gélules à libération modifiée : ouverture possible mais sans croquer ou écraser les microgranules
			300 mg	gélule							
			400 mg	gélule							
XARELTO	rivaroxaban		10 mg	cp pelliculé							
			15 mg	cp pelliculé							
			20 mg	cp pelliculé							
XATRAL	alfuzosine		2,5 mg	comprimé							A administrer au cours des repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
XATRAL LP	alfuzosine		10 mg	comprimé							
XFI.FVIA	sitaclintine		50 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
	capécitabine		100 mg	cp pelliculé							femme enceinte
XELODA	capécitabine		150 mg	cp pelliculé	 						A administrer avec de l'eau, dans les 30 minutes après un repas Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser
			500 mg	cp pelliculé	 						femme enceinte
XENAZINE	tétrabénazine		25 mg	cp bisécable	 	?	?		?		
XENBILOX ATU	acide chénodésoxycholique		250 mg	gélule				?	?		A administrer le soir au coucher
XENICAL	orlistat		120 mg	gélule				?	?		A administrer avec de l'eau, immédiatement avant, au cours ou jusqu'à une heure après un repas contenant des graisses
XENID	diclofénac		50 mg	comprimé enrobé							A administrer au cours d'un repas, avec un verre d'eau Ne pas croquer, ni sucer, ni écraser : comprimé gastrorésistant
XEROQUEL LP	quétiapine		50 mg	comprimé	 						A administrer en une seule prise, avec de l'eau, en dehors des repas : 1 h avant un repas ou le soir au coucher Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : comprimés à libération prolongée
			300 mg	comprimé	 						
			400 mg	comprimé	 						
XGLY ANALOG	mélange d'AA sans glycine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'hyperlysiniémie, entre la naissance et 1 an
XLEU ANALOG	mélange d'AA sans leucine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal / 100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'hyperglycémie non cétogène, de la naissance à 1 an
XLEU FALADON	mélange d'AA sans leucine		500 g (326kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidémie isovalérique et des troubles du métabolisme de la leucine, chez le nourrisson l'enfant et l'adulte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
XLEU MAXAMAID	mélange d'AA sans leucine ; supplémenté en glucides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidémie isovalérique et des troubles du métabolisme de la leucine, entre 1 et 8 ans
XLEU MAXAMUM			500 g (297kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidémie isovalérique et des troubles du métabolisme de la leucine, dès 8 ans et chez l'adulte
XLYS ANALOG	mélange d'AA sans lysine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'hyperlysiniémie, entre la naissance et 1 an
XLYS LOW TRY ANALOG	mélange d'AA sans lysine et peu de tryptophane ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidurie glutarique de type 1, entre la naissance et 1 an
XLYS LOW TRY MAXAMAID			500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidurie glutarique de type 1, entre 1 et 8 ans
XLYS LOW TRY MAXAMUM			500 g (297kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidurie glutarique de type 1, dès 8 ans chez l'adulte et la femme enceinte
XLYS MAXAMAID	mélange d'AA sans lysine ; supplémenté en glucides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'hyperlysiniémie, entre 1 et 8 ans
XLYS TRY GLUTARIDON	mélange d'AA sans lysine ni tryptophane		200 g (332kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'acidurie glutarique de type 1, chez le nourrisson l'enfant et l'adulte
			500 g (332kcal/100 g)	poudre orale et entérale							
XMET ANALOG	mélange d'AA sans méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, entre la naissance à 1 an
XMET CYS MAXAMAID	mélange d'AA sans méthionine ni cystine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, entre 1 et 8 ans
XMET HOMIDON	mélange d'AA sans méthionine		200 g (326kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, chez le nourrisson l'enfant et l'adulte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
XMET MAXAMAID	mélange d'AA sans méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, entre la naissance à 1 an
XMET MAXAMUM	mélange d'AA sans cystine ni méthionine ; supplémenté en glucides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (297kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, bien agiter Traitement nutritionnel de l'homocystinurie, dès 8 ans chez l'adulte et la femme enceinte
XMET XCYS ANALOG	mélange d'AA sans méthionine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau : bien agiter Traitement nutritionnel du déficit en sulfite-oxydase, entre la naissance et 1 an
XMET XCYS MAXAMAID	mélange d'AA sans méthionine ; supplémenté en glucides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 7 d'eau Traitement nutritionnel du déficit en sulfite-oxydase, entre 1 et 8 ans
XMTVI ANALOG	mélange d'AA sans méthionine, thréonine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau : bien agiter Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, de la naissance à 1 an
XMTVI ASADON	mélange d'AA sans méthionine, thréonine, isoleucine et valine		200 g (326kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 20 d'eau Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, chez le nourrisson l'enfant et l'adulte
XMTVI MAXAMAID	mélange d'AA sans méthionine, thréonine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 5 d'eau Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, entre 1 et 8 ans
XMTVI MAXAMUM	mélange d'AA sans méthionine, thréonine, isoleucine et valine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (297kcal/100 g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à un peu d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 100 ml - 1 volume de poudre pour 5 d'eau Traitement nutritionnel des acidémies propionique et méthylmalonique, dès 8 ans chez l'adulte et la femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
XMTVIL MAXAMAID	mélange spécial d'AA		500 g	poudre orale et entérale							
XOLAAM	hydroxyde d'aluminium + hydroxyde de magnésium		400mg / 400mg	cp à croquer et à sucer							A administrer au moment de la douleur, à distance d'une autre prise médicamenteuse
			3,5 g / 4 g	susp. buvable							
XP ANALOG	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 100 ml d'eau froide, bien agiter Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez les enfants de la naissance à 1 an
XP ANALOG LCP	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments ; enrichi en AG type PUFA		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 100 ml d'eau froide, bien agiter Traitement nutritionnel de la phénylcétonurie chez les enfants de la naissance à 1 an favorisant le développement du système nerveux central
XP MAXAMAID	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100g)	poudre orale et entérale 2 saveurs							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 5 d'eau Indiquée entre 1 et 8 ans si phénylcétonurie
XP MAXAMAID SANS AROME	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100g)	poudre orale et entérale							
XP MAXAMUM	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (297kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 5 d'eau Indiquée si phénylcétonurie dès 8 ans, chez l'adulte et la femme enceinte
XP MAXAMUM SANS AROME	mélange d'AA sans phényl alanine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (297kcal/100g)	poudre orale et entérale							
XPHEN TYR ANALOG	mélange d'AA sans phényl alanine ni tyrosine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau : bien agiter Indiquée entre la naissance et 1 an si tyrosinémie de type I, II ou III
XPHEN TYR MAXAMAID	mélange d'AA sans phényl alanine ni tyrosine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau : bien agiter Indiquée entre 1 et 8 ans si tyrosinémie de type I, II ou III
XPHEN TYR MAXAMUM	mélange d'AA sans phényl alanine ni tyrosine ; supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (297kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 5 d'eau Indiquée si tyrosinémie de type I, II ou III dès 8 ans, chez l'adulte et la femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
XPHEN TYR TYROSIDON	mélange d'AA sans phénylalanine ni tyrosine		500 g (326kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 20 d'eau Indiquée si tyrosinémie de type I, II ou III chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte
X-PREP	séné		2,4 g	poudre orale et entérale							Diluez le sachet dans un 1/2 verre d'eau
XPTM ANALOG	mélange d'AA sans méthionine ni phénylalanine ni tyrosine ;		400 g* (72 kcal/100 ml)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 30 ml d'eau, bien agiter Indiquée si tyrosinémie de type I de la naissance à 1 an
XPTM MAXAMAID	supplémenté en glucides, lipides, minéraux, vitamines et oligoéléments		500 g (309kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 20 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant avec une fourchette, puis ajoutez le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 5 d'eau Indiquée si tyrosinémie de type I entre 1 et 8 ans
XPTM TYROSIDON	mélange d'AA sans méthionine ni phénylalanine ni tyrosine		500 g (326kcal/100g)	poudre orale et entérale							Mélangez 5 g de poudre à 100 ml d'eau, homogénéisez en remuant, continuez en ajoutant le reste d'eau : 1 volume de poudre pour 20 d'eau Indiquée si tyrosinémie de type I chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte
XYREM	oxybate de sodium		500mg/ml	solution buvable							A administrer en dehors d'un repas (délai de 2 à 3 h), diluée dans 60 ml d'eau
XYZALL	lévocétirizine		5mg	cp pelliculé	 						A administrer en une seule prise, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser
YAZ	éthinyloestradiol + drospirénone		0,02 mg / 3 mg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe avec de l'eau Ne pas croquer, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
YOCORAL	yohimbine		5 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en dehors d'un repas
YOHIMBINE	yohimbine		2 mg	comprimé		?	?		?		A administrer en dehors d'un repas
YREM	hydroxy 4 butyrate de sodium		500 mg / ml	solution buvable							A administrer en dehors d'un repas : diluée dans 60 ml d'eau
YSE	kola + zinc		100 mg / 4 mg	cp pelliculé	 						A avaler intact avec de l'eau
YSE GLUTAMIQUE	zinc + acide glutamique		4 mg / 200 mg	cp pelliculé							A avaler intact avec de l'eau
YSOMEGA	triglycérides d'acides ω-3		1 g	capsule molle							A avaler avec un verre d'eau, au cours d'un repas

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZACNAN	minocycline		50 mg	gélule				?	?		A administrer au cours d'un repas
			100 mg	gélule				?	?		
ZADITEN	kétotifène	®	1 mg	gélule				?	?		A administrer au cours des repas Préférez la solution buvable
		®	1 mg / 5 ml	solution buvable	 						
ZADITEN LP	kétotifène		2 mg	comprimé	 						A administrer au cours des repas Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée Préférez la solution buvable → <i>adaptation de la posologie (perte de l'effet retard)</i>
ZALDIAR	tramadol + paracétamol		37,5mg / 325mg	cp effervescent	 						Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser le comprimé pelliculé Préférez le comprimé effervescent dissous dans un verre d'eau : dégazez la solution
			37,5mg / 325mg	cp pelliculé	 						
ZAMUDOL LP	tramadol		50 mg	gélule							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Gélules à libération prolongée ouvrables mais sans croquer ni écraser les microgranules
			100 mg	gélule							
			150 mg	gélule							
			200 mg	gélule							
ZANEXTRA	énalapril + lercanidipine		20 mg / 10 mg	comprimé		?	?		?	A administrer de préférence le matin, 15 minutes avant le petit déjeuner Ne pas associer à la prise de jus de pamplemousse	
ZANIDIP	lercanidipine		10 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		A administrer en une seule prise le matin, à heure fixe, avant un repas Ne pas associer à la prise de jus de pamplemousse
			20 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
ZARONTIN	éthosuximide	®	250 mg / 5 ml	sirop							A administrer au cours d'un repas
ZAVEDOS	idarubicine		5 mg	gélule							A administrer telle quelle en dehors d'un repas ou avec un repas léger
			10 mg	gélule							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			25 mg	gélule							
ZAVESCA	miglustat		100 mg	gélule							A administrer telle quelle au cours ou en dehors d'un repas femme enceinte
ZEBINIX	eslicarbazépine		800 mg	cp bisécable		?	?		?		A administrer avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas
ZECLAR	clarithromycine		25 mg / ml	granulés pour susp. buvable							A administrer au cours des repas Préférez la suspension buvable diluée dans de l'eau ou du lait
			50 mg / ml	granulés pour susp. buvable							
			250 mg	cp pelliculé		?	?		?		
			500 mg	cp pelliculé		?	?		?		
ZEEFRA	céfradine		500 mg	gélule				?	?		
ZEFFIX	lamivudine		100 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas Préférez la solution buvable, ou celle d'Epivir® Ne pas manipuler sans protection
			5 mg / ml	solution buvable							femme enceinte
ZELBORAF	vémurafénib		240 mg	cp pelliculé							A administrer intact, à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser : cytotoxique femme enceinte
ZELDOX ATU	ziprasidone		20 mg	gélule							La gélule doit être prise avec de la nourriture
			40 mg	gélule							
			60 mg	gélule							
ZELITREX	valaciclovir		500 mg	comprimé enrobé		?	?		?		Préférez les solutions buvables de Zovirax® femme enceinte

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZENALIA	gelsemium + ignatia + kalium		1mg/1mg/1mg	cp sublingual							A administrer en dehors des repas, laissez fondre sous la langue
ZENELEG	cp jour : magnésium+ fer + vitamines B ₉ + vit B ₁₂		100mg/14mg/0,2mg/1μg	comprimé		?	?		?		A administrer avant ou pendant les repas, avec un verre d'eau
	cp nuit : magnésium + mélisse		150 mg / 100 mg	comprimé		?	?		?		
ZENDEL	albendazole		0,4 g / 10 ml	susp. buvable							A administrer avant ou pendant les repas Préférez la suspension buvable Evitez les repas riches en graisses
			400 mg	comprimé enrobé							
ZERIT	stavudine		15 mg	gélule							A administrer de préférence 1 h avant le repas ou avec un repas léger Ouverture (avec précaution) des gélules possible : mélanger le contenu avec les aliments Préférez la poudre orale femme enceinte
			20 mg	gélule							
			30 mg	gélule							
			40 mg	gélule							
			200 mg	poudre orale							
ZESTORETIC	lisinopril + hydrochlorothiazide		20 mg / 12,5 mg	cp bisécable							A administrer à heure fixe, avec un verre d'eau Goût désagréable : broyage du comprimé possible si administration par voie sonde, mais difficile, non recommandé femme enceinte
ZESTRIL	lisinopril		5 mg	cp bisécable							A administrer en une seule prise, à heure fixe, au cours ou en dehors d'un repas, avec un verre d'eau Goût désagréable : broyage du comprimé possible si administration par voie entérale, mais difficile, non recommandé femme enceinte
			20 mg	cp bisécable							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZIAGEN	abacavir		20 mg / ml	solution buvable							A administrer au cours ou en dehors des repas Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à une petite quantité de liquide ou de nourriture semi-solide : ingestion immédiate Préférez la solution buvable femme enceinte
			300 mg	cp pelliculé							
ZIKIALE	éthinyloestradiol + lévonorgestrel		30 µg / 150 µg	cp pelliculé	 						A administrer à heure fixe Ne pas croquer , ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ZINNAT	céfuroxime		125 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable	 						A administrer 15 à 30 minutes après un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser les comprimés Préférez les granulés dans un verre d'eau : absorption immédiate de la suspension
			125 mg	cp pelliculé	 						
			250 mg	cp pelliculé	 						
			500 mg	cp pelliculé	 						
ZITHROMAX	azithromycine		250 mg	cp pelliculé	 						A administrer en une seule prise, au cours ou en dehors d'un repas Préférez la poudre orale, photosensible : administration immédiate
			40 mg / ml	poudre orale							
ZITHROMAX MONODOSE	azithromycine		250 mg	cp pelliculé	 	?	?		?		
			5 mg	comprimé enrobé	 						A administrer en une prise unique le soir, au cours ou en

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZOCOR	simvastatine		20 mg	comprimo enrobé bisécable	 						dehors d'un repas Ne pas croquer, ni écraser
			40 mg	comprimé enrobé bisécable	  						
ZOELY	nomegestrol + estradiol		2,5 mg / 1,5 mg	cp pelliculé							A administrer à heure fixe Ne pas croquer, ni mâcher, ni écraser : efficacité sur 24 h incertaine
ZOFENIL	zofénopril		7,5 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		A administrer avant, pendant ou après un repas, avec de l'eau ou un autre liquide Les comprimés peuvent être coupés en deux ou avalés entiers  femme enceinte
			15 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
			30 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
			60 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
ZOFENILDUO	zofénopril + hydrochlorothiazide		30 mg / 12,5 mg	cp pelliculé	  	?	?		?		
ZOFENOPRIL	zofénopril		30 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?		
ZOLINZA ATU	vorinostat		100 mg	gélule							Ne pas ouvrir, ni écraser : cytotoxique  femme enceinte
			2,5 mg	comprimé	 	?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZOLMITRIPTAN	zolmitriptan		2,5 mg	cp pelliculé		?	?		?		Préférez le comprimé orodispersible : laisser fondre dans la bouche, peut être avalé sans eau
			2,5 mg	cp orodispersible		?	?		?		
ZOLOFT	sertraline		25 mg	gélule							A administrer en une prise avec de l'eau, au cours des repas
			50 mg	gélule							
			100 mg	gélule							
ZOLPIDEM	zolpidem		10 mg	cp pelliculé bisécable		?	?		?		A administrer avec de l'eau, immédiatement avant le coucher
ZOLTUM	oméprazole		10 mg	gélule							A administrer avec un ½ verre d'eau à jeun ou au cours d'un repas Ouverture des gélules possible mais sans écraser les microgranules gastrorésistants, à mélanger avec un aliment légèrement acide : yaourt, jus d'orange, compote de pomme ...
			20 mg	gélule							
ZOMIG	zolmitriptan		2,5 mg	cp pelliculé							Ne pas administrer par sonde entérale : préférez le comprimé de Zomigoro®
ZOMIGORO	zolmitriptan		2,5 mg	cp orodispersible							Fond rapidement dans la bouche, peut être avalé sans eau
ZONDAR	diacéréine		50 mg	gélule							A administrer entière avec un verre d'eau, au milieu des repas
ZONEGRAN	zonisamide		25 mg	gélule							A administrer entières avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas
			50 mg	gélule							
			100 mg	gélule							
			4 mg / 5 ml	sirop							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZOPHREN	ondansétron		4 mg	lyophilisat oral	 						Ne pas croquer , ni écraser les comprimés : préférez le lyophilisat oral ou le sirop
			4 mg	cp pelliculé	 						
			8 mg	lyophilisat oral	 						
			8 mg	cp pelliculé	 						
ZOPICLONE	zopiclone		7,5 mg	cp pelliculé bisécable	 	?	?		?	A administrer avec un verre d'eau, le soir au coucher	
ZOVIRAX	aciclovir		200 mg / 5 ml	susp. buvable							Préférez les suspensions buvables
			200 mg	comprimé	 	?	?		?		
			800 mg / 10 ml	susp. buvable							
			800 mg	comprimé		?	?		?		
ZOXAN LP	doxazosine		4 mg	cp pelliculé							A administrer au cours ou en dehors d'un repas, avec une quantité suffisante de liquide
			8 mg	cp pelliculé							Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimés à libération prolongée
ZUMALGIC	tramadol		50 mg	cp effervescent							A dissoudre dans un verre d'eau : dégazez la solution
			100 mg	cp effervescent							
ZYBAN LP	bupropion		150 mg	cp pelliculé						A administrer au cours ou en dehors d'un repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : comprimé à libération prolongée	
ZYFLO ATU	zileuton		600 mg	comprimé		?	?		?		

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvverture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
ZYFLO LP ATU	zincation		600 mg	comprimé							Ne pas croquer , ni écraser : comprimé à libération prolongée
ZYLORIC	allopurinol		100 mg	comprimé sécable							A administrer avec un grand verre d'eau, après un repas Ne pas croquer , ni écraser Eviter la prise concomitante de thé, café ou Coca-Cola
			200 mg	comprimé sécable							
			300 mg	comprimé sécable							
ZYMAD	vitamine D ₃		10 000 UI (1 ml)	solution buvable							A administrer pure ou mélangée à un aliment liquide ou semi-liquide
			80 000 UI (2 ml)	solution buvable							
			200 000 UI (2 ml)	solution buvable							
ZYMADUO	vitamine D ₃ + fluorure de sodium		150 UI / 0,138 g	solution buvable							A administrer pure ou diluée dans un peu d'eau ou de jus de fruit Evitez la prise simultanée de lait ou de solution buvables lactées
			300 UI / 0,138 g	solution buvable							
ZYMAFLUOR	fluorure de sodium		0,25 mg	cp à croquer ou à sucer							A administrer en une seule prise Les comprimés peuvent être avalés, croqués ou dissous dans un peu d'eau La solution buvable peut être diluée dans un peu d'eau ou de jus de fruit Evitez la prise simultanée de lait ou de solution buvables lactées
			0,5 mg	cp à croquer ou à sucer							
			0,75 mg	cp à croquer ou à sucer							
			1 mg	cp à croquer ou à sucer							
			1,14 mg / ml	solution buvable							
ZYPREXA	olanzapine		5 mg	comprimé enrobé							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas Ne pas croquer, ni mâcher , ni écraser : préférez les comprimés de Zyprexa Velotab® Principe actif sensible à la lumière et à l'hygrométrie
			7,5 mg	comprimé enrobé							

Spécialités					Excipients	Broyage des formes solides	Solubilité ou dispersibilité dans l'eau	Ouvrerture des gélules	Administration par sonde entérale	Utilisation entérale de la forme injectable	Conseils et alternatives
Noms commerciaux	DCI	AGEPS	Dosages	Formes galéniques							
			10 mg	comprimé enrobé	 						
ZYPREXA VELOTAB	olanzapine		5 mg	cp orodispersible							A administrer à heure fixe, au cours ou en dehors des repas Comprimé friable, doit être utilisé immédiatement après ouverture de la plaquette, peut être placé dans la bouche ou dissous dans un grand verre d'eau ou tout autre solution buvable lait, café, jus de pomme ou d'orange)
			10 mg	cp orodispersible							
			15 mg	cp orodispersible							
			20 mg	cp orodispersible							
ZYRTEC	cétirizine		10 mg / ml	solution buvable							Goût très amer : broyage possible si administration par sonde entérale Préférez la solution buvable diluée dans un peu d'eau
ZYRTECSET	cétirizine		10 mg	cp pelliculé bisécable							
ZYTIGA	acétate d'abiraténone		250 mg	comprimé							A administrer en une seule prise, au moins une heure avant et 2 heures après un repas, avec de l'eau Ne pas croquer, ni écraser  femme enceinte Port de gants : risques foetaux
ZYVOXID	linézolide		100 mg / 5 ml	granulés pour susp. buvable	  						A administrer au cours ou en dehors des repas Préférez la suspension buvable Évitez les aliments riches en tyramine : fromages affinés, extraits de levure, extraits de soja et les solution buvables alcoolisées non distillées (vin, bière ...)
			400 mg	cp pelliculé							
			600 mg	cp pelliculé	 						